

ہومیوپیتھک لکچرین و تجربہ

یعنے چالیس ادویات کا مکمل

جس میں عام متعل چالیس ادویات کے خواص و افعال کی عمومیات
و خصوصیات ظاہری و باطنی کیفیات و تاثرات کا مختصر مگر مکمل ہفیدہ موز
اور سلیس و جامع اور بیان درج ہے

۲۲ مانتیشی

یہ کتاب ہومیوپیتھک لکچر ہسپتال - ۹ مال روڈ لاہور کے نصاب تعلیم میں شامل ہے

طبع سوم قیمت دو روپے (۲۰) نقد ایک ہزار

نوٹ :- قیمت جو اندر درج ہے وہ صرف ایک حصہ کی ہے

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱	علامات	۲۲	۵	۳۵	۴۶
۲	چند ضروری ہدایات	۲۳	۵	۳۶	۴۹
۳	ادویات	۲۴	۶	۳۷	۵۱
۴	برودت و اشتداد مرض بوجہ حرارت	۲۵	۷	۳۸	۵۲
۵	حرارت و اشتداد مرض بوجہ حرارت	۲۶	۸	۳۹	۵۳
۶	بے چینی و اضطراب	۲۷	۹	۴۰	۵۴
۷	غصہ و ری	۲۸	۱۰	۴۱	۵۵
۸	خوف	۲۹	۱۱	۴۲	۵۶
۹	ریشک آلودگی	۳۰	۱۲	۴۳	۵۷
۱۰	اشتداد مرض بوجہ سکون	۳۱	۱۳	۴۴	۵۸
۱۱	اشتداد مرض بوجہ حرکت	۳۲	۱۴	۴۵	۵۹
۱۲	صعود مرض بعد از دوپہر	۳۳	۱۵	۴۶	۶۰
۱۳	صعود مرض بعد از نیم شب	۳۴	۱۶	۴۷	۶۱
۱۴	صعود مرض بعد از خواب	۳۵	۱۷	۴۸	۶۲
۱۵	صعود مرض بوجہ دباؤ	۳۶	۱۸	۴۹	۶۳
۱۶	انقطاع مرض بوجہ دباؤ	۳۷	۱۹	۵۰	۶۴
۱۷	تشنگی	۳۸	۲۰	۵۱	۶۵
۱۸	خوارک بعد از خوراک اشتداد مرض	۳۹	۲۱	۵۲	۶۶
۱۹	جلن دانے درد	۴۰	۲۲	۵۳	۶۷
۲۰	چیرتا ہوا درد	۴۱	۲۳	۵۴	۶۸
۲۱	درد جن میں مقام درد و ہوا	۴۲	۲۴	۵۵	۶۹
۲۲	ہوا یا دھن والا معلوم ہو	۴۳	۲۵	۵۶	۷۰
۲۳	پتکن دانے درد	۴۴	۲۶	۵۷	۷۱

DR. K. C. HITESHI,
The Pioneer of Homoeopathy
in Punjab.



ڈاکٹر کرم چند صاحب ہتیشی ایم ڈی (ہومیو پاتی) ایل ایم ای ایچ ڈینسین، لاہور

Printed at the Arorbans Press, Anarkali, Lahore.

ہومیوپیتھک شخصیات و تجویز دوا

چالیس ادویات کا حل

مصنفہ
عالیجناب مسجائے زمانہ ڈاکٹر کے سی متیشی صبا

ایم۔ ڈی ہومیوپیتھ۔ ایل۔ ایم۔ ای۔ ایچ (لندن)
و طبیقہ یافتہ امریکن فوڈریشن فار ہومیوپیتھی سابق پرنس ہومیوپیتھک میڈیکل کالج لاہور چیف میڈیکل افسر
پنجاب ہومیوپیتھک ہسپتال لاہور پریسیڈنٹ پرائیڈ ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن لاہور اسٹنٹ کمشنر ایل کمیشن
آف لیبر مصنفہ فلسفہ ہومیوپیتھی۔ چالیس ادویات کا حل۔ ہانسن اینڈ ہارن میڈیسن۔ ٹیوٹر کلین ٹیچنگ
ان ٹیوٹر کلسز و کسی نو سٹرانڈ ہومیوپرائی لیکچر ہومیوپیتھی فرام اینٹنٹ ایجنز ٹوماورن ٹاکمز وغیرہ وغیرہ
ایڈیٹر سالہ ہومیوپیتھی "تندرستی" وغیرہ

(یہ کتاب ہومیوپیتھک میڈیکل کالج لاہور کے نصاب تعلیم میں داخل ہے)

متیشی ہومیوپیتھک ہال۔ ۹ ہال روڈ۔ لاہور

قیمت ایک روپیہ

تعداد ۱۰۰۰

طبع سوم

(ہندوستان کے سب سے بڑے ہومیوپیتھک ڈسٹریبیوٹر اور ڈاکٹر کے سی متیشی کے ہومیوپیتھک ہسپتال لاہور کے سربراہ اور ان کے ہومیوپیتھک کالج لاہور کے سربراہ ہیں)

دیباچہ طبع دوم

ثنا لعین طب ہومیو پتھی نے عموماً اور طبابت پیشہ اصحاب نے خصوصاً جس فراخ دلی سے ہماری اس تصنیف موسومہ ہومیوپیتک تشخیص و تجویز دوا کی طبع اول کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے کہ ہم اس مختصر مگر نہایت مفید کتاب کی طبع ثانی پیش کریں۔ یہ تصنیف بذاتہ اس قدر مکمل ہے کہ اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ لہذا یہ طبع ثانی کسی ترمیم و تمشیح اضافہ و اختصار کی محتاج نہیں اور نہ اس میں کسی قسم کی کئی بیشی کی ضرورت ہے۔ طب ہومیوپتھی میں علم الادویہ اس قدر وسیع مگر مکمل و دقیق مگر صحیح پیچیدہ مگر صادق ہے۔ کہ اس کے مطالعہ کے لئے ایک زندگی درکار ہے۔ مگر اس کتاب میں دریا کو کوزہ میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور ریپرٹری انڈیکسز کے لئے مجموعی تشخیص دوا بذریعہ ہرچہ اگانہ علامت ایسے مشکل ترین عمل کو اس کتاب میں تبدیل کے لئے سہل ترین اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ امتیاز الادویات اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے جس کے بغیر طب ہومیوپتھی میں تشخیص و تجویز دوا مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن امر ہے۔ حقیقت یہ کتاب اسم باسم ہے جس میں پالیس ضروری عام متعل ادویات کا حل کر دیا گیا ہے جس کا مطالعہ ہر ایک طالب العلم ہومیوپتھی کیلئے نہایت ضروری ہے۔

تنبیہ

ماہنامہ ہوم

۹ پال روڈ۔ لاہور۔ مورخہ ۱۱ ماہ جولائی ۱۹۲۹ء

دیباچہ طبع سوم

یہ امر میرے لئے موجب مسرت ہے کہ مجھے اس مختصر مگر نہایت مفید تصنیف کی طبع سوم کو شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ طبابت پیشہ اصحاب نے عموماً اور ہومیوپیتک پریکٹیشنروں نے خصوصاً جس ہلکری سے اس کتاب کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہ شاید ہی کسی دوسری کتاب کو نصیب ہوا ہوگا۔ دراصل یہ کتاب ہے بھی اس قدر مفید کہ اس کے بغیر تشخیص و تجویز دوا کرنا ہی مشکل ہے۔ لہذا ہر ایک طبیب کی میز پر اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔

اتفاق کی بات دیکھئے۔ کہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن عرصہ پندرہ سال کا گزرا جبکہ شائع ہوا تھا اس وقت
یہ کتاب کیا بلحاظ نام نفیس مضمون۔ اور کیا بلحاظ تقطیع و حجم علامہ مخدوم شہر امرکین موجودہ سنٹ
سی۔ ایم بگر ایم ڈی کی اس معرکہ انکار تہذیب سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے۔ جبکہ نام جنرل لے سر
GENERAL ANALYSIS ہے۔ جگا چو تھا ایڈیشن حال میں ہی شائع ہوا ہے۔ اور یہ کتاب
ڈاکٹر بوگر کے حیرت انگیز ریسرچری کارڈوں کے ساتھ آتی ہے جن کی قیمت تقریباً ایک سو پچیس روپیہ ہے
ان کارڈوں کی مدد سے شخص سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ امراض مزمنہ و قابل عمل و اچھی میں تشخیص
تجزیہ و تفسیر اور خود بخود ہو جاتی ہے اور ہر مرض کا ہومیوپیتھک علاج نہایت کامیابی سے کیا جاسکتا
ہے۔

کتاب ہذا کو زیادہ مکمل بنانے کے لئے ادویات کے ضروری خواص و افعال۔ مدت اثر۔ ممد و
معاون ادویات فاذرہر اور متعل طاقت وغیرہ نہایت اہم اور ضروری مضامین کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو
انتخاب دوا میں ہر مبتدی و طبیب کو خاص مدد دے گا۔
امید ذاتی ہے کہ اس کتاب کی طبع سوئم کا عوام الناس کی طرف سے عموماً اور طبابت پیشہ صحاب
کی طرف سے خصوصاً اسی تپاک سے خیر مقدم کیا جادیکجا۔ جس کی کہ یہ مستحق ہے۔ جو مصنف و پبلشر ہردو
کی مزید جو صلہ افزائی کا باعث ہوگا۔

منتشی

”ہامن ہوم“
۹ ہال روڈ۔ لاہور۔ مورخہ یکم جنوری ۱۹۳۳ء

ح۔ یہ عجیب و غریب ریسرچری کارڈ منتشی ہومیوپیتھک ہال۔ ہال روڈ لاہور سے مل سکتے ہیں

ہومیوپیتھک تشخیص و تجویز دوا

یعنی

چالیس ضروری ادویات کا حل

ہومیوپیتھک مخزن الادویہ میں علامات ادویہ کا علم اور انہیں استعمال میں لانے کا فن جو حیرانگیز محنتیں ہیں۔ مثلاً بیمار کے توہین میں ایک دوائی کی جملہ علامات موجود ہوں لیکن یہ قابلیت نہ ہو کہ کس طرح ان میں امتیاز کر کے جائزہ لیں اور مرض کے لئے انکا انتخاب کیا جائے یہ عرق صرف علم اور عمل کا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرض بحیثیت مجموعی براہوتیا۔ رٹاکس۔ آرٹھیٹا اور یوٹیروٹیم سے متاثر ہے۔ لیکن وہ مخصوص علامات جو اسے آرٹھیٹا کے سوا اور کسی دوائی کا مرض نہیں بتاتے آپ پر ظاہر نہ ہوں یا آپ میں اس قدر علم موجود ہو کہ آپ صرف آرٹھیٹا کو ہی انتخاب کر کے مرض کے مرض کو رفع کریں۔ یہی دیر سے کمال لوگ بوجہ ناقابلیت کے ہومیوپیتھک ادویات مختلف رنگے لکیرے دیتے ہیں یا دوائیں مرکب حالت میں پکھلتی ہیں :

اگرچہ چالیس مشہور ادویہ آپ کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کی علامات یا ملتی ہیں نشین کر سکیں اور مرض مخزن جلا میں مناسب دوائی کا ایلا تخلیف انتخاب کر سکیں۔ یہ ادویات چھاری علم ضروریات کیلئے نہ ہی کافی ہیں اور نہ ہی مخزن الادویہ کی وسعت پر حاوی۔ اس مختصر فہرست ادویہ میں چند ایسی بھی ہیں۔ جو کہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں اور اکثر الاستعمال میں یہ فہرست اس عرق سے یہاں درج کی جاتی ہے تاکہ چند الجھدر و ذرا کم مطالعہ کرنے کے بعد مختصر سی سی دوائی میں آپ کو ترتیب علامات اور انتخاب دوائی میں کافی مہارت پیدا ہو جائے اور انہیں اصولوں کی پابندی سے آپ بھی ایک ایلا نقشت تیار کر سکیں جو روزمرہ مستعمل ادویات کی کلید ہو :

علامات

جملہ علامات تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں (۱) علامات اکثریہ (۲) علامات مخصوصہ (۳) علامات عمومیہ۔ اول الذکر اپنی اہمیت میں سب سے افضل ہیں اور تا وقتیکہ منتخب شدہ دوائی میں یہ علامات موجود نہ ہوں وہ ہرگز علاج بالمثل کے مطابق مجوزہ قرار نہیں دی جاسکتی۔

علامات اکثریہ سے بیماری مراد وہ علامات ہیں جو کہ مریض کے نفس سے متعلق ہوں اور وہ خود ان کا بیان کرے مثلاً میری پیاس اس طرح ہے۔ گرمی یوں محسوس ہوتی ہے۔ یا سردی کی یہ کیفیت ہے تمام خواہشات و کمزوریاں اور وہ علامات جو حیض وغیرہ کے متعلق ہیں۔ علامات اکثریہ کے زمرہ میں داخل ہیں۔ علامات اکثریہ علامات مخصوصہ سے مشتق ہو سکتی ہیں۔

ان کے بعد علامات مخصوصہ کا درجہ ہے اور اگر منتخب شدہ دوائی میں علامات اکثریہ و مخصوصہ موجود ہوں۔ تو علاج بالمثل کے قانون کے مطابق وہ دوائی مریض کے بالکل موافق ٹھہرے گی۔ اگرچہ علامات عمومیہ تمام تر اس میں موجود نہ ہوں علامات مخصوصہ میں وہ علامات شامل ہیں جو کسی عضو کے متعلق ہوں اور چھکاوچھکاو یا جے جے میں مقامی طور پر ہو۔ مثلاً درد سر۔ درد معدہ۔ وہ علامات جو بیان نہیں کی جاسکتیں علامات عمومیہ سے موسوم ہوتی ہیں۔ دوائی کے انتخاب میں علامات عمومیہ چنداں قابل توجہ نہیں کیونکہ یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جو عام طور پر ہر ایک دوائی اور مرض میں یکساں طور پر پائیدار ہیں۔

چند ضروری ہدایات

ناظرین اور طلباء کی سہولت کیلئے اس جگہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا علامات کو حفظ کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کے لئے چند ہدایات درج کر دی جائیں تاکہ انتخاب دوائی اور باقاعدہ علاج میں ان سے کافی مدد حاصل ہو سکے۔

سب سے مقدم اور ضروری بات یہ ہے کہ ادویات جو آئندہ صفحات میں مختلف عنوانوں کے تحت لکھی جائیں گی۔ حفظ کر لینی چاہئیں۔ جس وقت یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر ان ادویات کے جداگانہ علامات بھی یاد کر لئے جائیں تاکہ ادویات مختلفہ میں تیز ہو سکے۔ اس تھوڑی سی محنت کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ روزانہ ہستمال اور عوامی امراض کیلئے دوائی کا تجویز کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد ادویات کی نسبت علم کو وسیع کرنے کے لئے مخزن الادویات کے مطالعہ کی ضرورت ہوگی اور اگر ہر روز تھوڑا سا

وقت اس کے مطالعہ میں صرف کر دیا جائے۔ تو اندک مدت میں کافی علم الادویہ حاصل ہو جائیگا۔
باقی کی ادویات کو یاد کرنے کے لئے بھی اسی تدبیر کو عمل میں لانا چاہئے۔ کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی
طریقہ ادویات کو حفظ کرنے کا نہیں ہے۔

چنانچہ اس غرض کو مد نظر رکھ کر کتاب ہذا میں چالیس ادویات کے متعلق ایک مختصر مگر نہایت مفید
بیان درج ہے۔ جس سے طبابت ہمیشہ اصحاب بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد
ان کیلئے لازمی ہے کہ وہ مفصل مخزن الادویہ کا مطالعہ کریں۔

ادویات

۴۰ ادویات جن کا ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں مفصلہ ذیل ہیں :-

۱۰) ایکونائٹ	۱۱) بلاڈونا	۱۲) کالوسنتھ	۱۳) ہائیو سیس	۱۴) ٹامسٹک ایسڈ	۱۵) سلفر
۱۶) آرٹھیکا	۱۷) برائیوینا	۱۸) ٹیوکی ٹیلیس	۱۹) انڈیشیا	۲۰) ٹکسوامیکا	۲۱) سیپیا
۲۲) آرسینیکم	۲۳) کلیریا کارب	۲۴) ڈوروسرا	۲۵) آپیکا کوہنا	۲۶) فاسفورس	۲۷) سلیشیا
۲۸) ایپس	۲۹) کاربوئیوکی	۳۰) ڈکنمارا	۳۱) ٹیکینس	۳۲) فاسفورک ایسڈ	۳۳) تھوجا
۳۴) انٹیم کروٹ	۳۵) کاسٹیکم	۳۶) جلیبیم	۳۷) لائکو پوٹم	۳۸) پوڈوفالیم	۳۹) وریٹرم الیم
۴۰) انٹیم ٹارٹ	۴۱) چائٹ	۴۲) گریفٹارٹس	۴۳) ٹریکیورس	۴۴) ملٹیل	۴۵) زینکم
۴۶) کیمو مل	۴۷) ہیمپریلف	۴۸) نیٹرم میور	۴۹) رس ٹالس		

A-6
B-2
C-6
D-3
G-2
H-2
J-2
L-2
M-1
N-3
P-4
R-1
S-3
T-1
V-1
Z-1

40

ان ادویات کا استعمال کرنے کے لئے مفصلہ ذیل ۲۰ عنوان قائم کئے گئے ہیں :-

۱) تغیر بمحاطہ حرارت و برودت ۲) دماغی حالت بمحاطہ اضطراب و بھینچنی ۳) خوف ۴) صندو
تنگ مزاجی ۵) میلان ہگریہ و رنج تغیر مرض بمحاطہ حرکت ۶) سکون زمانہ اشتداد مرض ۷)
بعد از دوپہر ان اشتداد و انحطاط مرض بوجہ دباؤ و ان علامات اکثریہ و مخصوصہ متعلق بہ تشنگی اشتداد
مرض بوجہ ۸) اکل ۹) شرب ۱۰) دردوں کا احساس ۱۱) درجوں میں جلن ہو رہا ۱۲) درجوں میں اسطح
معلوم ہر کہ گویا کوئی چیز رہا ہے ۱۳) سوزش والا درد ۱۴) پس مارنے والا درد ۱۵) درجوں میں
لچھاوٹ اور تناؤ ہو رہا ۱۶) درجوں میں اس طرح معلوم ہو کہ عضو یا وقت پھٹ پڑے گا۔
عنوانات متذکرہ الصدر کے مطابق اگر ہم کسی دوائی کا انتخاب کریں تو وہ دوائی دماغ کے

باکھل حسب حال ہوگی۔ اور اس کے جملہ عوارض کی بیج کنی کر دے گی۔

برودت و اشتداد مرض بوجہ سرودت

پیشتر ازیں کہ ہم ادویات کا مفصل ذکر کریں۔ جو معمولی بالا علامات میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ برودت یا حرارت غریزی کی کمی اور سردی سے اشتداد مرض یا گرمی سے انحطاط مرض میں فرق کر لیا جائے۔ یہ دو علامات باکھل جدا گانہ ہیں۔ مثلاً ایک مریض جو گرمی کی خواہش رکھتا ہے۔ اور باوجود حصول حرارت کے بھی گرم نہیں رہ سکتا۔ سو کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی خاص علامات حرارت سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور سردی سے کم ہوتے ہیں۔ اس قسم کی مثال فاسفورس میں پائی جاتی ہے جس میں مرض نہایت مزہور معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی علامات عمدہ سردی کے استعمال سے کم ہوتی ہیں۔ اس قسم کا مریض دورانیہ مرض میں سرد چیزوں کی خواہش رکھتا ہے لیکن چوتھی وہ سردی عمدہ میں حرارت عمدہ کے باعث گرم ہوتی ہے۔ فوراً بندریت سے بچ جاتی ہے اس کی علامات سر بھی سرد چیزوں کے استعمال سے کم ہوتے معلوم ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے لاکو پوڈیم ایک گرم دوا ہے۔ اور ہرگز حرارت برداشت نہیں کر سکتی لیکن علامات عمدہ گرم چیزوں کے کھانے پینے سے کم ہوتے ہیں۔ ارسینک نہایت سرد دوا ہے۔ تاہم اس کی جملہ علامات سردی سے بڑھ جاتے ہیں۔

مفصلہ ذیل ادویہ عنوان بالا کے ماتحت مستقل ہیں۔

اکونائٹ۔ آرسنک۔ بلاڈوٹا۔ براونیا۔ کلکیریا کارب۔ چائٹا۔ کاربووج۔ کاسٹکم۔ کالوسنتھ۔ ڈاکمارا۔ گریفائٹس۔ ہیپسلفر۔ سپیکواہتا۔ اگنیشیا۔ لیکیس۔ لاکو پوڈیم۔ مرکوریس۔ انکس و امیکا۔ نیٹرم میور۔ ٹاسٹرک اینڈ۔ فاسفورس۔ فاسفورک۔ ایڈ۔ رس۔ ٹاکس۔ سیڈیا۔ سلفر۔ سیلیشیا۔
اب ہم ان ادویہ کو یکے بعد دیگرے بلحاظ ان کے خاص علامات بیان کرتے ہیں۔

آرسنک۔ جبکہ مریض سرد ہو۔ اور اس کے جملہ علامات سردی سے بڑھ جائیں۔ سو اسے سردی کے جو سردی سے کم ہوتا ہے۔

کلکیریا کارب۔ مریض سردی کا احساس کرتا ہے۔ لیکن کھلی ہوا میں جائے سے متنفر ہوتا ہے۔ مرطوب ہوا بھی بُری محسوس ہوتی ہے اور درخفیت کے جھونکے سے بھی شدت اختیار کر لیتے ہیں۔

چائٹا۔ جب بیرونی طور پر اور اندرونی اعضا میں سردی کا احساس ہو۔

کاسٹیکم۔ ایسی سردی جو حرارت سے رفع نہ ہو کھانسی۔ اسہال اور وجع مفاصل سردی سے

اشتداد پر ہوں۔ اور سردی درختے کا باعث ہو۔
 ڈاکمارا۔ جلد شکایات سردی، مرطوب ہوا یا مرطوب جگہوں کی رہائش سے پیدا ہوں۔ زکام۔
 کھانسی اور سٹپی دروسری سے زیادہ ہوتے جاتیں۔
 گریفا۔ مٹس۔ مریض کو سخت سردی ہوتی ہو۔ زکام۔ نزلہ۔ ٹپوں کا درد اور علامات معدہ میں
 سردی سے اضافہ ہو۔ لیکن جلدی علامات حرارت سے کم ہو جاتیں۔
 ہیسپر سلفر۔ مریض کو سردی خوب لگتی ہے۔ اور ہلکا سا جھوٹا بھی نہایت تیزی سے محسوس ہوتا
 ہے۔ سرد ہوا یا سرد اشیاء پینے سے علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی حصہ جسم سرد ہو جائے تو تکلیفات
 میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
 لاکو پوڈیم۔ اگرچہ دوا گرم ہے لیکن علامات مخصوصہ مثلاً سردی۔ کھانسی اور تکلیفات معدہ و گلو
 سردی سے بڑھ جاتے ہیں۔
 ٹاسٹرک ایسڈ۔ مریض برف کی مانند سرد ہو۔ اور ذرا سی ہوا لگنے سے بھی اشتداد علامات ہو جاتا
 ہے۔ پاؤں کے ٹوے سو۔ نزلہ زکام سردی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ البتہ کھانسی کو آرام ہوتا ہے۔
 ٹکس و امیکا۔ تمام جسم میں سردی کا لگنا۔ کھلی ہوا میں سردی کا محسوس ہونا۔ لحاف پر لحاف ڈھنسا
 اور کپڑا جسم سے دور نہ کرنا۔ کھانسی اور سردی کا سردی سے زیادہ ہونا۔
 فاسفورس۔ نہایت سرد ہے۔ خارجی طور پر سردی کا دماغ۔ معدہ۔ ہاتھ اور پاؤں میں محسوس ہونا
 وجہ مفاصل۔ اعصابی درد۔ کھانسی اور اسہال سردی سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور علامات معدہ اور سر
 سردی سے کم ہوتے ہیں۔
 فاسفورک ایسڈ۔ ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں اور پیٹ اور چہرے کی ایک طرف ٹھنڈی
 ہوتی ہے۔
 رٹاکس۔ اندرونی طور پر سردی کا ہونا۔ تری۔ کھلی ہوا کے جھونکے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے اور سرد
 ہوا سے علامات تیز ہو جاتی ہیں۔
 سلیشیا۔ عام طور پر سردی کا لگنا۔ ہمیشہ سردی کا احساس موسم سرما۔ ٹھنڈی اشیاء اور سردی سے
 جلد علامات کا بڑھ جانا۔
 اگر مفصلہ بالا ادویہ مریض کے مطابق نہ ٹھہریں۔ تو مفصلہ ذیل ادویہ پر غور کر لینا علاج کے لیے
 ازبس مفید ہے۔

ایکونائٹ۔ سردی سے تمام علامات زیادہ ہوتے ہیں۔ تکلیفات بوجہ سردی۔ سردی سے زکام
دانت کا درد۔ خناق حلق۔ صرفہ۔ وجع مفاصل اور آشوب چشم یعنی رمد کا بڑھ جانا ۛ
بلا ڈونا۔ گرم جگہ سے سرد جگہ پر جانا۔ سرد ہوا اور جھونکے تکلیفات میں اضافہ کرتے ہیں ۛ
براہونیا۔ سردی۔ موسم گرما میں سردا شیاء کے پینے سے جو شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان
کے لئے مفید ہے ۛ

کاربووج۔ سردی سے اثر پذیر ہو۔ ناک گھٹنے وغیرہ سرد ہوں ۛ
کالوسنتھ۔ تمام جسم سرد ہو۔ موسم سرما میں شکایات بڑھ جائیں۔ معدہ۔ زکام۔ ورم معدہ اور وجع معال
سردی سے بڑھ جائیں چہرے میں پھاڑنے اور ٹانگ مارنے والا درد محسوس ہو ۛ
ایریکواہنا۔ سردی و گرمی کا غیر معمولی احساس۔ سردا شیاء پینے سے قویٰ بنج پیدا ہو۔ اور غوما شکایات
موسم سرما میں ترقی کر جائیں ۛ

اگنیشیا۔ سردی بکثرت ہو۔ ٹھنڈی ہوا یا سرد پانی سے ہاتھ دھونے پر مرض میں ترقی ہو۔ ناک
پاؤں اور ٹانگیں گھٹنوں تک سرد ہوں ۛ
لیکیپس۔ تمام جسم میں سردی ہو۔ ہاتھ پاؤں اور اوپر کالب سرد ہو۔ گلو کی شکایات سرد
ہوا سے تیز ہوں ۛ

مرکیورس۔ سردی ناقابل برواشت ہو۔ احساس بہت زیادہ ہو۔ سردی کانوں۔ آنکھیں اور
ٹانگوں میں محسوس ہو ۛ

نیٹرم میور۔ دل کے گرد سخت سردی پاؤں۔ جوڑ پیٹھ اور معدہ میں سردی ہو ۛ
سیلیا۔ تمام جسم میں سردی۔ سرد و مرطب ہوا کا احساس۔ کھانسی۔ دانت کا درد اور وجع مفاصل
سردی سے بڑھ جائیں ۛ

سلفر۔ سردی سے اور موسم سرما یا برسات یا ہوا میں مرض کا ترقی کرنا۔ اسہال اور امراض گلو کا سردی
زیادتی اختیار کرنا ۛ

حرارت و اشتداد مرض بوجہ حرارت

مفصلہ ذیل ادویہ اس عنوان کے تحت میں عام طور پر مستعمل ہوتی ہیں :-

ایس۔ انٹیم مارٹ۔ براہوتیا۔ ڈلکمارا۔ ڈوروسرا۔ گریفائٹس۔ ایسیکا کواہنا۔ لیکیس۔ ڈلکوپوڈیم۔
 مرکورس۔ نیٹریم۔ فاسفورس۔ پٹسلا۔ سکیل۔ بلسفیر۔ سیسیا۔ وریٹرم۔ زنک
 ایس۔ خام غور پر گرمی کا احساس اور گرم کرے میں معبود علامات۔ باوجود گرمی پہنچانے کے سردی
 کا احساس اور سردی کا باخصوص گرمی سے اشتداد پانا۔
 پٹسلا۔ اندرونی طور پر گرمی۔ گرم کرے۔ گرم خوراک اور انگلیٹی کی گرمی سے علامات کا بڑھنا۔ عام
 طور پر تمام علامات گرمی سے زیادہ ہوجاتے ہیں۔
 سکیل۔ گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ مریض جسم سے کپڑا دور کرنا چاہتا ہے۔ گرمی سے طبیعت
 متغیر ہوتی ہے۔ اندرونی درد گرمی سے شدت پکڑتے ہیں۔ گرم شہاء کے کھانے سے سردی مدہ
 میں زیادہ ہوتی ہے۔
 ایٹیم مارٹ۔ سیریں بوجہ گرمی تخلیف ہوتی ہے۔ گرم اشہاء کے پینے سے کھانسی میں ترقی۔
 گرمی بستر سے علامات میں زیادتی۔ گرمی سے غنودگی۔
 براہوتیا۔ کھانسی۔ گرم ہوا اور گرم کرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سراچہ اور سردی گرمی پہنچانے سے
 زیادہ سرد محسوس ہوتے ہیں۔
 ڈلکمارا۔ گرمی سے پتی اٹھنا۔ کھانسی اور چھینکوں میں ترقی ہوتی ہے۔
 گریفائٹس۔ رات اور شام کے وقت خشک گرمی سے مرض میں ترقی۔ انگلیٹی کی گرمی سے خارش
 میں زیادتی۔ دانت کا درد گرمی سے زیادہ ہوتا ہے۔
 ایسیکا کواہنا۔ گرمی پہنچانے سے سردی میں زیادتی۔ گرمی اور مطلوب ہوا سے تخلیقات کا بڑھنا۔
 لیکیس۔ موسم بہار میں اگر گرمی زیادہ ہو جائے۔ تو مرض میں ترقی ہو جاتی ہے۔ بستر کی گرمی بھی
 ہی علامات پیدا کرتی ہے۔ اور اسہال میں ترقی ہوتی ہے۔
 مرکورس۔ بستر کی گرمی سے خارجی دردوں میں ترقی۔ گرمی کیلئے ذکی الحس۔ سردی۔ دم الاذن دکن شہ
 درد ونداں۔ وجع المفاصل اور خارش کا بوجہ گرمی بڑھ جانا۔
 نیٹریم۔ سورج کی گرمی اور موسم گرمیاں میں مرض مائل بہ ترقی ہوتا ہے کھانسی اور سردی بڑھ جاتی
 ہیں۔ گرم خوراک کھانے سے درد ونداں میں ترقی ہوتی ہے۔
 فاسفورس۔ اگرچہ مریض بظاہر سرد ہوتا ہے۔ لیکن پیٹ کے نزدیک وہ ہرگز گرمی برداشت نہیں کر سکتا
 گرم پانی پینے سے درد ونداں میں زیادتی۔ گرم خوراک سے اسہال کا لاحق ہونا۔ گرم شہاء پینے سے کھانسی کا بڑھنا

علاماتِ عمدہ بوجہ گرمی زیادہ شدید ہو جاتے ہیں ہاتھ چہرہ اور بازو گرمی سے سرخ ہو جاتے ہیں اور
خارش بڑھ جاتی ہے۔

سیسپیا۔ گرم کپڑے۔ گرم آب دھو یا کپڑا اوڑھنے سے تمام علامات میں زیادتی۔ رد اور
سرور گرمی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گرمی سے تنفس میں تنگی۔

ور پیرم۔ گرم کمرے میں کھانسی زیادہ۔ وجع اعصابی گرمی بستر سے زیادہ گرم موسم میں اہمال
کی زیادتی۔

زخم۔ دوزخ کے بعد سرد ہو نہ پر علامات کا زیادہ ہو جانا گرم کمرے میں سرور و کاٹھنا۔

بے چینی و اضطراب

مفصلہ ذیل ۳۲۔ ادویہ و ماعنی و جسمانی بے چینی کیلئے استعمال کی جاتی ہیں۔
اکوتائٹ۔ آرسنک۔ ایس۔ ایٹم ٹارٹ۔ بلاڈوٹنا۔ چائنا۔ کنگ۔ پیکٹریب۔ کوا۔ پودریج۔ کاسٹیم
کیموٹا۔ کالونستھ۔ ڈیکمارا۔ ڈیجی ٹائیس۔ ہایو سائمس۔ اپیکا کو اپنا۔ اگنیشیا۔ لائکو پوڈیم۔ لیکیس۔ مرکوریس
نکس۔ دامیکا۔ پیٹرم۔ میور۔ ٹائٹلک۔ ایڈ۔ فاسفورک۔ ایڈ۔ پلسٹلا۔ رس۔ ٹاکس۔ سلفوریکس۔ سیسپیا۔
سلیشیا۔ شانی۔ سیکریا۔ تھوجا۔ ور پیرم۔

اکونائٹ۔ متواتر کرٹ بدلنا۔ رات کے وقت بے صبر و فکر مند حرکت کرنا۔ اگرچہ یہ حرکت درد و نہیں
کوئی کمی نہیں لاتی۔ ہر ایک کام میں تعیل۔

آرسنک۔ وماغی و جسمانی بے چینی۔ امراض مزمنہ۔ سخت تھکات کی حالت میں۔
بلاڈوٹنا۔ تولنج۔ امراض قلبی میں بارتا۔ کائنا اور بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنا۔
کلیکریا کارب۔ وماغی بے چینی و اضطراب۔ بچہ ضدی۔ چرچا اور بے چینی۔

ڈیجی ٹائیس۔ جبکہ بے چینی بوجہ انتہائی اعصابی کمزوری کے ساتھ ہو۔
ہایو سائمس۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔

لائکو پوڈیم۔ اگرچہ بے چینی درد کے زیادہ احساس کے باعث ہو۔ دورانِ تولنج میں بے چینی۔
مرکوریس۔ وماغی اضطراب۔ فکر مندی سے فرار ہو ٹکی خواہش۔ ہر کام میں جلدی۔ ستواتر مگہوں کا
بدلنا۔ بے آرامی۔ شام (۸ بجے) سے صبح تک بے چینی۔

پلسٹا۔ دماغی بے چینی اور میان طبیعت پر تغیر۔ رات کو مجبوراً اٹھنا۔ رخصت آرام نہیں کر سکتا
اگرچہ حرکت باعث نقصان ہوتی ہے۔

رٹاگس۔ بھینپی و اضطراب۔ بار بار پہلو بدلنا بلکہ ایک بستر سے دوسرے بستر پر جانا۔
سلفز۔ پاؤں کا متواتر ملنا۔ نظام اعصابی کی برہمی اور بے آرامی۔
سلیپیا۔ تمام اعضاء میں وٹرکن کے باعث بے چینی۔
سلیٹیا۔ چلبلا خفیت شور سے بھی چونک پڑنا۔ اندرونی بے چینی و برہمی۔ ویرنگ بیٹے رہنے کی وجہ
سے جہانی بے چینی۔

سٹافی سگریا۔ بھینپی جہیں حرکت کی خواہش نہ ہو۔ حرکت باعث نقصان۔
زنگم۔ پاؤں میں چلبلا پن۔ متواتر نہیں حرکت دیتے رہنا۔
ذیل کی ادویہ میں بے چینی دوسرے درجہ پر موجود ہوتی ہے۔
ایس۔ مریض نہایت مشغول نظر آتا ہے کوئی کام بھی درستگی سے انجام نہیں پاتا۔ عام طور پر اپنا کام
بدلتا رہتا ہے۔ جہانی اور دماغی بے آرامی۔

ایٹیم ٹارٹ۔ اضطراب۔ اوپر اوپر ہونا۔ بازوؤں کا پھینکنا۔
کارل ووج۔ رات کو بھینپی۔ شام کو ۴ بجے سے ۶ بجے تک دماغی بھینپی۔
کاسٹم۔ جہانی بھینپی جو شام کو زیادہ ہو۔ بجائے کی خواہش۔ چلنے پر مجبور ہونا۔
کالو سٹو۔ بھینپی مدد ہال۔ اگرچہ رخصت کمزور ہوتا ہے۔ تاہم حرکت پر مجبور۔ کسی پہلو میں نہیں پڑتا
سرور کے باعث پہلے پر مجبور ہوتا ہے۔

ڈکھارا۔ بے چینی۔ بے تعبیری۔ عام بے آرامی۔
ایریک۔ دوران بخار میں بے چینی۔
لیگیس۔ ہر دم کروٹ بدلنا۔ پشت اور اعضاء میں درد۔
نیٹر م میور۔ سردی سے بھینپی۔ اعضاء کو متواتر متحرک رکھنا۔
ٹاسفورک ایسڈ۔ سینہ کی تنگی کو پہلنے سے آرام ہو۔ ہڈیوں۔ مکرادہ کر کے جوڑ دینے۔ درد۔
تھوجا۔ رات کے وقت اضطراب کے باعث ڈانڈا ڈول۔ دماغی بے چینی۔
ورٹیرم۔ حرکت دماغی۔ دماغی بھینپی۔ عورتیں خود کو پہن نہیں سکتیں۔ دائمی طور پر جھکے محسوس
کرنالوربے۔ وقتاً فوقتاً حرکات کا انتخاب ہونا۔

غصہ وری

۳۴۷ ادویہ ہندی و غصہ و رطبات کیلئے مستعمل ہوتی ہیں :-
ایکونائٹ - آرنیکا - آرسک - ایس - اینٹیم ہارٹ - بلاڈ وٹا - براہونیا - کیمو ملا - کلکیریا کارب
چائنا - کاربووج - کاسٹم - کالونٹھ - ڈیگم - ڈیگم - جلیسم - پیپر سلفر - لیکس
لائکو پوڈیم - مرکورس - نکسوامیکا - نیٹرم میور - نائٹریک ایسڈ - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - پیللا -
رس ٹاکس - سلفر - سیپیا - سلیشیا - شافی - سگریا - بخوجا - درمیرم - زرنکم
ایکونائٹ - وردنا قابل برداشت یہاں تک کہ مریض بوجہ شدت مرض بخونا نہ حرکات کرے
تمام امراض جو غصہ کے باعث ہوں :-

ایس - مریض نازک مزاج - اور خوش نہ ہونے والا - تنگ مزاج - امراض کا باعث غضب و
تنگ طبیعت :-

بلاڈ وٹا - لڑاکا - نہایت جوشیلا - چینا - مارنا - اور کاسنا :-
براہونیا - گریہ غصہ - چڑچڑا اور علیحدگی کی خواہش :-
کیمو ملا - ہمیشہ شقت مزاج - چڑچڑا - لڑاکا اور غصہ ور :-
کلکیریا کارب - دن کو طبیعت چڑچڑی - ہندی - کینہ ور غصیلا :-
کاربووج - جوشیلا اور چڑچڑا - غصہ میں مارنا اور کاسنا :-
کاسٹم - چڑچڑا - لڑاکا - بچہ میں اور طبیعت نہایت بُری :-
پیپر سلفر - خفیف بات پر خفا ہونا - ہندی - انتہائی طاقت کا استعمال قتل و حد آگ لگانے پر
مائل - خدمات سے چڑچڑا :-
لائکو پوڈیم - بیداری پر طبیعت نہایت چڑچڑی خفیف مخالفت بھی ناقابل برداشت ہندی - وارث
مزاج - بے پرواہ - پیش از جریان حیض معنوم :-
نکس و امیکا - بایوس - لڑاکا - ذکی الحس - مائل بسلامت - طبیعت شکایات مدہ ہو جو غصہ -
ڈرپک :-

نیٹرم میور - صبح کے وقت طبیعت کی خرابی نہایت غصہ و رگفتگو میں ہندی خفیف بانوں میں
جذبات کا بھگنا غصہ کے بذرات یا غم خوری سے شکایات کا پیدا ہونا - اظہار بہرہ دی کر نیہ خفا ہونا :-

ناٹھڑک ایسڈ سرکش۔ رٹے میں لکپی۔ غصہ کے دوران میں لعنت ملامت کرنا خفیف باتوں سے
نہایت دق ہونا۔ اُداس اور ضدی ۛ

قاسفورس۔ جوشیلا اور غصہ در جسمانی اور دماغی طور پر چڑچڑا۔ ناخوشگوار اثرات سے مرعوب
ہونا ۛ

پسٹلا۔ ہر شے سے بیزار۔ خاموش۔ جلدی غصہ کا آنا ۛ
رٹاکس بے صبر۔ ہر بات میں دق ہونا۔ مایوس۔ بیزاری طبیعت ۛ
سیدیا۔ دق ہونا اور ملامت کرنا۔ اعصابی چڑچڑاپن۔ کام کے متعلق بے پروائی ۛ
سلیشیا۔ سرکش۔ ضدی اور جوشیلا ۛ

سلفر۔ ضدی ہر بات سے مایوس۔ جوشیلا ۛ
تھو جیا خفیف باتوں پر غصہ آنا۔ لڑاکا اور جوشیلا ۛ
زیکم۔ شام کے وقت بیزاری۔ جوشیلا۔ ڈرپوک۔ دق ہونے پر چلانا۔ چڑچڑا ۛ
مفصلہ ذیل ادویہ کم استعمال ہوتی ہیں :-

انیم ٹارٹ۔ غصہ کے بعد علامات میں شدت۔ غصہ میں رونا اور چلانا ۛ
آرٹیکا۔ ذکی الحس غصہ سے شکایات کا بڑھنا ۛ
کالو سنڈھ۔ غصہ سے اشیاء کا پھینکنا۔ اسہال۔ تھو اور انقباض حیض بوجہ غصہ ۛ
ڈلکمارا۔ لڑاکا اور جلدی غصہ کا آنا ۛ

ڈیجیٹلس۔ شکی اور معنوم ۛ
جینسیم۔ معنوم اور عورت گزیر ۛ
گریفٹھ۔ چڑچڑا اور ڈھیٹھ ۛ
لیکٹیس۔ حسد اور نازک مزاج ۛ

سٹانی۔ سیکریا۔ دق ہو کر یا غمخوری سے شکایات کا پیدا ہونا۔ بچے کا چیزوں کیلئے چڑانا۔ اور جب اسے
دی جائیں۔ نوان کا پھینک دینا ۛ

وریریم۔ تمام رات چلانا اور لعنت ملامت کرنا۔ غصہ میں قسموں کا کھانا ۛ

خوف

ادویہ :-

ایکونائٹ - آرنیکا - بلادونا - برادینیا - کلکیہ یا کارب - کاسٹم - کاربودج - ڈیجیٹلس
جیلیسم - گریفائیٹس - ہیپرہائیوٹیمس - اگنیشیا - لاکو پوڈیم - مرکوریس - نیٹریم میورینکس - واسیکا - فاسفورس
پملا - سلفر - دیٹریم

ایکونائٹ - امراض بوجہ خوف - موت - تارکی - بھیڑ - بھوت - اور گرنے کا ڈر
بلادونا - خوف جودن کو زیادہ ہو - پانی اور بھوت پریت کا خوف - خوف سے پوشیدہ ہونا
ڈیجیٹلس - خوف مستقبل - خوف مرگ - ہر دم تکلیف دہ ہوتا ہے - قلب کی حرکت بند ہو جانے کا خوف
جس سے مریض ہلنا شروع کر دیتا ہے

گریفائیٹس - خوفزدہ - صبح کی وقت خوف زیادہ معلوم ہو
اگنیشیا - چوروں کا خوف و خطر ہر ایک تخفیف شے باعث خوف ہوتی ہے
لاکو پوڈیم - بزل - خوفزدہ تخفیف شور بھی خوف پیدا کرتا ہے
فاسفورس - موت کا خوف و خطر - خوف دورانِ باران - گویا ہر ایک گوشے سے ہیبت شکلیں
جھانک رہی ہیں

مفصلہ ذیل ادویہ بھی مفید ثابت ہوتی ہیں :-
آرنیکا - خوف مرگ - چھوٹے اور بزرگ کے کا خوف
کاربودج - جلدی خوفزدہ ہو جاتا ہے اور رات کو بھوتوں کا ڈر
کاسٹم - ڈرپوک - بستر پر تنہا لیٹنے سے خائف - ہیبت خیالات سے دماغ پر آگندہ - ہر دم کسی
ناخوشگوار واقعہ کی توقع - خوف مرگ

جیلیسم - بچات کا نہ ہونا - خوف مرگ - خوف کے بد اثرات
ہیپرہائیوٹیمس - سوتے وقت انتہائی خوف
ہائیوٹیمس - خوف کی وجہ سے سخت شکایات - تنہائی - چوٹ اور زہر کا خوف
مرکوریس - ہر دم ہی خوف رہتا ہے کہ وہ (عورت) خودکشی کر لے گی - خوف تنہائی - ہوش و حواس
کھوئے جانے کا خوف

نیٹرم میور۔ اسقاط اور کسی امر کے واقع ہونے کا خوف۔ ہوش و حواس کھوٹنے کا خوف۔ رعش
بعد از خوف

پلسٹلا۔ اسہال بعد از خوف۔ لوگوں سے خوفزدہ ہونا
سلفر۔ اس بات کا خوف کہ اس کی مالی حالت تباہ نہ ہو جائے
دریٹرم۔ خوف کی وجہ سے دم کا گھٹنا۔ سردی غش۔ پاخانہ کا بے اختیار خارج ہونا۔ خوف مرگ۔
آسانی سے خائف ہونا

اشک آلودگی

ادویہ۔
ایک نائٹ ایس۔ انٹیٹاٹ۔ بلاڈونا۔ براونیا۔ کلکیر یا کارب۔ کاربووج۔ کاسٹیکم۔ ڈیکی
ٹیس۔ گریفٹس۔ پیپر۔ کنیتیا۔ لائکو پوڈیم۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ رشاکس۔ سلفر
سیپیا۔ دریٹرم

ایس۔ مایوس اور خوفزدہ
کلکیر یا کارب۔ زندگی سے مایوسی اور زود رنج
کاسٹیکم۔ ناامید ہر شے کا تاریک پہلو دیکھ۔ دن کو گریہ میں مشغول۔ بچہ بات بات پر روئے
گریفٹس۔ مثل گریہ خفیف باتوں پر چنچنا۔ چلانا۔ سردی و سن کر رونا
کنیتیا۔ غم ہائی۔ گریہ و خندہ۔ علیحدہ بیٹھ کر رونا اور معمولی بات پر گرٹھتے رہنا
لائکو پوڈیم۔ دن بھر رونا۔ منوم اور نازک مزاج
نیٹرم میور۔ بلا سبب آوازی اور گریہ۔ گفتگو میں گریہ ہمیشہ مستقبل کا دھبیان
پلسٹلا۔ آوازی یا خوشی سے چنچنا۔ علامات مرض بیان کرتے وقت رونا۔ دق اور عاجز ہو کر
گریہ کرنا

رشاکس۔ گریہ مع کمزوری۔ شام کو زیادتی۔ تنہائی کی خواہش بلا وجہ رونا
سیپیا۔ بے اختیار رونا۔ زیادہ آوازی اور عموماً رونا۔ کھلی ہوئی پھرے سے زیادتی
سلفر۔ تسلی و ہمدردی سے گریہ۔ بیماری سے مرعوب ہو کر دن کو رونا

ورٹیم خیالی مصائب پر چھینا چلانا اور رونا
 یہ ادویات کم مستقل ہیں :-
 ایکونائٹ - اداسی اور خوشی یکے بعد دیگرے
 انٹیم - غصہ سے گریہ چھوٹنے سے - دوران کھانسی میں
 بلاڈونا - ناامید اور دق ہو کر چلانا
 کاربودج - اس خیال سے متاثر ہو کر کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے رونا
 ڈیجیٹلس - آپہن بھرتا اور رونا - معوم طبیعت - گٹائسن کر زیادتی علامات
 ہیمیرسلفر معوم - اداسی اور گھٹریوں رونا
 فاسفورس - سنی دگریہ یکے بعد دیگرے - نال برگریہ

اشتداد مرض بوجہ سکون

لیٹنے سے صعود مرض میں مفصلہ ذیل ادویات مستقل ہوتی ہیں :-
 ایکونائٹ - آرنک - ایس - انٹیم ٹارٹ - بلاڈونا - کیوملا - ڈولکمارا - ڈوروسرا - ہایو
 سائرس بگیس - لاکو پوڈیم - نکس و امیکا - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - پٹلا ٹیگس
 آرنک - لیٹنے پر مجبور ہو لیکن درد میں ترقی ہو تنفس میں ضیق
 ایس - بائیں کرڈ لیٹنے سے زیادتی خصوصاً علامات صدری میں تنفس اور کھانسی
 کیوملا - آنکھوں کے سامنے روشنی کا تھر تھرانا - متلی - چکر - اعصابی اور ان کا درد چت لیٹنے
 زیادتی - کسی چیز کے نکلنے میں تکلیف
 ڈولکمارا - سرور - کھانسی اور وجع مفاصل میں لیٹنے سے زیادتی
 ہایوسیمس - چت لیٹنے - لیکن کھانسی میں اضافہ ہو
 ڈوروسرا - بستر پر لیٹنے سے علامات میں ترقی - ٹاؤف پہلو پر نہ لیٹ سکے - کھانسی تیز ہو
 لاکو پوڈیم - بائیں پہلو پر لیٹنے سے کھانسی زیادہ ہو - دائیں پر کمی ہو - چت لیٹنے سے تنفس
 میں زیادتی - کھانسی اور علامات معدہ دائیں کرڈ لیٹنے پر زیادہ ہوں

فاسفورس چت لیٹنے سے نوٹیا کو آرام ہو۔ دائیں کروٹ لیٹنے سے اسپال۔ اور علامات
صدری بعد از نوٹیا آرام پائیں۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے دل۔ کھانسی۔ وجع مفاصل اور اسپال
میں زیادتی۔

پلسٹلا۔ دوران درد میں چت لیٹنے سے زیادتی۔ بائیں پہلو یا آسن کروٹ جسمیں درد وغیرہ نہ ہو
لیٹنے سے علامات بڑھ جائیں اور خواہش پیشاب۔ چت لیٹنے سے جلد جلد محسوس ہو۔
رس ٹاکس۔ لیٹنے سے کھانسی۔ وجع المفاصل اور عشتہ میں ترقی۔

مفصلہ ذیل ادویہ بھی قابل غور ہیں۔
ایکونائٹ۔ بخاریں لیٹنا ناقابل برداشت۔ اختلاج میں زیادتی۔ دائیں پہلو لیٹنے پر کھانسی
اور صدری علامات میں اضافہ۔ رخساروں پر پسینہ۔

ایٹیم ٹارٹ۔ ناوٹ پہلو پر لیٹنے سے زیادتی۔ درد گوش۔ سواشے دائیں کروٹ کے ہر طرح
لیٹنا باعث آفت ہو۔

بلاڈونا۔ دائیں جانب لیٹنے پر سرد درد اور کھانسی کا بڑھنا۔ درد جگر کی زیادتی۔
لیکیس پھیپھڑوں۔ بائیں بازو۔ کمر۔ ریڑھ کی ہڈی اور ضیق کا لیٹنے سے بڑھنا۔
لیٹے ہوئے بے اختیاری سے پیشاب کا نکل جانا۔

نکس و امیکا۔ کھانسی اور درد سینہ چت لیٹنے سے زیادہ ہوں۔ دائیں پہلو نہ لیٹ سکے۔
درد سرد اور پھیپھڑیں لیٹنے سے زیادہ ہوں۔

فاسفورک ایسڈ۔ جگر اور سینہ میں کھڑکھڑاہٹ بستر میں لیٹنے سے زیادہ ہوں۔
سیسیا چت لیٹنے سے سرد درد۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے کھانسی میں ترقی۔

اشتداد مرض بوجہ حرکت

مفصلہ ذیل ادویہ اس وقت تجویز کی جاتی ہیں جبکہ علامات مرض حرکت کرنے
سے بڑھ جائیں۔

آرنیکا۔ آرنک۔ ایس۔ بلاڈونا۔ برائیونا۔ کاربودج۔ کالوسنتھ۔ ڈیجیٹلس۔ جلیمیم
پیپر سلفر۔ اپیکا کواہنا۔ لیکیس مس مرکوریس۔ نائٹریک ایسڈ۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس

سلفز۔ سلیشیا۔ ورٹر۔ زکھم۔

بلاؤ و نا خفیف جھکے سے علامات کا بڑھنا۔ حرکت سے تنفر درد تو بلخ جو پیچھے جھکے سے زیادہ ہو۔ اٹھتے ہوئے پاؤں کا لڑکھڑانا۔ سر درد۔ چکر۔ درد چہرہ۔ اسہال۔ کھانسی کا حرکت سے بڑھنا۔ بعض آگے کی طرف جھک نہیں سکتا۔

برایوں یا خفیف حرکت پر بھی تمام علامات کا بڑھنا۔ چڑھنا۔ اٹھنا۔ جھکنا اور لڑکھڑانا حالت مرض میں زیادتی پیدا کرتا ہے۔

کالوسٹھ۔ سر بھڑانا۔ آگے کی طرف جھکنا اور ٹھلنا باعث تکلیف ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ پیٹ کا درد اور درد چشم حرکت سے زیادہ ہوتے ہیں۔

مرکبوریس۔ حرام مغز میں درد۔ جوڑوں اور گھٹنے کا درد۔ اختلاج۔ سینہ اور پھوڑے میں حرکت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔

نکس و امیکا۔ زینہ پر چڑھتے ہوئے کھانسی میں زیادتی۔ اٹھتے ہوئے چکر اور دائیں گڑھے کا درد بڑھ جاتا ہے۔ بستر میں کروٹیں بدلنے اور ٹھلنے سے داغی اور پیٹ کی علامات میں ترقی چلتی ہوئے لڑکھڑانا۔

سلفز۔ سر درد۔ کانوں میں شور۔ رانوں میں سوزش حرکت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چلنے میں سر۔ عرق النساء۔ ٹانگوں کے علامات اور ان کی جلن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھکے پر سر کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اٹھنے اور بلندی پر جاتے ہوئے علامات میں ترقی۔

سلیشیا۔ خفیف حرکت سے تمام علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے کی طرف جھکنا۔ بلندی پر چلنا اور ٹھلنا علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

مفصلہ ذیل ادویہ کی علامات مخصوصہ حرکت سے ترقی پاتی ہیں۔

ایس۔ سر درد۔ سردی۔ انیٹن اور وجع مفاصل حرکت سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ آگے جھکنا۔ ٹھلنا اور ہاتھوں کی خفیف حرکت زیادتی پیدا کرتی ہیں۔

آرنیکا۔ سر درد۔ سردی۔ سینہ پیٹ۔ انیٹن اور سوزش حرکت سے زیادہ ہوتے ہیں۔

کاربووج۔ خفیف حرکت سے تنفس منشی سے آتا ہے۔ بستر میں کروٹ بدلنے اور چلنے سے

علامات میں ترقی ۛ
 دھکی ٹلیس - حرکت ۛ حج القلب پیدا کرتی ہے - ہول ویرا کی خواہش - چلتے ہوئے دم اور ذریعہ
 اختلاج اور تشنج - سینہ - بازو اوپر اٹھانے سے کھانسی میں زیادتی ۛ
 جلیسیم - اس بات کا خوف کہ تاؤ قلیکہ متواتر حرکت نہ کی جائے - دل کی حرکت بند ہو جائے گی -
 سردرد - پوٹے اور ٹانگوں میں تشنج حرکت سے ترقی کر جائیں ۛ
 ہیمیر سلفر - زینہ چڑھنے اور اترنے میں کمر اور ٹانگوں میں درد - آگے جھکنے یا سر پھرانے سے
 سردرد میں تخفیف ۛ
 اسکا کو اہنا - خفیف حرکت سے متلی - امعاء میں سخت درد - سینہ - شانہ کی ہڈیوں کے درمیان
 کھچاؤٹ ۛ
 لیکیس - حرکت سے متفرق - چلنے سے ضیق اور دوران سر میں ترقی و حرکت سردرد علامات
 سینہ اور تنگی تنفس زائد ہوتے ہیں ۛ
 ٹائیٹیک البید - مقعد میں سوزش - چکر - اندام ہنانی میں جھنجھ اور ناگہانی دم کا رکنہ حرکت
 سے زائد ہوتا ہے - اختلاج اور دم کا رکنہ - سردرد - پیٹ درد اور سردی حرکت سے زیادہ
 محسوس ہوتا ہے ۛ

فاسفورس حرکت سے مفصلہ ذیل علامات میں زیادتی ۛ
 سردرد - دم کا رکنہ - پیٹ کی کمزوری - ناتوانی - اٹھنے میں درد اور چلتے ہوئے پاؤں کا لڑکھڑانا
 پکڑ - وجع القلب اختلاج - کھانسی - اور پاخانہ کا بے اختیار خارج ہونا ۛ
 در پیرم البم - متلی اور تھکے کا خفیف حرکت سے زائد ہونا - اٹھنے سے کھانسی کا بڑھنا سرد
 پیٹ کا درد - کمزوری اور دم کا رکنہ - حرکت سے بڑھ جاتے ہیں ۛ
 زنک - خفیف حرکت کر کے بے کر پندلیوں اور پاؤں تک درد پیدا کرتی ہے - چلنے سے
 چکر - سردرد - قولنج - سوزش - بے اختیاری سے پیشاب کا خارج ہونا - درد اٹھنے اور گھٹنے میں
 درد کمزور سینہ کا حرکت سے بڑھنا ۛ

صعود مرض بعد از دوپہر

ادویات

ایس۔ بلاڈونا۔ براونیو۔ کالوسنتہ۔ ڈکمارا۔ ڈیچی ٹیس۔ اگنیشیا۔ لائکو پوڈیم۔ مرکوریس۔
 نیٹرم سور۔ ٹائٹریک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پٹلا۔ رس ٹاکس۔ سیسیا۔ سیلیسیا۔ تھوجا۔ زنک
 بلاڈونا۔ ۳ بجے سے پہلے لے کر آدھی رات تک مرض میں اشتداد ہو۔
 لائکو پوڈیم۔ ۳ بجے سے پہلے لے کر ۸ بجے تک مرض میں اشتداد ہو۔
 پٹلا۔ ۳ بجے سے پہلے ۶ بجے تک علامات بڑھیں۔ شام کے وقت تمام علامات
 بالعموم زیادہ ہو جاتے ہیں۔

رس ٹاکس۔ ۲ بجے بعد از دوپہر بخار میں شدت۔ نوبتی بخار کا دورہ پانچ بجے بعد از دوپہر
 آتا ہے۔

سیسیا۔ ۳ بجے سے پہلے ۸ بجے تک علامات بڑھتے ہیں۔ بخار۔ چکر اور درد عموماً بڑھ
 جاتے ہیں۔

سیلیسیا۔ شام کے وقت اور رات کو عموماً صعود مرض ہوتا ہے۔ حرارت اور پیاس ۳ بجے سے ۵
 بجے (بعد از دوپہر) تک نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔

تھوجا۔ تقریباً ساڑھے پانچ بجے شام کے سردی کا محسوس ہونا۔ اسی وقت انوائمنز کا اہل
 ہونا۔ سر کی چوٹی میں بوجھ کی زیادتی۔

زنک۔ ۴ سے ۸ بجے شام تک سردی کا لگنا۔ ۳ بجے شام سے ۴ بجے تک درد دل۔ ٹیگینی۔ چکر۔ ٹکھو
 کی جلن۔ چھینکوں کا اتنا تشنگی۔ کمزوری اور خیالات مرگ کا زیادہ ہونا۔ بعد از دوپہر ہلکی ہوا زیادہ محسوس
 ہونا۔

مفصلہ ذیل ادویات کے خاص علامات بعد از دوپہر زیادہ شدت اختیار کر لیتے
 ہیں:-

ایس۔ ۳ سے ۴ بجے شام تک سردی محسوس ہوتی ہے۔
 براونیو۔ سردی ۴ بجے سے ۷ بجے تک۔ بار بار پیشاب کا آنا۔ عرق النساء اور دیگر عوارض کا
 سپر کے وقت زیادہ ہونا۔

کالوسنتھ ۴ بجے شام سے ۹ بجے تک۔ علامات کا بڑھنا ۛ
 ڈیجیٹلس ۴ بجے شام سے ۹ بجے تک صعد مرض ہوتا ہے ۛ
 اگنیشیا۔ سہ پہر سے شام تک دردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ۴ بجے درد شدت کے
 ساتھ ہوتے ہیں ۛ
 مرکوریس۔ ۵ سے ۶ بجے شام تک سردی کا لگنا۔ سہ پہر کے وقت خصلوں میں سردی
 کا احساس ۛ

نیپریم مبیور۔ سہ پہر میں پاؤں کا سرد ہونا اور حرارت و سردی کا ہونا ۛ
 نائٹرک ایسڈ۔ کھانسی۔ سردی۔ چکر اور نفخ کا بعد از دوپہر بڑھنا ۛ
 فاسفورس۔ ۲ بجے شام سے ۶ بجے شام تک جلد عوارض میں ترقی ہوتی ہے ۛ

صعد و مرض بعد از نیم شب

اوویات
 آرٹک۔ براؤنیا۔ کلکیریا۔ کارب۔ ڈرو سراجلیسیم۔ مرکوریس۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔
 پوڈوفالٹم۔ رس ٹاکس۔ سلفر سلیشیا۔ فموجا
 آرٹک۔ ایک سے دو بجے تک عوارض میں اشتداد۔ بے چینی۔ اہمال حرارت۔ بردوت۔
 اور تشویش کا زیادہ ہونا ۛ

ڈرو سراج۔ مثلی کا زیادہ ہونا۔ کھانسی۔ حرارت اور چیرنے والے دردوں کا بڑھنا ۛ
 نکس و امیکا۔ ۳ بجے صبح سے ۴ بجے تک علامات میں زیادتی۔ کھانسی۔ درد گروہ۔ پسینہ
 کا زیادتی سے ہونا ۛ

فاسفورس۔ کھانسی۔ زکام اور عرق کا بڑھنا ۛ
 پوڈوفالٹم۔ ۲ بجے صبح اہمال کا پیٹ درد سے آنا۔ ۵ بجے صبح سے ۹ بجے تک انتڑیوں
 میں تشنج ۛ

رس ٹاکس۔ بعد از نصف شب تمام علامات میں زیادتی بھینی۔ تشنج اور خارش میں زیادتی ۛ
 سلیشیا۔ بعد از نیم شب علامات کا بڑھنا۔ ایک بجے صبح سے ۶ بجے تک سردی کا محسوس ہونا۔

۲ بجے صبح بیدار ہو جانا۔ ۶ بجے صبح کو پسینے کا آنا۔ ۶ سے ۸ بجے صبح تک اسہال کا جاری ہونا۔
 نخوجا۔ سردی۔ سرور و اور وج مفاصل کا شدت سے ہونا۔ ۲ بجے صبح سے ۴ بجے تک سرکی
 چوٹی میں دباؤ کا احساس اور سردی کا لگنا۔
 مفصلہ ذیل ادویات میں بعد از نیم شب صعو مرض کم ہوتا ہے :-
 کلکیر یا کارب۔ ۲ بجے صبح سے ۳ بجے تک علامات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ۳ بجے کے بعد
 پسینہ زیادتی سے آتا ہے اور مریض سو نہیں سکتا۔
 جلیسیم۔ خوابوں کا آنا۔
 مرکورس۔ تشنگی۔ متلی اور پاتی کا بکثرت منہ سے خارج ہونا۔ حرارت اور بھٹی چیزوں کے
 لئے بہت زیادہ خواہش۔ بعد از نیم شب تمام علامات بدتر ہو جائیں۔
 سلفر۔ ۴ بجے صبح سے ۵ بجے تک صعو مرض ہوتا ہے۔ بیداری کے بعد ۶ بجے صبح سے
 ۷ بجے تک پسینہ کا آنا۔ دو بجے صبح تک کھانسی کا ہونا۔

صعو مرض بعد از خواب

ادویات
 ایکونائٹ۔ آرنیکا۔ آرنک۔ ایس۔ کاربودج۔ کاسکم۔ بیپر سلفر۔ لیکیمس۔ لائیڈ پوڈیم
 فاسفورس۔ ایسڈ پٹلا۔ رس ٹاکس۔ سلفر
 لیکیمس۔ بعد از خواب علامات کا مجموعی طور پر زیادتی پانا۔ اور دوران خواب میں علامت
 کا وارد ہونا۔
 سلفر۔ بعد از خواب چونک پڑنا اور چھینا۔ خوفزدہ بیدار ہونا بعد از خواب اسہال کا جاری
 ہونا۔

مفصلہ ذیل ادویات میں بعد از خواب صعو مرض کم درجہ کا ہوتا ہے :-
 ایکونائٹ۔ سونے کے بعد بخار ناقابل برداشت ہوتا ہے بخوابوں سے چونک پڑنا۔
 آرنک۔ بعد از خواب تھکن محسوس کرنا اور نیند میں چونک پڑنا۔
 کاربودج۔ بعد از خواب مانگوں اور پاؤں کا زیادہ سرد ہونا۔

کاشکم - بیداری پر علامات کا بڑھنا - بیٹھنے پر مجبور ہونا - نیند کے بعد اڑیوں میں تناؤ اور کھچاؤ کا رہنا :

ہمیر - نیند میں ڈرنا اور نیند کے بعد ضیق کا وارد ہونا :
لائکو پوڈیم - جھوک اور تھکان کا محسوس کرنا - بیدار ہو کر مارنا اور لڑنا :
فاسفورک ایسڈ - یائوس خیالات کی کثرت - بیداری پر حرارت اور جھوک کا زیادہ ہونا :

فاسفورس - تشویش اور تھکان کا احساس ہوتا ہے :
پلسٹا - بے صفی - کاپلی اور تھکان بعد از خواب زیادہ ہوتی ہیں :
رس ٹاکس - کمزوری - تشویش - بچپنی - کپکپی کی ترقی اور ایسا معلوم ہوتا ہے - کہ مریض ہرگز نہیں سویا :

صعود مرض بپاعت دباؤ

ادویات

آرنک - ایس - براہونیا - کار بوریج - ہمیر سلفر لیکیمس - لائکو پوڈیم - مرکوریس نیٹریم
ٹائٹریک ایسڈ ٹکس و امیکا - سلیشیا - سٹانی سیگمیریا -

ایس - مریض خفیف چھوٹے کو بھی محسوس کرتا ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بستر کی چادر بھی اس کو نہ چھو جائے - بہتر مویں درد معلوم ہوتا ہے - بچے کو اگر چھو جائے تو وہ اڑ جاتا ہے :

ہمیر سلفر نہایت ذکی الحس ہوتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی چیز اسے نہ چھو جائے سر کی جذبات چشم - گردن کی جگہ - گردن کے پٹھے اور بیرونی گلے کو اگر چھو جائے تو تکلیف زیادہ معلوم ہوتی ہے

لیکیمس - تھوڑا سا چھونے سے علامات بڑھ جاتی ہیں اور جب جگہ چھو جائے - وہاں نیلے اور سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں - گلے کو دبائے سے کھانسی پیدا ہوتی ہے اور پیٹ اور گلے کا چھوتا مریض برداشت نہیں کر سکتا :

لائکو پوڈیم جسم کے نرم حصے نہیں چھوئے جاسکتے چت لباس یا لباس کا بوجھ ازادی علامات کا باعث ہوتا ہے اور مقام جگر میں خصوصاً زیادہ احساس ہوتا ہے :

سلیشیا۔ آخری پسلی کے پچھلے مقام پر چھوٹا نہیں جاسکتا۔ تھرمیڈ اور چند بیکو دبانے سے مرض کو ترقی ہوتی ہے جس کو ٹ مریض سوتا ہے۔ وہ طرف سو جاتی ہے۔ چھوٹے سے سر۔ درد دندان چشم۔ جگر۔ کہتی اور اندام نہانی کی تخلیفات ترقی کر جاتی ہیں۔
 سٹانی سیکریا۔ چند بیک کا سطحی درد۔ رحم اور پچھڑے دبانے سے بدتر ہوتے ہیں۔
 مفصلہ ذیل ادویات کے علامات مخصوصہ دبانے سے شاید ہو جاتے ہیں اور ان کا تشا
 دوسرے درجہ پر ہے :-

ارسنگ چند بیک۔ معدہ اور پیٹ کے علامات دباؤ سے زیادہ ہوتے ہیں۔
 کاربوونج۔ چند بیک۔ جگر اور سفرد و آنتوں کا درمیانی حصہ دباؤ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے
 نیٹریم صوپر۔ کپڑے ناقابل برداشت۔ بال چھوٹے سے گرنے لگتے ہیں۔ ناک۔ جڑا۔ دانت۔ حرام مغز۔
 اور پیٹ کے بالائی حصہ کو دبانے سے علامات کی زیادتی ہوتی ہے۔
 ٹائٹریک ایسڈ۔ ہاسوں کو چھوٹے سے خون کا جاری ہونا۔ دانوں کا ابھرنے۔ آنکھ کی سوزش۔ دانت۔
 پیٹ سفرد و دہن وغیرہ چھوٹے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔
 ٹکس و امیکا۔ چست کپڑے۔ مقام جگر پر زیادہ سوزش پیدا کرتے ہیں۔ ہاتھ سے چھونا تشیخ کا باعث
 ہوتا ہے۔ معدہ۔ جگر۔ چند بیک اور پیٹ کے علامات دبانے سے برعکس جاتے ہیں۔

انحطاط مرض بوجہ دبانے کے

مفصلہ ذیل دس ادویہ عموماً مشیذ ثابت ہوتی ہیں :-
 ایس۔ براہوینیا۔ چائنا۔ کالوستتھ۔ ڈروسمرا۔ ٹوکمارا۔ گریٹاٹس۔ پیٹلا۔ رٹاکس۔ سلیشیا
 براہوینیا۔ دبانے سے عام طور پر آرام محسوس ہوتا ہے۔
 چائنا۔ چھاتی سے لے کر ستر تک درد اور بوجہ۔ آگے جھکے مقام جگر کا دباؤ کم ہوتا ہے۔
 کالوستتھ۔ سختی سے دبانے اور مضبوط پکڑنے سے درد کو آرام محسوس ہوتا ہے۔
 ڈروسمرا۔ مریض کھائے اور چھینک مارتے وقت چھاتی کو ہاتھوں سے تھام لیتا ہے۔ چہرہ۔ پیٹ اور چھاتی
 کا درد دبانے سے کم ہوتا ہے۔
 سلیشیا۔ اگرچہ بہت سے درد دبانے سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن سرور کو دبانے سے یا زور سے

باندھنے سے آرام ہوتا ہے ۔

مفصلہ ذیل اوروں میں علامات مخصوصہ دبانے سے کم ہوتی ہیں ۔

اٹس دبانے سے سر درد آرام ہوتا ہے ۔ اگرچہ باقی تمام علامات بزر ہو جاتی ہیں ۔

ڈنکنا یا پشت اور سینہ کے در کو دبانے سے آرام ہوتا ہے ۔

گریفائیس ۔ درد قوی کو دبانے سے آرام ہوتا ہے ۔ مقام جگر اور پیٹ میں تھڑے سے دباؤ یا چپٹ کرپے

سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے ۔

رسٹاکس ۔ عرق نہ نکالنے کو دبانے اور رگڑنے سے آرام معلوم ہوتا ہے ۔ ٹانگوں ۔ کمر ۔ پشت اور

چوڑے کا درد دبانے سے کم ہوتا ہے ۔

تشنگی

ادویات ۔ ایکو نائٹ ۔ آرنیکا ۔ ارنک ۔ بلاڈونا ۔ براہونیا ۔ کلکیرو یا کارب ۔ گیوملا ۔ چائنا ۔

پوچی ٹیلیس ۔ پاپاٹیس ۔ یلیکس ۔ مرکپورس ۔ نکس و امیکا ۔ نیٹرم میور ۔ ٹائٹریک ایسٹ ۔ فاسفورس ۔

پلٹو واکلم ۔ رسٹاکس ۔ سلفر ۔ سیلیشیا ۔ دیٹریم البم

یہ علامات بہت سی ادویات اور امراض میں پائی جاتی ہے ۔ اگر پیاس کے لئے کوئی خاص اور تین

وجہ نہ ہو تو یہ ایک اہم علامت ہوتی ہے ۔ لیکن جب حرارت تیز ہو رہی ہو یا گرمی میں کوئی شخص کام کر رہا ہو ۔

یا ڈیٹیلیس کا مریض ہو تو اس شخص کیلئے یہ علامت ایک معمولی بات ہے اور ایسی حالت میں پیاس کا فائدہ علامت

میں کوئی غیر معمولی درجہ نہیں رکھتا ۔

ایکو نائٹ جلن ۔ نہ بجھنے والی پیاس ۔ کڑھی اشیاء کے لئے خواہش ۔

ارنک ۔ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ۔ جرمہ جرمہ کر کے پیئے اور اکثر پیئے ۔ سینہ میں تشنگی کا غلبہ ۔ کھٹی اشیاء

کاٹی ۔ دودھ اور شراب کی خواہش ۔

براہونیا ۔ پیاس کی شدت اور اندرونی طور پر جلن ۔ دیر کے بعد زیادہ مقدار میں پانی پیتے ۔ گرم اشیاء

کے پینے سے آرام ہو ۔

کلکیرو یا کارب ۔ پیاس جو پانی پینے سے کم نہ ہو ۔ رات کو تکلیف زیادہ ہو ۔ سرد اور کھٹی اشیاء کے

پینے کی خواہش ۔

کیمو ملا۔ سرد پانی کی خواہش۔ کافی پینے کے بعد کمزوری کا لاحق ہونا۔ اور جی تھلانا۔ رات کے دودھ کو گرم پانی سے آرام۔ کھٹی چیزوں کی خواہش

چائنا۔ لرزہ سے اول اور بعد اور دوران پسینہ میں پیاس۔ پانی تھوڑا تھوڑا اور اکثر پیئے ۛ
 ڈیجی ٹیلیس۔ گھٹانا پیاس کا احساس۔ لب خشک۔ کڑوی اور کھٹی چیزوں کی خواہش ۛ
 مرکورس۔ زبان تر لیکن سرد اشیاء کیلئے شدت کی پیاس ۛ

نیٹرم میور۔ پیاس کا گھٹانا احساس۔ لیکن پانی پینے کی خواہش نہ ہو۔ تمام کوریادتی علامات کھٹی اور کڑوی اشیاء اور دودھ کی خواہش۔ کافی وغیرہ سے نفرت ۛ

فاسفورس۔ نہایت سرد اشیاء پینے کی خواہش اور معدہ میں تادفیکہ و گرم نہ ہو جائیں۔ شکم میں ہوتی ہے۔ گرم ہونے پر وہ شے بذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔ خوشگوار اشیاء مرغوب خاطر ہوتی ہیں۔ گرم دودھ۔ چائے۔ کافی وغیرہ سے نفرت ہوتی ہے ۛ

ریٹاکس۔ رات کو گھٹانا خشک ہونا اور سرد اشیاء کی خواہش ۛ

سلفر۔ کثرت پیاس و قلت غذا شراب کی خواہش ۛ

ورٹیم الیم۔ برف کی طرح سرد اشیاء کی خواہش۔ جو اکثر لیکن کم مقدار میں کھائی جاتی ہے ۛ
 مفصلہ ذیل ادویہ خاص علامات رکھتی ہیں :-

آرسیکا۔ بغیر سجا رکے سرد پانی کی خواہش۔ سرکہ جیسی اشیاء طبیعت نائل ہوتی ہے ۛ

بلاڈوٹا۔ شدت پیاس لیکن پانی سے دم گھٹتا ہے۔ یہوں یا سکتجین کی خواہش ۛ

پایوسیس۔ پانی سے خوف۔ نہ کم ہونے والی پیاس۔ کوئی چیز نگل نہ سکے ۛ

لیکیس۔ دائمی پیاس لیکن پانی پیتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ پانی سے بیماری ۛ

نکس دامیکا۔ لرزہ میں پیاس۔ صبح کے وقت شراب و سکران کی خواہش ۛ

نائٹریک ایسڈ۔ صبح کے وقت شدت کی پیاس ۛ

پوڈوفاکٹم۔ سرد پانی کی بڑی مقدار کے لئے خواہش۔ کھٹی چیزیں مرغوب ہوتی ہیں ۛ

خوراک سے پانچ روزہ خوراک اشتداد مرض

علامات بالا مفصلہ ذیل ادویہ میں پائی جاتی ہیں :-
 آرٹک - انٹیم ہارٹ - بلاڈونا - برابوینا - کیوٹلا - کلیریا کارب - چائنا - سکار بوچی - ٹیکس - کاسٹیکم -
 کالوسنتھ - گریفائٹس - ہاپوسس - لیکپس - لائکو پوڈیم - نکس و امیکا - نیٹرم میور - نائٹریک ایسڈ - پیٹلا -
 پوڈوفالیم - رٹاکس - سلفر پیپیا - سلیٹیا - ٹھوچا - زنگم - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ -
 آرٹک - صبح ہمار طبیعت بہتر معلوم ہوتی ہے - ذائقہ تلخ - متلی - بعد از خوراک پانچ روزہ لرزہ میں
 شدت

برابوینا - بعد از خوراک بہت سی علامات کا ظاہر ہوتا - معدہ میں بعد از خوراک دباؤ اور پھجکا معلوم
 ہوتا - پھلی - بہتر ترکاریاں - پنیر وغیرہ کھانے سے اشتداد علامات - کھانے کے بعد کالی کھانسی کا شدت
 سے ہوتا

کلیریا کارب - کھانے کے بعد جی متلانا اور معدہ میں دباؤ - دانت کا درد - کھانسی - علامات قلبی -
 پانچ روزہ میں شدت

کاسٹیکم - روٹی - چربی غذا اور تازہ گوشت کھانے سے شکایات پیدا ہوتی ہیں :-
 کالوسنتھ - قلیل خوراک سے اسہال کا جاری ہونا - آلو کھانے سے قلع پیدا ہو - مروڑ اور نفخ بعد از غذا
 کھانے پینے سے درد میں زیادتی :-

لیکیمس - چکرستی - غنودگی - دم کشتی - حرارت کا بڑھنا - معدہ کا دباؤ - اسہال خوراک سے پہلے
 یا بعد از خوراک زیادہ ہو جاتے ہیں :-

لائکو پوڈیم - ایک وہ نمٹوں سے طبیعت کا سیر ہو جانا - غنودگی - معدہ اور جگر میں دباؤ - کھانے کے بعد
 خوراک کا نکل جانا - پیاز - پھلی وغیرہ کے بد اثرات :-

نکس و امیکا - کھانے کے بعد غنودگی - کھانے کے بعد کپڑے کے بندوں کا ڈھیلنا - بھنی سے
 خلل و اغ - ذائقہ کٹھا - دباؤ کھٹی دکاروں کا بعد از خوراک وار دھونا - کھانسی کا بڑھنا :-

نیٹرم میور - ہمار یا خالی پیٹ ہمیشہ طبیعت درست معلوم ہوتی ہے - کھانا کھاتے وقت چہرہ پر عرق -
 متلی - اختلاج اور صفراء کی زیادتی :-

فاسفورس - کھانے کی ابتدا سے انتہا تک درد کا لاحق ہوتا - سرد خوراک کی خواہش متلی - بعد از

خوراک معدہ بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے :

پسٹلا مٹھائی۔ مرغز غذا چربی۔ پیاز وغیرہ کھانے سے جو شکایات پیدا ہوں ان کی شہمت ہے :
 سلفور پانی زیادہ پینا۔ خوراک کم۔ نھوڑی سی غذا سے شکایات کا بڑھنا۔ دودھ مضمت نہیں ہوتا :
 سیلیا کھانا کھاتے ہی دردوں کا بڑھنا۔ روٹی۔ دودھ۔ چربی اور کھٹی چیزوں سے شکایات کا بڑھنا :
 سلیشیا۔ شام کی غذا کے بعد پاؤں کا برت کی طرح سرد ہونا۔ اور پیٹ میں سردی کا احساس۔
 کھٹے ڈکار۔ معدہ کا بھرا ہوا محسوس ہونا۔ کھانے کے بعد ڈکاروں کے ساتھ پانی خارج ہونا :
 زنگم۔ دودھ اور شراب موافق نہیں ہوتے۔ شکر کھانے کے بعد ڈکاروں کے ساتھ پانی کا نکلنا :
 مندرجہ ذیل ادویات میں علامت متذکرہ بعنوان دوسرے درجہ برآتی ہے :
 انٹیجیم ٹارٹرا۔ معدہ کے دباؤ کو کھانے سے آرام آتا ہے۔ لیکن کھٹی چیزوں کے کھلنے سے
 وہ پیدا ہوتا ہے :

بلا ڈونا۔ کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ معلوم ہوتا ہے اور منہ کا ذائقہ بڑھا ہوا ہوتا ہے :
 کیمو ملا۔ کھانے کے دوران اور بعد میں فرق اور چہرے پر حرارت کا محسوس ہونا۔ چکر متلی اور بعد
 از خوراک شکم کا اچھا رہا :

چائنا۔ غنودگی۔ بعد از خوراک اضطراب۔ سر درد اور معدے کا بھرا ہوا معلوم ہونا :
 کار بو دج۔ درد کے خوف کی وجہ سے کھانے سے انکار۔ بعد از خوراک سر درد۔ معدہ میں صفرا۔
 بھاری پن۔ گرم ڈکاریں اور بن اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ بعد از خوراک پیٹ پھٹ پڑ گیا۔ کھن۔
 چربی۔ مچھلی اور مٹھائی مضمت نہیں ہوتی :

گریٹاٹس۔ شیریں چیزوں سے جی کا متلاتا اور ان سے نفرت۔ گرم اشیاء کا مضمت نہ ہونا :
 ہائیوٹیس۔ کھانے کے بعد کھکی اور تشنج۔ پیٹ میں قراقر کا ہونا :
 نائٹرک ایسڈ۔ ذائقہ تلخ۔ معدہ میں بھاری بوجھ۔ کمزوری حرارت اور اختلاج بعد از خوراک۔ صفرا

سے صفرا کا پیدا ہونا۔ چربی غذا متلی اور صفرا پیدا کرتی ہے :
 فاسفورک ایسڈ۔ معدہ میں دباؤ اور کھانے کے بعد کھٹی ڈکاروں کا آنا۔ حامص اور کھٹی اشیاء
 کے کھانے سے اسہال آتے ہیں :

وٹریاٹل۔ کھانے کے بعد بھوک کا احساس۔ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد متلی اور تھ۔ اسہال
 اور کھٹے ڈکار بعد از اسہال :

رٹاکس - کھانے کے بعد غنودگی اور متورم ہونا
تھوہا - تمباکو - شراب - چائے - چربی - پیاز وغیرہ سے جو شکایات پیدا ہوں - انہیں مفید ہے

جلن والے درد

اوویر - ایکونائٹ - ارنیکا - ارنک - ایس - بلاڈونا - برابونیا - چائنا - کاربون - کاکم
کالوسنتھ - ڈنگمار - ڈروسرا - گریفائٹس - اگنیشیا - لیکسیس - لاکو پوڈیم - مرکوریس - نیٹرمیو
نائٹرک ایسڈ - نکس و امیکا - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - رٹاکس - سلفر - سیپیا - زنگم
سلیشیا

ایکونائٹ - اندرونی طور پر گرمی کا احساس - لب اور زبان میں درد جلن کے ساتھ
آرنک - جلن والے درد - گرمی پہنچانے سے آرام پاتے ہیں - ذریدوں - سر - آنکھوں -
ناک - ذہل - رطوباتی جھلی - جگر - رحم - پشت - حرام مغز اور جوڑوں میں جلن کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے
بلاڈونا - آنکھ - ناک - معدہ - پیشاب اور چھاتی میں جلن کا احساس
برابونیا - سر - آنکھ - پسلیوں - جگر - پیٹ - پانخانہ - پیشاب اور چھاتی میں جلن
گریفائٹس - سر - آنکھ - زبان - معدہ - پیٹ - اندام نہانی - ہاتھ اور پاؤں کے نوے جلتے ہیں
یا ان میں جلن کے ساتھ درد ہوتا ہے

مرکوریس - عموماً جلن والے یا ڈنگ مارتے ہرے درد - سینک سے آرام پاتے ہیں - اندرونی
طور پر جلن کھجلائے کے بعد جلن

نیٹرمیو - سورج یا آگ کی گرمی سے درد کا بڑھنا - کھلی ہوا یا سرد پانی سے درد کا کم ہونا - چنیا
آنکھ - کان - ناک - گھٹا - معدہ - معام - پیشاب کی نالی - اندام نہانی - ہاتھ اور پاؤں میں درد کا جلن کے
ساتھ ہونا

نائٹرک ایسڈ - عام طور پر جلن - ڈنگ مارتا ہوا اور مقامی درد
نکس و امیکا - اندرونی جن - سرگھو - معدہ - پیٹ - سفرہ - پشت - شانہ اور سینہ میں جلن کے ساتھ
درد محسوس ہوتا ہے

فاسفورس - عام طور پر چلتا ہوا - سر - سفرہ - چھاتی اور کوڑی کے نیچے محسوس ہوتا ہے

فاسفورک ایسڈ۔ پچھلے حصہ جسم میں درد جلن کے ساتھ جگر گلو اور چھاتی میں بالعموم جلن ہوتی ہے۔
 پائیلو۔ آئکھ گلو۔ مثانہ۔ پیشاب کی تالی۔ پاؤں۔ سینہ اور دل میں جلن ہوتی ہے۔
 رسٹاکس۔ جلن اور ڈنگ مارتا ہوا اور دبائیں پہلو میں محسوس ہوتا ہے۔
 سلفر۔ عام طور پر تمام جسم میں جلن اور گرمی۔ تمام جلد میں جلن اور بالخصوص ان حصوں میں جنہ پر کہ
 مریض لیٹا ہوا ہو چند یا۔ پیشانی۔ تنوے۔ آئکھ۔ پوٹے۔ نتھنے۔ چہرہ۔ گلو۔ معدہ۔ پیٹ۔ پیشاب کی
 تالی۔ سفرہ۔ بواسیر کے جہاز۔ شانوں کے درمیان ہاتھ اور انگلیوں کے سرے۔ گھٹنے اور پاؤں میں
 خاصکرات کو جلن محسوس ہوتی ہے۔
 سیپیا۔ اندرونی گرمی۔ جسے کھلی ہوا میں آرام محسوس ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں یکے بعد دیگرے
 گرم اور سرد ہوتے ہیں۔
 سلیشیا۔ پاؤں کے ناول اور پھوڑوں میں جلن عام طور پر جلن اور ڈنگ مارنے والے دروں
 کا احساس۔
 زونکم۔ پشت۔ تمام حزام مغز۔ بائیں بازو۔ دائیں کلائی۔ بائیں چوڑے۔ تنوے۔ جلد اور قبل میں
 جلتا ہوا درد۔
 وہ جلتا ہوا درد جو مذکورہ بالا ادویات میں نہیں پایا جاتا۔ مفصلہ ذیل ادویات کے تحت
 میں ہے۔
 ارنیکا۔ پاؤں۔ معدہ۔ دل۔ سینہ۔ گلو۔ لب۔ آئکھ اور داغ میں جلتا ہوا درد۔
 ایلس۔ در و عموماً جلتا اور ڈنگ مارتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
 چائٹنا۔ ایک ہاتھ میں جلن اور دوسرا طرف کی طرح سرد۔ جلد میں اور دُبل میں جلن۔
 کاربووج۔ آگ کی طرح جلن کا ہونا۔ پیاس باکل نہیں ہوتی۔ سردی سے آرام کا محسوس
 ہونا۔
 کاسکم۔ عام طور پر جلتا ہوا درد۔
 کالوسنتھ۔ پیشانی میں دائیں طرف جلن۔ پوٹے۔ چہرہ۔ زبان۔ پشت۔ سفرہ اور پاخانہ کرتے وقت
 پیشاب کی تالی میں جلن۔ رحم میں دائیں جانب اور سائٹکانڈ اور ٹانگ میں بھی جلن معلوم ہوتی ہے۔
 ٹولکمارا۔ پیشانی۔ فم۔ معدہ۔ سفرہ۔ مقعد۔ پاؤں۔ مسوڑھے۔ پشت اور جسم کی نالیوں میں جلن۔
 ڈوروسرا۔ مرکز سینہ اور گلو میں جلن کا محسوس ہونا۔

اگنیثیا۔ ایک رخسار درکان میں سرخی جلن کے ساتھ۔ اندام ہنائی اور پاؤں میں جلن۔ سر۔ آنکھ۔
 فم۔ معدہ۔ معدہ۔ پیشاب کی نالی اور اڑی میں جلن۔
 لیکیمس۔ سر کی چوٹی۔ آنکھ۔ منہ۔ منقعد۔ رحم۔ کلائی۔ معدہ اور چلے سے بیکر پاؤں تک گلو۔
 ہاتھ اور تنوں میں جتنا اور ڈنگ مانتا ہو اور۔
 لاکو پوٹیم۔ ایک پاؤں گرم اور دوسرا سرد۔ نہان پر آبوں میں جلن۔ انگوٹھے اور انگلیوں میں
 جلن۔ معدہ۔ منقعد۔ پچھلے حصہ جسم کے اعضاء۔ رحم اور نخوں میں درد۔

چیتا ہوا درد

اوویر۔ ازیکا۔ بلاؤ ونا۔ کلگیر یا کارب۔ چائینا۔ کالوسنتھ۔ ڈرو سرا۔ ہاپوسیس۔ لاکو پوٹیم۔
 مرکورس۔ نکسوامیکا۔ میٹریم سیور۔ پٹلا۔ سلفر۔ سلیشیا۔ شافی سگریا۔ وریٹریم البم۔ زنگم
 پلاؤ ونا۔ بچ دان وعضلات پیٹ۔ معدہ۔ چہرہ اور سر میں دائیں جانب چیتا ہوا درد محسوس
 ہوتا ہے۔

کلگیر یا کارب۔ چیتا ہوا درد جو اندر سے باہر کی جانب آتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور مقام جگر۔ پشت۔
 معدہ اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔

کالوسنتھ۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ امعاء کو چاقو سے کاٹا جا رہا ہے۔ پیشانی۔ سر کے بائیں
 طرف۔ آنکھ۔ کان۔ معدہ۔ پیٹ اور سینہ میں درد ہوتا ہے۔

ڈرو سرا۔ پنڈلیں اور دائیں جانب اکثر چیرے والے درد کا احساس۔

ہاپوسیس۔ جڑوں۔ سینہ اور پیٹ میں چیرنے والا درد۔

لاکو پوٹیم۔ شانہ۔ منقعد۔ متناسل۔ پیٹ۔ سینہ۔ چوٹی اور جگر میں چیتا ہوا درد۔

مرکورس۔ عام طور پر درد ہکا۔ بھمی مارنے والا اور کھن کے ساتھ ہوتا ہے۔ معدہ۔ سے آگے۔

بک وریڈگی کا حصہ۔ آنکھ۔ پیٹ اور امعاء میں درد ہوتا ہے۔

نکسوامیکا۔ ناف کے مقام پر چیتا اور میں مارنے والا درد۔

پٹلا۔ امعاء۔ گلو۔ پیٹ۔ اعضاء جگر۔ سینہ۔ پشت اور ذیل میں چیتا ہوا درد۔

سلیشیا۔ دائیں بچہ پڑے۔ خبیثہ۔ چھاتی۔ شانہ۔ گھٹنوں۔ معدہ۔ منقعد اور ناف کے مقام پر

چیرنے والے درد +

ورٹیم الیم۔ انیس چھاتی ہیں درد۔ تو لچ مرڈ اور چیرتے ہوئے درد کیساتھ +
ونکم۔ دوران جیس میں کمر اور ناف کے مقام پر درد۔ انیس آنکھ اور کان۔ ناک۔ منہ۔
سفرہ۔ گردہ اور پیشاب کی نالی میں درد +

چیرتا ہو اور مفصلہ ذیل ادویات میں بھی پایا جاتا ہے :-
آرنیکا۔ گردہ میں اس طرح درد ہوتا ہے کہ گویا کوئی تیرتلا سے کاٹ رہا ہے۔ درد دندان
فم معدہ اور جگر میں درد +

چائنا۔ ہوا خارج ہونے سے پہلے چیرتا ہو اور پیٹ کے تمام اطراف میں جاری ہوتا ہے
تلی میں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیر رہا ہے۔ اور وہ نہایت سخت ہو گئی ہے +
سٹافی۔ منکر یا۔ نیز دھار والے آلات کے گھاؤ کے لئے مفید ہے پیٹ اور ٹانگوں
میں درد۔ عمل جراحی کے بعد زخموں میں درد +

در دین میں مقام درد دھونسا ہوا دوکھن و الاعلوم ہو

ادویات۔ آرنیکا۔ بلاڈونا۔ چائنا۔ ڈروسرا۔ ہیپرنکس و امیکا۔ ٹیٹرم میور۔ فاسفورس
سٹاکس۔ سلفر۔ سیلیا۔ ونکم۔

آرنیکا۔ ضرب اور مومن کے بد اثرات کو دور کرنے کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ عام
طور پر درد دوکھن والے معلوم ہوتے ہیں۔ دماغ معدہ اور کھن میں سرد دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔
بلاڈونا۔ دوکھن چوٹوں میں حلق سے کان تک پیٹ اور کمر میں درد معلوم ہوتا ہے۔
چائنا۔ چھوٹے سے درد کا اثر دھنا لیکن زور سے دبانے سے دوکھن کم ہوتی ہے۔ تمام جوڑ
ہڈیاں۔ اور غلاف ہڈی میں درد۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ تمام جسم دھونسا ہوا ہے۔

ڈروسرا۔ کنپٹی اور دانیس کنپٹی کی جلد میں دوکھن۔ جھرو اور خند دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔
ہیپرنکس۔ پیشاب کی نالی۔ آلات تناسل۔ سفرہ اور رتھن کے درمیانی جگہ۔ سینہ اور تمام
اعضاء میں دوکھن۔ ران کے بیرونی پٹھے دھونستے ہوئے معلوم ہوئے ہیں۔

ونکم و امیکا۔ تمام جسم میں دوکھن پیٹ ذوالکس مقام جگر میں۔ پیٹ اور اس کے
اطراف۔ سینہ۔ جوڑ مثانہ میں دوکھن۔ دماغ۔ کمر گردن پشت۔ اعضا اور پیٹ کا پھیلا حصہ۔

دھونسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

تیسرے میوے۔ ناک کی بائیں جانب تھتھے۔ بازو۔ فم معدہ۔ سینہ۔ پاؤں کے جوڑ جگہ۔ تالو
اندھ نہانی۔ گلا۔ خجرہ اور پٹوں میں دو کھن۔

فاسفورس۔ ہڈیاں دھونسی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ دو کھن اور درد۔ ناک۔ منہ۔
سینہ پھیپھڑے۔ گلا اور ہوائی نالیوں میں دو کھن۔

ریشا کس۔ دو کھن اور اینٹھن۔ سر۔ تھتھے۔ زبان۔ پیٹ۔ ناف اور پیٹ کے پتھے
پشت اور اندام نہانی۔ سینہ اور پیٹھ کی بائیں جانب دو کھن۔ گلا۔ اعضا اور سر دھونسنے ہوئے
معلوم ہوتے ہیں۔

سلفر۔ بائیں آنکھ۔ منہ کے جوڑ۔ پیٹ میں درد اور دو کھن۔ پیٹ پشت۔ بایاں شانہ۔ بالی
کولہ۔ ران۔ ناک کا باہر والا حصہ اور پاؤں دھونسنے ہوئے ہوتے ہیں۔

سیلیشیا۔ اندرونی دو کھن۔ ہڈیوں۔ سینہ پھیپھڑے اور سر میں دو کھن چٹم میں اینٹھن اور کھن
ونکم۔ سر۔ چند یا۔ بال۔ دائیں آنکھ کے اوپر ولے ہوئے۔ ناک۔ دانت۔ زبان۔ سینہ کے
اوپر کے حصے۔ اطراف معدہ۔ مقدہ۔ سقرہ۔ بائیں گردے اور پشت کی نالی میں دو کھن۔ اس طرح
معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ لگی ہے۔ چھاتی۔ ران کے پر وازھے اور ماسے دھونسنے ہوئے
معلوم ہوتے ہیں۔

تپکن والے درد

ادویہ۔ ایکونائٹ۔ بلاڈونا۔ براونیا۔ کولہ۔ کلیریا۔ کارب۔ آئینشیا۔ نائٹرک ایسڈ۔

فاسفورس۔ پٹھلا۔ ریشا کس۔ سر۔ سیپیا۔ سیلیشیا۔ شانی۔ سگریا۔

ایکونائٹ۔ جبکہ سر کی بائیں جانب اور کپٹھیوں میں تپکن ہو۔

کلیریا۔ کارب۔ بھدڑی۔ تپکن کا درد۔ پیشانی اور فرق سر کا درد۔ حرکت سے زیادہ ہوتا ہو

پٹھلا۔ دماغ۔ سر۔ پیشیا۔ دانت۔ کان اور پاؤں کے تلوؤں میں تپکن محسوس ہو۔

سیپیا۔ دماغ۔ دانت۔ مانٹھ اور کپٹھیوں کی تپکن کے لئے مفید ہے۔

اگر مذکورہ بالا ادویہ میں کے موافق نہ ہوں۔ تو ذیل کی ادویات متعل ہوتی ہیں۔

بلاڈونا۔ دماغی رگور دماغ۔ دانت۔ معدہ۔ رحم اور پستانوں میں تپکن۔ اگرچہ عام تپکن والے

دردوں میں اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ علامت ایسی بوضاحت نہیں ہوتی جیسی کہ مذکورہ بالا ادویہ میں موجود ہے۔ یہ صرف اسی حالت میں مفید پڑتی ہے جب بقیہ علامات ادویہ بھی پائے جاتے ہوں۔

برالونیا۔ تمام جسم میں تپکن موجود ہو۔ چند یا میں درد۔
 کیمو بلا۔ نصف دماغ اور گلے کے پچھلے حصے میں درد۔
 اگنیشیا۔ دائیں طرف کپٹی۔ پیشانی اور پشت سر میں تپکن والا درد۔
 ناعظمک ایسٹر۔ سر کی بائیں جانب تپکن والا درد۔ کان۔ گدی۔ دانت اور معدہ میں درد۔
 رشا کس۔ قعر معدہ میں تپکن۔ کپٹی میں یا ایسا درد جو جھڑوں اور دانتوں کے کپٹی تک پہنچتا ہو۔ بائیں شانہ اور ماتھے میں درد۔
 شانی سیکریا۔ کپٹی اور دانتوں سے آنکھوں کی طرف آتا ہوا تپکن والا درد۔
 سلفر پشترس۔ بائیں جانب ہاتھ۔ دانت۔ مسوڑھوں۔ منقحہ اور منقہ میں درد۔
 تپکن کے ساتھ۔

تشخیصی درد

ادویہ۔ بلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ ڈیجی ٹلیس۔ نیٹرم سیور۔ فاسفورس۔ فاسفورک ایسٹر۔
 پاشلا۔ سلفر شانی سگریا۔ زنک۔
 فاسفورک ایسٹر۔ جوڑوں۔ بازو۔ کلائی۔ سینہ۔ معدہ۔ پیٹ وغیرہ تشخ کیلئے مفید ہے۔
 پاشلا۔ معدہ اور سینہ میں تشخی درد۔ دائیں ٹانگ میں جو گھٹنے سے شروع ہو کر کوسے تک جاتے۔ قعر معدہ۔ پیٹ رانوں میں درد۔
 مفصلہ ذیل ادویات میں تشخی درد بلحاظ اہمیت کے دوسرے درجہ پر شمار ہوتا ہے۔
 بلاڈونا۔ جھڑوں میں تشخ۔ ایسا دپیٹ اور معدہ میں پھیرے لیٹنے سے آرام پاتا ہے۔ اور پیچھے جھکنے سے دلدیر ہوتا ہے۔ اور عضلات کا تشخ بھی اسی دوائی کے تحت میں ہے۔
 کلکیریا کارب۔ پوپے۔ ہاتھ۔ پاؤں اور رانوں میں تشخ۔ معدہ اور اس کے اطراف میں تشخی درد جس کے ساتھ اختلج بھی موجود ہو۔
 ڈیجی ٹلیس۔ سینہ۔ پیٹ اور شانہ میں تشخ۔

بیشتر مہیور حیض شروع ہوتے وقت پیٹ میں تشنجی درد۔ درد قوہ لہج جو درد زہ کے تشابہ ہو۔
یہ درد پاخانہ ہونے کے بعد بڑھتا ہے۔ اور ہول کے خارج ہونے سے کم ہوتا ہے۔ بادو۔ مائعہ انگلیوں
انگوٹھے۔ لاتوں۔ پنڈلیوں اور پاؤں میں درد ہوتا ہے +
فاسفورس۔ خضیوں معدہ۔ مقعد۔ پنڈلیوں۔ شانوں کے درمیان اور سر کے بائیں جانب

تشنجی درد۔
شافی سگریٹ یا پیٹ۔ دائیں گھٹنے کے جوڑ اور انگلیوں کے پہلے جوڑوں میں تشنج اور درد۔
سلفر۔ معدہ۔ سینہ میں تشنجی درد۔ چوے درمیان انگلی۔ ٹانگ۔ رین پنڈلی تلوے اور پاؤں
کے پنجے میں انٹھن۔

ترکیم۔ مقام معدہ۔ جگر۔ اطراف پیٹ۔ ناف۔ گلو۔ مثانہ اور سینے سے معدے تک درد اور
تشنج۔ رانوں۔ پنڈلیوں اور بائیں پاؤں اور پٹھوں میں انٹھن۔

طیس مارنے والا درد

ادویہ۔ بلاڈونا۔ برائیونیا۔ کلکیر یا کارب۔ کاسٹم۔ اگنیشیا۔ نکس و امیکا۔ نائٹریک ایسڈ
سیپیا۔ سیلیشیا۔

بلاڈونا۔ درد شقیقہ۔ دائیں کنپٹی۔ ناک کے اوپر۔ پشت سر۔ دماغ کی کنپٹیوں کی جانب آنکھیں
یاد آئیں آنکھ کے اوپر۔ سینہ۔ معدہ۔ پیٹ اور اطراف معدہ میں ٹیس مارنے والا درد۔
برائیونیا۔ پیشانی۔ آنکھ۔ گلو۔ معدہ میں دائیں جانب۔ بائیں آنکھ کے اوپر اور سر سے باہر
کی جانب رجوع کرتا ہوا ٹیس مارنے والا درد۔

کلکیر یا کارب۔ معدہ اور سر میں ٹیس مارنے والا درد محسوس ہوتا ہے۔
کاسٹم۔ ماتھے۔ کم۔ مقعد۔ معدہ۔ کان اور کولے میں ٹیس کے ساتھ درد ہو۔
اگنیشیا۔ ناک کی جڑ اور پہاڑی۔ معدہ اور مقعد میں ٹیس کا پڑنا اور درد کا ہونا۔
نکس و امیکا۔ چندیا۔ پیشانی۔ آنکھ۔ معدہ۔ جگر سے سینہ اور سر کی جانب مثانہ۔ صفحہ۔
اور قعر معدہ میں درد اور ٹیس۔

نائٹریک ایسڈ۔ دماغ کے وسط پیشانی چشم۔ گلو۔ معدہ۔ مقعد اور کمر میں درد اور ہوک کا اٹھنا
سیپیا۔ پیشانی۔ جگر۔ معدہ اور سینہ میں درد کا اٹھنا۔ حرارت خون کے باعث جسم میں ٹیس کا

ٹیس کا احساس جو عموماً زیادہ ہوتا ہے۔
 سلیشیا۔ پشت بسر اور پیشانی میں ٹیس مارنے والا درد جو دبائے سے کم ہوتا ہے۔ انکھ بعد
 اور سینہ میں ٹیس مارنے والا درد +

چند ہدایات

ناظرین اور طلباء کی سہولت کے لئے اس جگہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا علامات
 کو حفظ کرنے اور ان سے مستفید ہونے کے لئے چند ہدایات دیج کر دی جائیں تاکہ انتخاب دوائی
 اور باقاعدہ علاج میں ان سے کافی مدد حاصل ہو سکے +
 سب سے مقدم اور ضروری بات یہ ہے کہ ادویات جو مذکورہ بالا عنوانوں کے تحت میں لکھی گئی ہیں
 حفظ کر لینی چاہئیں جس وقت یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر ان ادویات کے جداگانہ علامات بھی
 یاد کر لئے جائیں تاکہ ادویات مختلفہ میں تمیز ہو سکے۔ اس تھوڑی سی محنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزانہ
 استعمال اور حادث امراض کے لئے دوائی کا تجویز کرنا چنداں مشکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد ادویات کی نسبت
 علم کو وسیع کرنے کے لئے مخزن الادویات کے مطالعہ کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر ہر روز تھوڑا سا وقت
 اس کے مطالعہ میں صرف کر دیا جائے تو اندک مدت میں کافی علم الادویہ حاصل ہو جائے گا۔ باقی کی
 ادویات کو یاد کرنے کے لئے اسی تدبیر کو عمل میں لانا چاہئے۔ کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ادویات
 کو حفظ کرنے کا نہیں +

چالیس تیر ہدف دیویات

معد

علامات عمومیہ و مخصوصہ

ACONITE

ایکونایت

امراض و آثار

من و دماغ

اعصاب (حسیہ)

قلب } شریان
دورہ خون

پھیلتی۔
وسکیرا پٹ

جوڑائے اعضاء

پیٹھا تیلیا

اشتداد مرض

خوف سے

جذبات کے بھڑکنے سے

صدے سے

روح کے جانے سے

سردی لگنے سے

سردی اور خشک ہول سے

پسینوں میں ہوا لگ جانے سے

شور سے۔ روشنی سے۔ دانت نکلنے کے دوران میں

بوقت شب۔ رات کے پہلے صبح میں نصف شب تک

پہلو پر لیٹنے سے

انخطا ط مرض

کھلی ہوا میں۔ یا آرام سے لیٹنے سے

گرم پینے آنے سے

علامات مضبوط جسم۔ محنت پسند عادت اچانک نہایت تیز دردناک اثرات بتاؤ۔ انجماد اکثر مرگی کا سا۔
نظام اعضاء اور دیکھو کہ نظام میں جوش یسوزش چمکدار سرخ خون کا اخراج۔ عضو بے حس۔ بڑا اجملتا ہوا
محسوس ہو۔ چھن ہو۔ کھڑے رہتے ہوئے معلوم دیں۔ درد کے بعد بے حس ہو جائے۔ عصبی درد۔ خوف۔ فکر۔
سخت جانکاہ خوف۔ موت کا۔ ہجوم کا۔ درد کے مارے سخت بے چینی۔ خوف کے ساتھ چھین مارتا ہو۔
اپنی مٹھیاں چباتا ہو۔ کاٹتا ہو۔ ناخن کاٹتا ہو۔ (اگر سنگم) مرنے کی خواہش۔ مرنے کی پیشین گوئی کرے۔ اور کہے کہ

دو بس میں بارہ بجے تک مر جاؤنگا۔ یہ ایسی خاص علامتیں ہیں جو سولے ایکونائٹ کے اور کسی دوا میں نہیں پائی جاتیں۔ نہایت تیز جس ہو جائے۔ سر بھاری ہو۔ چھینکیں بہت تیز ہوں۔ ماتھا اور آنکھیں پٹی جاتی ہوں۔ نہیں پیشانی میں ترپ ہو دائیں اینٹم ٹارٹ۔ گنیٹیا۔ سیلاڈونا، در دیں پیشاب بہت آئے۔ پسیلیوں میں جلن ہو گولی سی لگے۔ ناک بے حس ہو۔ سیلاڈونا۔ میڈورلٹیم، ناک سے گرم پانی خارج ہو۔ نہایت منظر دکھائی دے (پنچیا) گرم اور سرخ رخسار۔ اٹھنے کے وقت چہرے پر زردی۔ غشی۔ دانت میں درد۔ ہر ایک چیز کا ذائقہ تلخ۔ پانی بڑ لگے۔ نگلے ہوئے گلے میں اکٹے۔ جلانے والی پیاس۔ ترشی یا میٹیر کی خواہش۔ برف سے پت کی یا خون آلود تے۔ خالص خون کے دست بھاگدار۔ دستوں کا رنگ سبز گھاس کی مانند ہوتا ہے یا سفید۔ جب دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہوں رڈنکارا مرکبوس کارپیش۔ متعین کھلج۔ کچھ چپکا ہوا سا محسوس ہو پیشاب ترک جانے لگے۔ سرخ خون کے سے رنگ کا ہو۔ تکلیف دہ ہو۔ حیض بیکار یک ترک گیا ہو۔ سانس جلدی جلدی آئے فکر آلود ہو۔ سختی سے آئے۔ آٹھ کر سیدھا بیٹھ جانا پڑے کھانسی خشک تکلیف دہ۔ گلا بیٹھا ہوا۔ کھانسنے کھانسنے گلا پکڑے۔ رات کو یا کچھ پینے سے۔ چھاتی کی طرف خون کا تیز دورہ۔ نمونہ۔ چھاتی میں درد کی چپکن۔ پلوریسی۔ دل کی سوزش کا احساس۔ ہول دل۔ پائیں بازو میں درد۔ نیچے کی طرف کو جانے۔ انگلیوں کی لوکین سرخ ہوں۔ نا انگلیں بے طاقت۔ سوزش چمکدار اور سرخ جلد گرم و خشک۔ برف کا سا پانی گزرتا ہوا محسوس ہو۔ بے خوابی اور بے چینی۔ بیض تیز پڑ طاقت اچھلتی ہوئی۔ یا تار کی مانند پٹلی۔ شریانوں میں تناؤ۔ دوریٹرم ویر، سردی۔ لہریں سی اٹھیں کبھی گرمی لگے کبھی سردی۔ بخار بہت تیز۔ درجہ حرارت بہت بلند۔ خشکی۔ جلانے والی گرمی۔ پوٹوں۔ ناک میں گلے میں پھیپھڑوں پر۔ پسیلیوں پر۔ کپڑا تار تار کر پھٹے۔

ایکونائٹ امراض بخار۔ نمونیا اور دردِ سر کے آغاز میں دیا جاتا ہے۔ حیض میں جبکہ خون درد سے اور قلت سے آتا ہو +

خوراک دوا اور طاقت استعمال :- ۳۰۔ ۳۰۔ اور اعلیٰ طاقت کی ادویات جب امراض حسیہ ہوں۔ انجماد خون میں ۳۰ یا ۳۰ کا۔ اور جب حواس خمسہ ماؤف ہوں تو ۲۰ یا اس سے بھی زیادہ طاقت کا۔ مدت اثر تین ہفتے تک۔

ممد و معاون ادویات :- آرنیکا سیلاڈونا۔ برائیونیا۔ کوفیا۔ سیلیفولیم۔ فاسفورس سینچیا۔ سیلفر ادویات متعلقہ۔ سیلاڈونا۔ کوفیا۔ فاواثر۔ دے بھار (سرک)

نوٹ :- اضافہ و افادہ امراض کے نشانات جو اس کتاب میں دیے ہیں۔ انگریزی نشانات کے متضاد ہیں۔ کیونکہ اردو طریقہ بھی انگریزی کے متضاد ہے مثلاً نشان ۱ سے مراد ہے کئی مرضی اور نشان ۲ سے مراد ہے زیادتی مرض۔

آریکا

ARINCA

امراض و تاثرات

خون

شریان و ورید خون

اعصاب

عضلات

قولے ہائے

اشتداد و مرض

خراش

چوٹ سے { صد مے سے۔ دھماکے سے
محنت سے۔ سوچ سے۔

چوٹ سے اُفتت سے۔ موج سے۔

چھو جانے سے خواب کے بعد۔

حرکت ہے۔ پڑھائیے سے یا شراب نوشی سے

انخطاط مرضی تے

لیٹنے سے بہرہ نیا کرتے ہیں (اور شرم وراں گنہگار لیٹتے ہیں)

علامات سخت درد و بخراش یا زخم تمام جسم میں کسی حصہ سے اخراج خون یا درد کے بعد درجہ فاس، کچلے جانے جیسا درد۔ بہتر سخت معلوم ہو۔ یا اس میں گولے سے ٹھہیں بعد کے کشت میں ایک گولہ سا محسوس ہو۔ درد اچانک ایک جوڑے سے دوسرے میں چلا جاوے (کو لچکم) یا فالج کا سا درد۔ ذائقہ سانس پاخانہ وغیرہ بدبودار۔ میعاد بخاریں سرایت نہ ہو جانے سے۔ سیلمان خون کی رغبت۔ غیر ارادی اخراج۔ اعصابی و پر امید مزاج۔ خوف چوٹ لگنے کا۔ بیماری کا۔ فوری موت کا۔ بیماری کے بعد رنج اداسی۔ نفرت جسمانی۔ بے چینی۔ تکلیف۔ مگر یہ کہہ کہ مجھے کچھ تکلیف نہیں (اوپیم) آہستہ آہستہ کوشش سے جواب دے۔ دماغ ٹھکا ہوا معلوم دے۔ سر نہ ہلکائے۔ غنودگی معلوم دے۔ جواب دینے کے ساتھ ہی ساتھ خواب طاری ہو جائے۔ آنکھیں خون آلود سرخ ہوں۔ بخاریں خون جیسی سرخی۔ زبان کے وسط کے نیچے سرخ دھاریاں۔ حلق میں زکام کا گریٹا پیٹ سے نیچے کی طرف تشنج۔ بدبودار دست گرم ہیں کٹے جیسا احساس پیشاب رک جائے۔ بوند بوند کر کے خارج ہو۔ وضع حمل کے بعد درد۔ دروں کے بعد درد پلانے سے۔ گلا پر لگیا ہو۔ سخت سے سردی سے۔ پانی میں بھینکے سے۔ کھانسی بیماری کے بعد رونے لگے پستان کے نچلے حصہ پر بخاریں ہیں۔ گھنڈیوں پر زخم بازو میں درد لٹکانے سے۔ دل کی دھڑکن تمام جسم کو ہلاک دل کے عضلات کمزور ہو جائیں۔ ہر جگہ ذرا سی چوٹ لگ جانے سے کالا یا سرخ نشان پڑ جائے۔ سرخ باد۔ بیتی یا چھپکال۔ چوٹے پھوٹے۔ نہایت تکلیف دہ ہا سے یا چھوٹے چھوٹے پھوٹے۔ غنودگی تکلیف دہ۔ اور خوف پیدا کرنے والا خواب۔ ڈر کر بیدار ہو جائے۔ کروٹ کی طرف ٹھنڈی سردی لگنے کے دوران میں پیراں۔ سر گرم اور جسم ٹھنڈا۔ چہرہ میں خون کا جمود۔ ڈکار میں مٹے ہوئے انڈے کی سی بدبو۔ مریض ہر شے سے خوف کھاتا ہے کہ کہیں اس کی موت نہ ہو جائے۔ یا اسے کوئی چھو نہ جائے +

مقدار خوراک - طاقت - ۳x سے ۳ یا زائد۔

مدت اثر - دو ہفتہ۔

ممدادویات - ایکونائٹ - کلکیریا کارب - نیٹرم سلف - سوراٹیم - رس ٹاکس - سلفورک ایسڈ
قاد اثر - نیمفر۔

متعلقہ ادویات - بلاڈونا - ایکنیشیا - سپر سلف - رس ٹاکس +

سنگھیا

ARSENICUM

آرسینکیم

استداد مرض

ٹھنڈے { خوراک - مشروبات برف ہو اسے
ٹھیک وقت پر نصف شب بعد منہ صبح کے بعد
ایک خاص زمانہ یا وقت کے بعد مثلاً ہفتے عشرے یا
پاسال کے بعد

سبزیوں کے استعمال سے پانی پینے سے
بکثرت شراب پینے سے
دباؤ اثر سے - خراب گوشت سے -
نگالوں یا بھوڑے پھنسیوں سے جو رشہ ناساختہ ہو
کونین کے بکثرت استعمال سے
ایک کروٹ بیٹھے رہنے سے
شبا کو نوشی سے - زیادہ محنت سے

انخطاط مرض

گر می سے { رشک - سینک سے - خوراک سے -
اٹھنے پھرنے یا اوڑھنے سے -
حرکت سے یا چلنے پھرنے سے
سر کو اٹھا رکھنے سے - شیدھا بیٹھنے سے
اجاب کی صحبت میں بیٹھنے سے -

امراض و تاثرات

لعاب دار بھلیاں - من تنفس

پیسپٹرے - یا مخصوص دایاں پیسپٹرے

خون - دل - اعصاب

تلی

اعصاب - جلد

اعضاء مخصوصہ

علامات - یک لخت اور نہایت تیز اثرات سخت درد دیوانہ کر دینے والا - آگ جیسی جلن والا -

بہت بے چینی ہو گرم سوئیاں چمکیں بد مزاجی بڑھتی جائے رسی سی فیوگما یا یکا یک کمزوری تیزی
سے سوکھتا جائے - جیکزوری ہو - جلن پیدا کرنے والے قلیل المقدار پتلے اخراج - ناک سے پانی - تنوکا -

پینے وغیرہ مٹے ہوئے مردار مادے کی بوند و بھری ہوئی پھیلی جیسی سوزش۔ پانی کا انجماد۔ خون کی کمی
 رات کو موت کا خوف۔ صحت سے مایوسی ہو۔ مگر زندگی سے سیری ظاہر کرے۔ اپنے جسم پر تشدد و دوار کھے
 بال نوچے۔ ناخن کاٹے۔ خودکشی کرنا چاہے۔ سر کی طرف خون کا دورہ لے ٹھنڈے مگر صافی درد لے گرمی سے کبھی
 سر میں درد ہو کبھی پیٹ میں یا جسم میں۔ بانیں آنکھ کے اوپر درد ہو سر بے چین رہے۔ بال جلد سفید ہو جائیں۔
 گرسنے لگیں۔ پوٹے کھے جائیں۔ گرم گرم جلتے ہوئے آنسو میں۔ بادی سے آنکھیں دکھیں۔ سردی سے زخم پڑ جائیں
 ناک میں چھٹکیں بہت آئیں جلن پیدا کرنے والا پانی ناک سے بہے۔ لیکن پھر بھی ناک رُکی رہے۔ بخار ہو۔ تیمار
 داروں کا تصور رکھائے۔ آسانی سے رکام ہو جائے۔ ٹوکا کی بوسے۔ دیکھنے سے بلکہ اس کے خیال سے
 نفرت۔ چہرہ زرد۔ گھسا ہوا۔ ہڈیاں نکلی ہوئی اور لیٹھا ہوا سا۔ ٹھنڈے پیسے آئیں۔ ہونٹ کالے پڑ جائیں۔ رات
 کو دانتوں میں درد ہو۔ سخت نہ بچنے والی پیاس لگے۔ ٹھنڈے اور برف کے پانی کی خواہش۔
 لیکن پانی پینے سے معدہ خراب ہو۔ دُکس دئے آجائے۔ تھوڑا تھوڑا اور بار بار پانی پئے
 ڈکائیں بہت آئیں۔ تڑپ سوزش۔ تھے اور دست۔ بد بو عارچاؤں کی طرح جیسے۔ مقدار میں کم۔ جلن پیدا کرنے والے
 سیاہ لعاب وار دست۔ ٹھنڈے مشروبات سے۔ پیشاب کم۔ سیلان الرتم۔ اخراج بکثرت۔ اور طبع پیدا کرنے والا
 کھانسی خشک۔ رات کو کچھ پینے سے۔ دل کمزور۔ کپکپاتا ہوا۔ دھڑکتا ہوا۔ ذرا سی وجہ سے سانس چھوٹا
 اور جلد جلد آٹے۔ ناک میں معلوم دے۔ لے بیٹھنے سے۔ اوپر چڑھتے ہوئے پیام بھاتے ہوئے
 ٹٹکالے (دلے۔ پھلیاں وغیرہ) جلدی یا اندرونی شکایات باری باری سے جلد افسردہ۔ روکھی۔ خشک۔ میلی
 یا مرجانی ہوئی۔ اگر یا فاش۔ کجوائی پھلیاں۔ پھلیاں کھانے کے بعد۔ زخم پڑ جانے کی رغبت۔ جلن ہوتی رہے۔
 میند لیٹتے ہی اُچٹ جاتے۔ بے چینی۔ موت کے خواب۔ سردی بیرونی و اندرونی۔ جلن والی
 گرمی جگہ۔ نہایت تیز جس لے کھلی ہوا میں (اور مہٹ) لرزہ بے قاعدہ۔ ہا دینے والا۔ گرم مشروبات کی خواہش
 سانس تک بھی نہ لے کے گرمی ایسا محسوس ہو گویا رگوں میں گرم پانی دوڑتا ہے یا ان میں آگ لگ ہی ہے چھاتی
 میں جلن یا ٹھنڈ دہائی لیکیس۔ نیٹرم میو۔ سلفر۔ پینہ نہ بچنے والی پیاس کے ساتھ سردی یا غشی +

خوراک دوا اور طاقت و استعمال - ۳۴ - ۳۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰۰

مدت اثر۔ چار ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ ایلم سپا۔ کاربودیج۔ لیکیس نیٹرم سلف۔ فاسفورس۔ پاشلا۔ سلفر نیویو جا

ادویات متعلقہ۔ سلفورک ایسڈ۔ ویراٹرم ایلب۔

فادائٹرم۔ اوپیم۔ کاربودیج۔ چائنا۔ اسپر سلف نکس وایکا۔

شہد کی مکھی APIS

اشتداد مرض >

گرمی سے } گرمیوں میں
پینے سے } آگ سے
بستر پر }

چھوٹنے سے۔ نیند کے بعد۔ ہم بکے بعد دوپہر
دہانے سے۔ اخراج مولو (پھنسی پھوڑے) دب جانے سے

انخطاط مرض

ٹھنڈ سے } ہوا سے
کھنڈ سے } کپڑا اتر جانے سے

قدرے بلغم خارج ہو جانے سے
حرکت سے۔

ایپس

امراض و تاثرات

آنکھیں } خانہ دار ریشہ جات
حلق }
خصیۃ الرحم }

خلائے آبی

جلد

گروہ مشانہ

اعصاب تنفس

دل - خون

بائیں جانب۔ دائیں سے بائیں جانب کو

علامات :- تیز حملہ۔ اچانک تیز چیخیں۔ یا ایسا درد جس سے چھینٹ نکلیں۔ گھبراہٹ۔ سوزش
تیز جستی در دہیں تیز ڈنگ سا چھجھتا ہو یا زخم سے چھلتا ہوا احساس دماغ میں۔ پیٹ میں
نلوں میں بٹانے میں۔ پھولا ہوا۔ چمکدار۔ جلن۔ غارش۔ دہائی اثر سوزش۔ سختی چڑچڑاہن جوش۔
جھکڑاؤ۔ پریشان۔ لا پرواہ۔ بات بھول جانے۔ چیزیں پھینکتا پھرے۔ یکایک چرتی ہوئی چیخیں
مارنے لگے۔ سر درد سے۔ خیر سا چلے۔ یا مکاسلگے۔ کن پٹی میں۔ سر اور سر اور دھڑکھانے
بے جس۔ تھکان کا سر درد کے دہانے سے۔ بال درد کرتے ہوں۔ سر میں پینہ آئے۔ آنکھیں سو جی ہوں
پونے پانی کے تھیلے بن رہے ہوں۔ سرخ ہوں۔ گرم گرم پانی ہے۔ روشنی سے خوف لگے۔ بھینگا پن۔ نظر
نہ آئے۔ پاخانہ آنے سے۔ سرخ۔ چہرہ سو جا ہوا یا سرخ۔ آنکھوں کے گرد۔ مومی زردی۔ ناک
ٹھنڈی۔ سرخ چہرہ یا زبان۔ دانت کٹکٹائے۔ زبان کی کوک پر پھلے۔ سوزش۔ جلی ہوئی سی۔ چمکدار
ٹھنڈی چیزوں سے۔ سوڑے سرخ۔ ایڈیپسیا (Adiposa) المرزہ کے دوران میں پیاس۔ سنہری ارد
یا مٹا کر کے گودے جیسے دست۔ بے بو۔ تحریک سے۔ مقعد میں تکلیف۔ سوزش۔ خون۔ سے
یا کھلی رہے۔ پیشاب جلتا ہوا آئے۔ کم۔ بدبودار۔ پسے ہوئے تھوے جیسے فدا ت۔ خصیۃ الرحم بے جس۔

دائیں جانب پھوڑا۔ آغاز شباب میں پُر درد اسخراج حیض سانس لینے کے لئے مانپنا۔ یہ احساس گویا یہ سانس آخری ہوگا۔ ہو کی بھوک۔ دل میں چُپک۔ بچے کے کونے۔ (Apix) سے پیچھے کو جلنے حرکت تمام جسم کو ہلا ڈالے۔ ماتہ اور پیر سو جائیں۔ ہتھیلیاں چلیں۔ ناخن ڈھیلے محسوس ہوں جلد گلابی سرخ۔ تیز جس۔ ٹہنیاں کھردری۔ ڈنک جیسے دھتے۔ زرد بڑی پتی۔ چھپا کی سرخ دھتھر۔ خشک۔ گرم جلد ہو باری سے پسینہ آئے۔ غنودگی۔ مگر بہت گھبراہٹ۔ جب گرمی ہو۔ چلا پڑے۔ کپڑے لات مار کر انار دے۔ بیض کمزور تیز۔ لرزہ۔ کپڑے اتار نیکی خواہش کبھی گرمی لگے۔ کبھی سردی۔ دائیں جانب چلائے والی گرمی۔ لیکن ٹھنڈ معلوم دے جوش میں آنے پر بغیر پیاس کے۔ چار بجے۔ بعد دوپہر۔ ایک حصہ میں گرمی دوسرے میں سردی۔ پسینے کی افراط۔ کسی کسی حصے میں۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال ۱۰۰-۵-۲۰-۶-۳۴
مدت اثر و وہین پہنچنے۔

ممد و معاون ادویات۔ آرنیکا۔ آرسنک۔ بیرٹاکارب۔ سیلی پور مرکبوس سائنٹائلس نیٹیم میو پلسٹلا۔

ادویہ متعلقہ۔ آرسنک کینتھیرس۔ پلسٹلا۔ اڑیکا۔
مخالف ادویہ۔ رہس ٹاکس +

کچا سمرہ

NTIMONIUM CRUD

ایڈی مونیم کروڈ

اشتداد مرض

امراض و تاثرات

سردی سے } غسل سے
سردی سے } نہی سے
سردی سے } سرد پانی ڈالنے سے
زیادہ کھانے سے۔ تڑشی سے

معدہ
نظام انہضام
دلغ
جلد
پہلو بدنا

گرمی سے } موسم گرما میں سورج کی گرمی سے
گرمی سے } گرمی کی کثرت سے
آگ تاپنے سے۔ آگ کی چمک سے

علامات :- ثقیل اور زیادہ خوراک کھانے والی کو۔ گھٹیلوں اور کٹھنوں (سندوں)

سے پُر دست آئیں۔ جُری جُری ڈکاریں آئیں۔ دماغی پریشانی اور جلدی خرابی کی علامتیں
 بنو اور ہوں۔ سیلان آرام ہو۔ جلد۔ ناخن وغیرہ خراب ہوں۔ درد نہ ہو۔ بھٹنے اور منہ کے گوشے پھٹ جائیں
 (ایمپرووٹیم) فریہ۔ ترشرو۔ چڑچڑاہو۔ رونے لگے۔ جب اس کی طرف دیکھا جائے۔ چھو جائے
 (سٹریمونیم) یا ہلایا دھلایا جائے۔ نفرت ہو۔ زندگی سے۔ خوراک سے بہت خوش رہے۔ خواب سے
 دیکھا کرے۔ جذبات کے زیر اثر ہو۔ جلد کھردری اور نرم ہو۔ منہ کے گرد بھنٹیاں۔ تر بان سفیدی
 جیسی سفید ہو۔ آرسنیک کمینہ۔ برائی۔ کالی میور۔ فاسفورس۔ آئرن میں چھائے ہوں۔ پیاس نہ ہو۔
 ماضیہ خراب ہو۔ کھانے کے بعد بھی خوراک کا مزہ۔ یا ویسی ہی فوکاریں آتی رہیں۔ تھے ہو۔ کھانے پانی
 سے جی مائل نہ کرے (شیلڈونیم)۔ تھے آئے تھے بھی آرام نہ پڑے۔ پیٹ بھر بھر معلوم ہو۔ دست
 پٹنے پانی جیسے سُدے ملے ہوئے۔ معدہ دبانے سے درد معلوم ہو۔ انگلیوں کے جوڑوں میں گھٹیا
 سادہ ہو۔ آواز پر قابو نہ ہو۔ بولنے سے کھانسی بہت تیز۔ ہر ایک دوسرے پہلے سے کم ہو۔ ناخن پھٹے
 ہوئے یا سینگوں جیسے موٹے۔ اندر ہی اندر بڑھتے جائیں۔ پھٹنے کی رغبت۔ انٹن۔ نہایت سخت بنیں
 اور تھکاوٹ سی معلوم ہو۔ چہرہ پشاپٹھا ہو۔ جھریاں سی پڑی ہوں +
 خوراک دوا اور طاقت استعمال۔ ۳۷-۶۷ سفوف
 مدت اثر۔ پانچ ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ سیلیا۔
 ادویات متعلقہ۔ سلفر۔
 فادرزہر۔ سپر سلفر۔



ANTIMONIUM TART

ایٹمی مونیم ٹارٹ

استند تو مرض

امراض و تاثرات

گرمی سے } گرم کرہ میں
 گرم کرہ پڑا اور صحن سے
 گرم موسم میں
 غصہ سے۔ لیٹنے سے
 صبح کے وقت

ہوا کی نالی
 پیچھے پھڑے
 لعاب دار جھلی
 دل
 دورہ خون
 تنفس یا سانس

پیٹ انٹریاں

تینہ

کمر کے گرد

جلد

زیادہ کھانے سے

سروی سے - نئی سے

انحطاط مرض

بلغم کے اخراج سے

بیٹھنے سے

حرکت سے

علامات :- ٹمکین رہے۔ رد عمل کی کمی۔ روز بروز کمزور ہوتا جائے۔ پسینہ بہنے آئے
 ڈھیلیا ہوتا جائے۔ جھلی سے زیادہ لعاب خارج ہوتا ہو۔ بوزھوں اور بچوں کے امراض میں
 کارآمد۔ ماضیہ خراب ہونے والی شکایات میں۔ لاپرواہی۔ یا ترشروٹی۔ اپنے حال میں مت رہنا پسند کرتا ہو۔
 چڑچڑاہو۔ گڑھٹا اور کراہتا رہے۔ آنکھ بند ہونے پر غفلت طاری ہو جائے (کینائس انڈیکس) پیشانی پر
 کچھ گول سا بنا ہو۔ نتھنوں میں کچھ دھواں سا جھاسے۔ یا پھڑپھڑانے میں۔ درود چہرہ بیادوں جیسا
 نیلگوں یا اینٹھا ہوا سا چہرہ ٹھنڈے پسینے آتے ہوں۔ زبان پر سفیدی۔ ترش چیزوں کو پسند کرتا ہو۔
 مگر وہ چیزیں مریض کی طبیعت کے مطابق نہ ہوں۔ ڈکاریں سرے اندوں کی سی بو والی۔ جلی کی لہریں
 سی اٹھتی ہوں۔ ٹھنڈا پسینہ آکر کمزوری پیدا کرے۔ دلویلیا۔ ویراژم الب، نندگی سے نفرت پا کر
 زور سے تے آتی ہو۔ گزیت تیرائیں معدے میں ٹوہ یا ڈکاسا احساس۔ سانس چھوٹا آئے۔ دم گھٹے
 باری باری سے کونے پر چہرہ سامعوں ہو کر دھسک اٹھے۔ ڈھیلی۔ کچی۔ گھر گھر کرنے والی کھانسی
 آتی ہو۔ چھاتی بھری بھری معلوم ہوتی ہو۔ لیکن کم از کم اٹھنی ہو۔ پھرتے ہو جائے یا پسینہ آجائے۔ (دھیمبوا)
 غصے کے وقت۔ کھانے کے لئے بیٹھنا پڑے۔ پلور و لمونیا ہو۔ کمر میں سخت درد ہو۔ ڈاٹھلے سے حرکت
 کرنے سے گوزاؤ ٹھنڈے پسینے زیادہ آئیں۔ بازو دھلتے رہیں۔ باری باری سے کھانسی اور جھانپاں آتی ہوں
 مریض بہت شکایت کرے۔ بلغم گاڑھا خارج ہو۔ دل اور پیچھڑوں پر فلج کا سا اثر و سیراٹا کا رب
 گرمی سے پسند آئے۔ جلد پسینے سے تر اٹھتی ہو۔ نیلے ولتے دریں خود اہوں۔ حجام کے
 آسترے سے پیدا ہونے والی خارش۔ بیض کی فساد کمزور اور تیز ہو +
 خوراک دوا اور طاقت استعمال - ۳x و ۶x - کم طاقت کی دوا بسا اوقات شروع
 میں تکلیف بڑھاتی ہے۔ بعد میں آرام کرتی ہے۔

مدت اثر دو ہفتے تک۔

مرد و معاون ادویات - بیراشکارب -
ادویات متعلقہ - ایونیا کارب - ایکلیپاس - ایکلا - لوسیلیا - اوپیم -
فاوڑہر - پلسٹلا - سیپیا -

BELLADONA

بیلادونا

امراض و تاثرات

اعصابی مرکز

خون کی نالیاں - بال جیسی باریک نہیں

آنکھ کی

لغاب دار / منہ کی

جھٹی / حلق کی

جلد

اعضاء مخصوصہ

دائیں جانب کی تکالیف

اشتداد مرض

سورج کی گرمی یا دھوپ سے

بعد دوپہر تقریباً تین بجے

ٹھنڈی ہوا لگنے سے - بال کٹوانے سے

سردی لگ جانے سے پسینہ ٹک کرانے سے

روشنی سے شور و غل سے - دھماکے سے

چھوٹنے سے صحت اجابت حرکت سے نیچے جھکنے سے

اخطاط مرض

ہلکا پھلکا اور ہلکے سے

پچھلے کو جھکنے سے

بستر پر آرام کرنے سے

علامات - گردن و قرب بدن - جبکہ تکلیف یک نخت اور تیز ہو - خفگی ہو - تیز سرخی ہو - خون اور
دھواں سوزش کے ساتھ سوزش ہو - انجماد خون ہو -
سر کی طرف - ترپنے اور چیرنے والا درد ہو - ٹھیر ٹھیر کر اور بار بار تکلیف دے گولے کی مانند
نکل جانے والی - یا نوچنے والی - دیوانگی - بار بار آنے والی دماغی تشویش اخراج
تھیل و گرم - جھٹکے لگیں - تشنج اور لٹٹھن - گلے میں - رحم میں ضرورت سے حتیٰ زیادہ جوش و جوش آجائے
وحشت آمیز سرسام کے مریض کا سا - بڑے غضب - بڑے شور - چلا رہے - بے چین ہو - جلد جلد
بولے - بچ کر بھاگنا چاہے - غلط - سر میں نبض کی سی تڑپ - کن پٹھن میں دھمکتے ہوئے بل
کھولنے سے - دماغ میں لہریں سی اٹھتی و گرتی ہوئی معلوم دیں - سردی دے دے کر مارے سر کے بال کچھے

درم دماغ - گولگ جانا - صدر ہو - کوئی خیال دل میں پیچہ گیا ہو - جو بار بار ذہن میں آتا ہو - تیلیان کھلی
 ہوں - آنکھیں چمکتی ہوں - بڑی بڑی ہوں - سرخ ہوں - آنکھ بند کرنے سے خوفناک خواب دکھائی
 دیں - اندھے پن کے دورے بعد میں زرد زرد نظر آئے - آنکھوں کے سامنے چمک سی ہو - روشنی سے خوف
 ناک آگ جیسی گرم - دھندلا نظر آتا ہو - چہرہ گرم معلوم ہو - گلا اور حلق خشک اور گرم ہو - زانوں
 رس ناکس - دانت میں درد ہو کے کاٹنے سے - زبان پر سوزش - زبان سرخ و سفید حتی دار - نگلنے میں تکلیف
 دم گھٹنا جائے - گھونٹ گھونٹ اور اوپر سانس لے کر پانی پیئے - لیونید پینے کی خواہش بہت زبردست ہو یہ حد
 یا بکر سے درد اٹھ کر کندھے اور گلے کی طرف جائے - درد والے پہلو پر لیٹنے سے - کوڑھی کے پاس درد -
 قویج - کاٹنے والا - پیچھے کو جھکنے سے - کلج نکل آئے (آر سٹک) پاخانے میں اکھڑ یا کی سی گھٹلیاں - آواز گتے
 کی بھونک سے مشابہ - پستان سرخ دھاریوں والی - گردن اور کندھے سخت - دائیں طرف شام کو پیشاب پلنے
 سے بستر پر خارج ہو جائے - رات کو جلدی سے بہت سا - گرم دھاننا - حیض بکثرت اخراج کرک کرک کرک پیشاب
 کا رنگ گہرا سرخ ہو - کھانسی خشک ہو - کمر ٹوٹی ہوئی سی معلوم دے - جلد چمکدار اور سرخ ہو - سرخ دھبے
 ہوں - پتی یا چھپاکی اچھل آئے - نیند آتی ہو مگر سونہ سکے - سوتے وقت جھٹکے سے لگیں خواب
 خوفناک دکھائی دیں - مثلاً جنگ و جدل - آتش زدگی وغیرہ وغیرہ کے - سر گرم ہو - دیگر اعضا ٹھنڈے
 ہوں - پسینہ گرم گرم آئے +

خوراک دو اور طاقت استعمال - ۱ - ۳۰ - ۲۰۰ - ۱۰۰۰ - شدید امراض میں خوراک دو ایلد جلد
 دی جائے -

مدت اثر - تین ہفتے -

مدد و معاون ادویات - بوریس - کلکیر یا کارب - ہیمپریلفر - مرکبوریس - نیٹرم میور -
 ادویات متعلقہ - گلو نیم - ٹائس مس - سٹرمینیم -
 فاذا اثر - کیمفر - کوفیا - اوپیم - ایکونائٹ

BRYONIA

برایونیا

امراض و تاثرات

غون

دورہ خون - جگر

سر کی
رقیق مادہ خارج کرنیوالی جھلی سینہ کی
جوڑوں کی
لیپیٹ کی

قوت پیدا کرنیوالے آلات جسم { اعصاب
عضلات

دائیں جات

بلف (رقیق مادہ) پیدا کرنے والے

خانے دار ریشہ جات

اشتداد مرض

آنکھ سے

جھکنے سے

محنت سے

کھانسنے سے

گہرا سانس لینے سے

گرم ہو جانے سے

گرم کمرے میں

گرم موسم میں

گرم تیز پینے سے

گرم کھانا کھانے سے

سبزیوں کے استعمال سے

ترش اشیاء سے - کیلول کے استعمال سے

خفگی و بیزاری سے چھوٹنے سے

اخراج رک جانے سے

سردی لگ جانے سے

اسخراط مرض سے

دباؤ سے { درد والے پہلو پر لیٹنے سے

{ درد کی جگہ پٹی باندھنے سے

سردی سے - خاموشی سے! بکاوہ و طوبیہ سے

گھٹنے اوپر کھینچ کر اکٹھے رکھنے سے

سوزش والے مقام کو مینک دینے سے

علامات بد آہستہ آہستہ بڑھنے والے پر طاقت ملے - نہ دہنے والی سنوں کی مقامی تکلیف - نہایت پروردہ

اثرات۔ کھانسنے پر بڑے زور کا درد ہو جس کے باعث مریض کو اپنا سر یا چھاتی وغیرہ پکڑنی پڑے۔ پھٹے جانے والی ٹیس کی سی تکلیف پیچھے کو جاتی ہوئی ذرا سی بھی حرکت ناگوار معلوم ہو۔ خشک جھلی دار لعاب کا اخراج۔ قلیل اور چپکنے والا جمود۔ سوزش۔ برسنہ۔ سرخ دھاریاں سی ہونا۔ بالی پت کی قسم کی مریض تنہا رہنا پسند کرے۔ یا گھر جانا چاہے۔ سست رہے۔ اٹھنے وقت سر چکر لائے بیہوش ہو جائے۔ سر میں سخت درد ہو۔ پھٹے جانے۔ چیرنے والے۔ کچلے جانے کا سا۔ یا بھاری پن محسوس ہو کن پٹیوں کے درمیان۔ سامنے پیشانی پر آٹھکھوں کی حرکت سے۔ ہائیں آنکھوں سے اوپر درد ہو۔ بال بال درد کرتا ہو۔ چکنے بال ہوں۔ کھانسی ہو۔ پاخانے کے وقت کوشش کرنے سے پتیا زخمی سی محسوس ہوں۔ پیچھے درد ہو۔ چبانے کی حرکت سے نکیلا آنے سے بمنہ خشک ہو۔ زبان بہت خشک اور کنہ درمی ہو۔ درمیان سے پھٹی۔ جڑ میں سرخ۔ صابن ملا ہوا سا تھوک خارج ہو۔ ذائقہ تلخ۔ پانی زیادہ پینے کی پیاس۔ پینے کی خواہش ہو مگر مزہ نہ آئے۔ نفرت ہو۔ جی متلائے۔ دائیں ہیلو پریشنے سے۔ دھڑکن ہو۔ کوڑی پر نہی ہو۔ معدے میں بوجھ محسوس ہو۔ جگر زخمی سا محسوس ہو۔ اس ہیلو لیٹنے سے۔ ایپینڈی سائٹس پاخانہ خشک۔ لمبا اور بہت سخت آتا ہو۔ جلا ہوا۔ قبض رہے۔ مٹھنے پر بال کر نکلنے والا دست۔ پتوں والی گوبی سے۔ موم سم گر مایں۔ پاخانے کے بعد سخت آنوں کے نوٹھڑے خارج ہوں۔ کے بی میں پھوریشن۔ لمبا اور گہرا سا لٹھلٹھنا چاہے مگر نہ سکے۔ اس سے کھانسی پیدا ہو۔ سخت درد والی خشک کھانسی۔ گویا معدے سے اٹھتی ہو۔ کھانے پینے سے خون آلود یا سخت بھگم۔ براکھاٹس۔ نہوید۔ دائیں، چھاتی میں سخت درد ہو۔ دائیں جانب۔ حیض سے پہلے پستان بہت سخت ہوں۔ مانگ اور کمر میں درد سے جھکنے پر۔ سر سام۔ سخت محنت کے خواب۔ نبض بھری ہوئی تیز اور سخت۔ خسرو نامکمل۔ یرقان۔ زکام۔ سردی سرگرم۔ چہرہ سرخ۔ دگر کم کر میں۔ جلا نیوالی خشک گرمی۔ تمام علامات میں۔ خون تک گرم ہو۔ تکلیف دہ مسلسل بخار۔ تب مزہ مسدود ہو۔ اخراج دب جانے سے۔ نثرش اور چکنا پسینہ آئے۔

خوراک دوا اور طاقت استعمال۔ ۱۷۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ ۱۰۰۰۔ امراض شدید میں کم طاقت کی دربابا بکار مدت اثر۔ دو ہفتے۔

مسدود معاون ادویات۔ ایبرائے نم۔ ایلمومی تیم۔ کالی کارب۔ لائیگو پو ڈیم رشاکس سیپیا۔ سلفر۔

ادویات متعلقہ۔ فائوٹیا۔ رس ٹاکس۔

فادافز۔ ایکونائٹ۔ کیمو میلا۔ ٹکس وائیکا۔

کلکیر یا کارب یا کلکیر یا اوسٹریم

CALCAREA CARB & CALCAREA OSTRUM

امراض و تاثرات

غذائی رگوں کے انشروک

پرورش کے لئے
ہڈی کی
جلدی

خون

سینہ - دایاں پیپھرہ

دل

بچوں کے امراض

استعداد مرض

خشک سرد ہوا سے

مرطوب ہوا سے

غسل کرنے سے

ٹھنڈے لگنے سے

تبدیلی موسم پر

دماغی محنت سے

جسمانی محنت و مشقت سے

چڑھنے سے

آنکھ پر زور پڑنے سے

بچوں کے دانت نکالتے وقت

شروع جوانی میں -

کپڑوں کے دباؤ سے

دودھ سے

بیداری سے - فکر سے -

علامات - موٹے اور گورے آدمیوں کی نکالیف جہنیں پسینہ بہت جلد آئے
سہرا چھاتی پر - سوتے ہوئے - بکثرت - اکثر ترش - بدبودار اخراج ہو - دست پسینہ
مضوک و غیرہ - جسم سے ترش ٹو آئے - گرم - کاپی آئینہ - خنایر کے روگیوں کی سہی عادات ہوں - اعضا
سوجائیں - آسانی سے موج آجائے - سرد و مرطوب ہوا سے جسم کو ٹھنڈا کر دے - سردی جلد
لگ جاتی ہو - خصوصاً چھاتی میں - ہڈیوں کی ساخت و نشوونما ٹھیک نہ ہو - بچوں کے
دانت دیر سے نکلیں اور چلنا بھی دیر سے آئے - خنایر ہو - سوکھا مسان ہو - ہاتھ پاؤں ٹھہرے
ہوں - پتھری پیدا ہونے کی رغبت ہو - آداس پریشان سا اور خشک و شبہ میں پھنسا ہوا رہتا ہو

بیماری و مصیبت سے اور زیادہ زیر نگاہ رہنے سے گھبرائے۔ دیوانگی کے سے آثار پائے جائیں (طیلم
 مگر انعم۔ نکس و امیکا۔ سیپیا۔ وراثم الب، محتاط اور گھبرایا ہوا سارے الفاظ کا غلط استعمال
 کر جائے۔ اچانک اداس لاپرواہ اور مست ہو جائے۔ سر جکراتا ہو۔ دل ٹمکیں رہے۔ سر بڑا ہو۔
 نیز پیٹ بڑا اور سخت ہو۔ سر کی گرائی میں درد ہو۔ تڑپ ہو۔ اور درد کے مارے پھٹا جائے بیداری
 کے بعد چند یا کھجلائے۔ سوئی۔ بدبودار۔ پھیپھاس۔ دسلف، تیلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔
 آنکھ بند کر کے دیکھے۔ زکام رہے پیشاب زیادہ آئے۔ ناک اور اوپر کا ہونٹ سو جا ہوا ہو۔
 میراٹا کارب۔ سلف، چہرہ زرد پھولا ہوا اور یسدام ہو۔ حلق کے اندر کے غدود وٹو نسل، پھوٹے ہوئے
 ہوں۔ اندوں اور وٹوئی خوراک کی خواہش ہو۔ گوشت سے نفرت ہو۔ تے میں تڑش اور جہا ہوا ساد و دھ
 خارج ہو۔ (نثرم فاس، معدہ الٹی طشتری جیسا ہو۔ ناف میں اینٹھن ہو۔ پت کی خرابی سے
 درد تو رنج ہو۔ دست کھڑیا کے یا بھوے رنگ کے (فاسفورک ایسڈ، یا سبز رنگ کے پتلے ہوں۔
 پیشاب بدبودار یا سخت ہو۔ اس میں سفید سفید ذرات ملتے ہوئے دکھائی دیں۔ فوطوں میں پانی اتر
 آیا ہو۔ سیلان الرحم۔ گاڑھا۔ دودھ جیسا۔ ناک رگ کر زور سے آنے والا خارج ہو۔ گلا بیٹھا ہوا ہو
 مگر تکلیف کچھ نہ ہو۔ کھانسی۔ شبلی کی دھک جیسی۔ بلغم ڈھیلی پیپ جیسی اور میٹھی ہو۔ دل کمزور ہو
 دھڑکن ہو۔ چھاتی میں جلن۔ حیض سے پہلے پستانوں میں جلن۔ گردن میں درد اور پر اٹھانے سے ہاتھ
 پھٹتے ہوں۔ غدود بڑھے ہوئے ہوں۔ گردن کے، جلد سرد۔ سانپ جیسی۔ رات کو بڑبڑاتا
 ہو۔ نیند نہ آتی ہو۔ خیالات کی فراوانی بے چین رکھتی ہو۔ چند یا برف کی مانند سرد رہے سر پر
 مانتھوں پر۔ گھٹنوں پر یا پیروں پر دلخ ہوں اور وہ سرد ہیں۔ لرزہ ہوا اور پیاس لگے۔ اندر گرمی معلوم
 دے اور یا ہر ت سرد ہو۔ پسینہ آئے۔ دماغی محنت سے سر گرم ہو جائے۔ ہاتھ چپ دار ہیں
 دسلف، پسینہ۔ تھوڑا تھوڑا سر پر۔ کن پٹیوں پر۔ چھاتی پر۔ مانتھوں پر۔ پیر گھٹنوں پر
 اور تر ر میں۔ پیشاب گاڑھا ہو۔

خوراک دوا۔ اور طاقت استعمال۔ ۶۴۔ ۳۰۔ ۲۰۰۔ ۱۰۰۰۔ یا زیادہ۔
 مدت آخر۔ پانچ ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ میراٹا کارب۔ لائیگو پوڈیم۔ سلیشیا
 ادویات متعلقہ۔ میراٹا کارب۔ سلیشیا لجدیں۔ نائٹرک ایسڈ۔ سلفر۔
 فاو اثر۔ کیمفر۔ ایپی کوٹانا۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس۔

کاربو و قحی ٹیلیس CARBO VEGITABLE'S لکڑی کا کوئلہ

امراض و تاثرات

لعاب دار جھلی { نظام انہضام
معدہ

لسنوں میں
دل { دورہ خون
کن پٹی

اشتداد مرض

گرمی سے
خون نکلنے سے
ٹھنڈ لگ جانے سے
کمزور کر دینے والی بیماریوں سے
پیری میں

مرغن غذا سے

امیرانہ زندگی سے

زیادہ بوجھ اٹھانے سے۔ کپڑوں کے بار سے

شدت گرمی و سردی سے

درجہ حرارت کی تبدیلی سے

رات کو ٹھنڈی ہوا سے

کمر سے۔ رطوبت سے

سر پر ہوا لگنے سے

اخراج دہ جانے سے

انخطاط مرض

ڈکار آنے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے

پیر اوپنے رکھنے سے


علامات۔ غززدہ۔ سنجیدہ۔ بے اصول یا جھٹی اور فتقول سوال و جواب کرنے والا۔
رو عمل سے عاری ہو۔ یا صندی ہو۔ کمزوری۔ اچھا رہ۔ ہوا کی ٹھوک معیت سی دیگر شکایتوں
کے پیکپی۔ کمزوری جی متلائے۔ یکایک طاقت جواب دیدے۔ نبض چھٹ جائے
بیوشی طاری ہو جائے۔ بے جان سا ہو جائے۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ جسم ٹھنڈا رہے۔ مگر
بیمار کی یہ خواہش ہو کہ پنکھا ہوتا رہے۔ یا ٹھنڈے پانی کی پیاس ہو۔ رنگت پیلی پڑ جائے جلد بھلنے

لگے۔ زخم ہو جائے۔ خون جاری ہو۔ سیاہی مائل اخراج ضرورت سے زیادہ بکھرا ہوا معلوم دے۔
 (Venosity) کا گڑھے جلن پیدا کرنے والے اخراج دنا بند راسٹس، چمرا نا دکام۔ بھاری درد
 کرنے والی جلن۔ ہڈیوں میں زخموں میں۔ بے رحمی، بے رحمی، تنفک اور زور و زنج۔ ناخوش ہر بھاری
 معلوم دے۔ سرد درد کن پٹی۔ ضرورت سے زیادہ گرمی سے۔ لیٹنے سے۔ یا ٹوپی کے دباؤ سے۔
 چھینکیں آتی ہوں۔ گلے میں خراش ہی ہو۔ ناک صاف کرنے سے یا پھینکیں آنے سے۔ سردی تنچے کو چھاتی
 ہوتی معلوم دے۔ فاسفورس، مصیبت زدہ سا، مگارا نہ۔ افسردہ چہرہ۔ اوپر کا ہونٹ ٹٹا ہوا۔
 خنازیر۔ دانت ڈھیلے۔ منہ میں چھالے۔ چھوٹے چھوٹے چھالے۔ زبان میا۔ کھانے کے خیال سے
 بھی نفرت ہو۔ ڈکار آئیں۔ بدبو دار۔ بلند آواز۔ کھانسی سمیت۔ بچا پھارہ۔ رکھا ہوا پھولا ہوا
 سیٹ کا اوپر والا حصہ۔ پٹلا، ہر ایک خوراک ہو پیدا کرے۔ بد فہمی۔ درد تو لیج، مقعد میں جلن۔
 زخمی۔ گرم جلن۔ اندام نہانی میں سوزش۔ شام کو گلابیٹھا ہو۔ دم روکنے والی کھانسی معہ سرد درد اور تے
 کے۔ سرد مشروبات سے بہتر ہیں۔ گوز کے ساتھ بلفم خارج ہو۔ بھاری۔ زخمی یا کمزور چھاتی۔ تباہ کن دیرپا
 امراض۔ پھیپھڑے کی تباہ کن بیماریاں سیم۔ فکر و دوشگر کن۔ پسلیاں زخمی سی۔ گویا کہ کمر میں بند لگا
 ہے۔ کمزور انگلیاں۔ کھردری اور وجہ دار جلد خوفناک۔ خواب۔ سوت جیسی ریاریک نیض۔
 کبھی گرمی۔ کبھی سردی۔ لرزہ۔ تپ جیسی سرد۔ زبان۔ گھٹنے۔ ٹانگیں۔ رات کو سانس بہر گرم
 اعضا ٹھنڈے۔ اندرونی گرمی۔ جلانے والی دل میں۔ چھاتی پر۔ جلد تپ جیسی سرد۔ پسینے۔ پسینے
 آسانی سے آجائیں۔ چہرے پر۔ کھانسی سے۔ معمولی خوراک بھی تکلیف دہ ہو۔ دل میں جلن رہے۔
 دست آتے ہوں۔ ہڈیوں میں جلن اور سخت درد محسوس ہو۔ زبان۔ گھٹنے اور ٹانگیں رات کو برف
 کی مانند سرد ہیں +

خوراک دو اور طاقت استعمال - ۱x - ۳x - ۶x - ۱۲x - ۳۰ - ۲۰۰ - ۱۰۰۰ - اور نایڈ۔

مدت اثر - چار ہفتے۔

ممد و معاون ادویات - آرسینکیم چائنا۔ کالی کارب۔ لیکسیس۔ فاسفورس۔
 متعلقہ ادویات - گریفائٹس۔ کوپچکم۔ آرسینکیم۔ ایمونیا کارب۔ لیٹن۔
 قواد اثر - بعد میں۔ کاسٹکم۔ نیٹرم میور +



CANSTICUM

کاسٹیکم

امراض و تاثرات

اعصاب الحساس

عضلات الحلقوم

تنفس

جلد

دائیں جانب

چہرہ

اشتبہ امراض
 سرد و خشک ہوا سے برطوب ہوا سے
 ہوا سے آندھی سے ہوا کا جھونکا گئے سے
 سخت سردی اور گرمی سے
 جھکنے سے - اخراج رک جانے سے
 کافی پینے سے - ۳-۴ بجے صبح کو یا شام کو
 محنت مشقت سے

اخطا طمرش
 کچھ ٹھنڈی چیز پینے سے
 دھونے سے

گرمی سے - اینترک

پہل قدمی سے - آہستہ حرکت سے

علامات - کمزوری - بے قابو ہو جانا - بڑھتا ہوا اشتباہ - لرزہ کھانا - آخر میں کسی ایک عضو پر فالج
 جوڑوں کی سختی پٹھوں کا شکڑنا - ہتھیلی کے دھیرم میوڑ - ران کی لٹوں کا - ہڈی کا - دھلا پن - کسی ایک
 پٹھے میں جھٹکے سے لگنا - مرگی - بوقت شباب - کپکپی جھلن - درود کھڑے رہنے میں متعذیں -
 دماغی تھکان - فکر آلود خطرات - دماغ میں محسوس ہوں - پیشانی کی نیچے دھسوس ہو - پلک چھلکی جھلنے
 بھاری محسوس ہوں آنکھوں میں درد برابر ہوتا رہے - دود کھائی دیں - دائیں طرف دیکھنے پر چیزیں بڑی
 بڑی دکھائی دیں - مسکڑی ہوئی دکھائی دیں - کان میں سے میل بہت نکلتے - کان میں گونج سنائی دے -
 ناک کے پچھلے حصے پر پھنسیاں (Prosopalgia) ٹھنڈے پانی سے - چہرہ پر فالج و لفظہ اگرے
 منہ کھولنے پر زبان کی جڑ میں - حلق میں - جھلنے سے - نکلنے کی کوشش کرے - غلط طور پر نکل جائے چکناٹی
 طے ڈکار - جھکنے پر متعذیں - کھانٹے کھانٹے کا بیج نکل آئے - پاخانہ چمکے شکل سے خارج ہو - کھڑے
 ہو جانے سے پیشاب کی نالی بے حس بنانا - یا متعذ شوس پاخانہ کے لئے دلیلو، بواسیر - چلنے سے سوزش
 ہو - کھانٹے کھانٹے پیشاب خطا ہو جائے - بوند بوند کر کے یا آہستہ آہستہ خارج ہوئے پیٹھے
 سے - دن میں حیض خارج ہو - رات کو سیلان الرحم - گلے کے گڑھے میں سننا بٹ ہو کر کھانسی اٹھے دسیپا -

یابائیں حلقوم میں پیہم رات کو اور صبح خشک۔ کافی گرمی کھانسی نہ لے سکے (درم) کھوکھلے گلے میں واپس پھسل جائے۔ بستر کی گرمی سے۔ جھکنے سے بھنڈی ہوا سے کھنڈے پانی کی چسکی سے۔ چکنا سا مشکل سے خارج ہونے والا بلغم۔ گلا پڑ جائے۔ صبح کے وقت جھکنے سے بات کرنے سے۔ حلقوم میں زخم۔ چھاتی میں زخم۔ واسک تنگ محسوس ہو۔ اٹھنے پر گردن یا کمر میں سختی۔ درد آگے کی طرف یاران کی طرف جائے۔ نگلنے ہوئے ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ انگلیوں کی نوکیں پھٹ جائیں ہڈیوں میں پیروں میں۔ یا پیروں کی انگلیوں میں شخ۔ گہری جلن اور اس کا اثر۔ مسے بھوؤں پر۔ پوٹوں پر۔ ناک پر انگلیوں کی نوکوں پر۔ پانی۔ خون۔ زخم۔ سردی سے نہ ہو گرمی سے پیدا کیے۔ فلج۔ کھانسی۔ دست وغیرہ پسینہ بکے صبح کے قریب۔ بکثرت ذرا سی کوشش سے۔ کھلی ہوا میں +

خوراک دوا و طاقت استعمال - ۳۶ - ۴۶ - ۱۲۶ - ۱۴۶ - سفوف - ۲۰۰ - ۱۰۰۰ - اور زاید مدت اثر - پانچ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات - گریفائٹس ایکسیس - پیٹرومس - سیپیا - سنہ نم - سیفی سیگیریا ادویات متعلقہ جیلیسیم - کالی باکی کارب - فاسفورس - رس آکس - سیپیا - فادائر - جب رہر سیسہ سے فاج گر جائے۔

CHINA

چائنا

امراض و تاثرات

اشتداد مرض -
تضع جوہر حیات یعنی منی و خون غیر چھوٹے
دھماکے سے شور سے
مقرر وقت پر - ہر تیسرے دن - آدھینکم - نیم گرم ہو
سردی سے
جھونکے سے
آندھی سے
کھلی ہوا میں
کھانا کھانے سے

خون
دورہ خون
از اعضاء
اخراج
طوبت
جگر

متلی
اعصاب

پچھل کھانے سے اور دودھ پینے سے

دماغی کام کرنے سے

انخطاط مرض ۷

ڈھیلے کپڑے پہننے سے

خوب دبانے سے

علامات - باری سے بکثرت سخت کمزور کرنے والے اخراج - یا اخراج خون
 (ابر و نیم - فاسفوبک ایسڈ - کلکیر یا سپ) کمزوری تیز حسی اعصابی بے صبری - ہر ایک معمولی بات سے گھبرا جائے - مثلاً روشنی - شور - بدبو - درد - وغیرہ وغیرہ سے - سختی اور سوزش ہو - درد کی جگہ پٹی پڑتی ہو - رتخ اور نزلے کی شکایت - خون کی کمی اور سوکھا یا ہو - ڈراپسی ہو یعنی پیٹ میں جلد بھر یا کہیں اور سے خارج شدہ پانی کا اجتماع - مندی اور نافرمانی و طبیعت - سر جھکانا - پیچھے کی طرف گرتا ہو - دماغ میں ٹرپن - پھٹا جاتا ہو - زخمی سا معلوم دے - کنپٹیوں میں - چاند دھکتی ہو - بال چھوٹنے سے - کان گرم اور خشک ہوں - سر میں جکڑ آئے - بہرا پن ہو - زرد میلا لارنگ ہو - ہمار سا معلوم دے - آنکھوں کے گرد نیلے سے حلقے ہوں - دانتوں میں تپکن ہو - چوسنے سے - ذالیقہ کڑوا - ترش یا تیز - عمدہ عمدہ کھانے پسند کرے - مگر جلد سیر ہو جائے - باد بار بھاری بھاری بلند ڈکاریں آئیں - مگر آرام نہ پڑے (آر جینٹ ناٹریٹ) کھانا دیر میں مفہم ہو - بد ہضمی کے دست - نیلے خون ملے ہوئے اور سیاہ ہوں اور بے تکلیف آتے ہوں کھانے سے - رات کو سیاہ دھبے دار - بکثرت اخراج جیض - ذرا سی حرکت بھی دل دہلنے لگتا ہو - اود سانس اکھڑ جائے - پھوٹا ہوا گھر گھر کرتا ہو سانس آئے - چھاتی میں سخت درد ہو - اور ریڑھ کی ہڈی میں - اچھا رہ ہو - متعدد سے رحم تک درد ہو - تھوک میں خون آئے - پکنے والا پتھن ہو دیر سیر سلف اکندھوں پیکر پولا اور سیکرم کے درمیان بوجھ معلوم دے - گھٹنوں میں اینٹھن ہو - گویا کہ ٹانگوں کے گرد کوئی بند باندھ دیا گیا ہے - حرام مغزیں درد ہو - غنودگی معلوم دے - گہری نیند - خزانوں کی آواز ہو - فکر اور پریشانی والے خواب آتے ہوں - ہاتھوں کی رگیں سوچی ہوں - دھاتھوں اور چہرے کی بخار میں سردی مگر می اور پیٹ کے مدارج صاف صاف نمایاں ہوں - سردی ہلنے کے بعد پیاس لگے - چہرہ سرخ اور گرم ہو - ہاتھ ٹھنڈے ہوں - تپ دق - حر کر دینے والا پسینہ آئے - رات کو ذرا سی حرمت سے کمزوری سے - طبقہ حارہ کے بخارات +

مقدار خوراک و طاقت - ۲۰ - ۳۰ +

کم از کم تقریباً مدت اثر تین ہفتہ۔
 مدد و معاون ادویات۔ آرسینک۔ کلکیر یا فاس۔ کاربوووج۔ خرم۔ کلکاس۔
 ادویات متعلقہ۔ کاربوووج
 مخالف ادویہ۔ ڈیگی ٹیس۔ سیلینم

CHAMMOMILLA

کیمو ملا

امراض و تاثرات

من
 اعصاب
 جذبات

لعاب دار جھلی { اعضائے انضمام
 جگر
 امراض مستورات و بچکان
 بائیں جانب

اشتداد و مرض

غصہ سے
 رات کو

وانت ٹکٹنے کے وقت

سردیوں میں بالخصوص سرد و مرطوب ہوا میں
 سردی لگنے سے۔ آندھی میں

تھوہ پینے سے

منفی اشیاء مثلاً افیون کے استعمال سے

انخطاط مرض

اٹھائے پھرنے سے

معتدل موسم سے

گرمی سے۔ پسینے سے

ٹھنڈک پہنچانے سے یا کوئی سرد چیز لگانے سے

علامات۔ قوت احساس بہت تیز ہو۔ تکلیف میں ادھر ادھر پہلو بدلتا رہے۔ چلانا بہت سہل ہو۔
 فرش پر گھومتا رہے آرسنکم تکلیف کے بارے۔ بے چین ہو۔ بیکراہ کو کرلیٹ جلتے۔ نزل یا درد و سحر کا انکار
 ہو بے چین اور چڑچڑاہو۔ درد قوی لہج۔ خشک دھک والی کھانسی ہو۔ اینٹھن ہو تلخ ذائقے کی تہ ہو
 اعصاب میں مروڑی جھٹی۔ بیداری پر یا تکلیف کے بعد مانتھ سن پڑ جائیں۔ اور کوئی چیز پکڑ سکیں جھکرا ہو
 ہو۔ بد صورت و خندہ۔ غیر متذبذب معمولی سی بات پر بگڑ جائے۔ بولنا یا چھو اجانا

نا پسند کے۔ بچہ گو دین پھراٹے جانے کا خواہشمند ہو۔ جو چیز می دی جائے اُسے
 لینے سے انکار کر دے۔ کان میں درد ہو۔ گرمی سے تکلیف۔ ایک طرف کے گال پر سوجش
 یا سرخی ہو۔ چہرے میں دائیں طرف درد ہو۔ چہرے ٹٹکے ہوئے سے معلوم ہوں۔ ذائقہ تلخ ہو۔ زبان پر
 موٹی زردی مائل سفید تہ جمی ہو۔ ڈکار سے مٹے ہوئے اندھے جیسی بد بو آئے۔ (Distended Bowels)
 تہی ہوئی معدے کی انتڑیاں۔ دمہ ہو۔ گرم خشک موسم میں بیتان ہو۔ ہتھیلی خشک رہیں۔ فہرہ آئے۔ بھلیف
 کے مارے اکھڑی ہوئی یا بار بار چونک پڑے۔ گرم دست آئیں۔ قولنج میں کاٹنے کا سا درد ہو۔ یا ہوا
 پھرے درات کو۔ ایک طرف ٹھنڈی ہو اور دوسری طرف گرم۔ کپڑا کھل جانے سے۔ جلد ٹھنڈی ہو
 مگر جلد ہی گرم ہو جائے اور سردی لگ جائے۔ کبھی گرمی لگے اور کبھی سردی کبھی گرم ہو اور پیاس لگے
 یا درد کے ساتھ گرم گرم پسینہ آئے۔ ناک سے گرم گرم پانی خارج ہو۔ دست گرم۔ قریش
 بد بو دار۔ گھاس جیسے سبزی مائل۔ جھاگ دار۔ پھٹے پھٹے۔ زردی مائل سبز یا بدبو مٹی
 شے ہوئے اندھوں کی سی بد بو والے بے قاعدہ۔ ٹھیک ٹھیک ہونے والے وضع حمل کے سے درد۔ یا اپنے
 رانوں کے اندر کی طرف پھیلنے والے۔ سیاہی مائل جھانٹھ دار اخراج حیض یا رطوبت +
 مقدار خوراک یا طاقت استعمال۔ ۳۳ سے ۳۴ تک
 مدت اثر۔ ایک ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ بیڈا ڈونا۔ کلیریا کلاب۔ میگنیشیا کارب۔ سینٹی کیولا۔
 ادویات متعلقہ۔ نکس و امیکا۔ سیٹیفی سیگیریا۔
 فادرہر۔ اگنیشیا۔ نکس و امیکا۔ پلسٹا۔ کومو کلیڈیا
 مخالف ادویہ۔ زنکم۔

COLOCYNTH

کولوسنتھ

اشتداد مرض

اظہار جذبات سے۔ تنگ آنے یا چہرے
 جانے سے

کچھ جانے سے۔ غصے سے۔

امراض و اثرات

(Trifacial)

چہرہ

تنگ

درد

اعصاب

(Sciatic)

درد

نظام ہاضمہ

انتڑیاں

خصیات الرحم

نلے۔ گردے

بائیں جانب

بے درد والی طرف لیٹنے سے

رات کو۔ بستر میں

ہوا کے جھونکے سے

سردی لگنے سے

اخطاط مرض

خوب زور سے دبانے سے۔

قنہ پینے سے

گرمی سے

آہستہ آہستہ حرکت سے

آرام سے

رفع حاجت سے

گوز خارج ہونے سے

علامات۔ نظام ہاضمہ پر اور ریڑھ کی ہڈی پر خاص اثر کرتی ہے۔ ایک لخت اور نہایت سخت مروڑسا اٹھتا ہے اور اینٹھن ہوتی ہے۔ جس کے باعث مریض درد کی وجہ سے بہت اینٹھا جاتا ہے۔ مڑتا ہے۔ یا چلائے لگتا ہے۔ اس کا جی منٹلاتا یا منہ میں پانی بھر بھر کر آتا ہے (تنخی دور) بجلی کی طرح اٹھتا ہے۔ کاٹھا ہوا چٹکی۔ سی بھرتا ہوا مروڑتا ہوا یا چھیدتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پھر جگہ سن سی پڑ جاتی ہے۔ درد والا عضو بہت چھوٹا سا معلوم دینے لگتا ہے۔ بہت کراہتا ہو۔ نزد ہا درد۔ غصہ۔ بد مزاجی۔ درد سے سر میں چیرنے والا درد۔ پتلیاں پھرانے سے چہرے میں درد دیکھ معہ آنکھوں کی علامات کے (Costialgia) کے ساتھ ادا لے بدلتے۔ اینٹھا اور مڑا ہوا چہرہ۔ دیر تک بد ذائقہ قائم رہے۔ سخت کاٹنے والا۔ نوچنے والا درد۔ قویٰ مریض کو ڈہرا کر دے کے سخت دباؤ سے۔ پاخانے میں یا ناف کے پاس سخت کاٹنے والا درد ہو۔ انتڑیاں پتھروں میں دبی ہوئی سی معلوم ہوں۔ نلوں کے درمیان درد۔ زرد۔ جھاگ دار۔ پانی جیسے پتلے چھچھروں والے۔ حرش۔ بدبودار۔ چپکے ہوئے دست آئیں۔ سخت درد قویٰ رخ کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے پیش ہو۔ مقعد سے پھلنے والے بیلے سے خارج ہوں۔ پیشاب کے ساتھ چپکنا ہوا بدبودار مادہ خارج ہو۔ دایر کندہ کے نیچے درد ہو کے دبانے سے (برائی اگر گدرد ہو) حرکت سے

دوسے سے۔ یارات کوئے درد والے پہلو پر لیٹنے سے عضو اندر کو گھٹے ہوئے معلوم ہوں۔ بدبودار پسینہ
مقدار خوراک اور طاقت۔ ہسے۔ ستھک۔

مدت اثر۔ چار ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ کاشی کم۔ مرکبوریس۔ سیٹنی سیگیریا۔

ادویات متعلقہ۔ سیٹنی سیگیریا۔

فادزہر۔ کوفیا۔ سیٹنی سیگیریا۔ کیہو میلا۔

مخالف ادویہ۔ کاسٹکم۔

DIGITALIS

اشتداد و مرض

اوپر اٹھانے سے

جسمانی محنت سے

بائیں طرف لیٹنے سے

حرکت سے

گرمی سے

خوراک کی بوسے۔

ٹھنڈی اشیاء پینے سے

زیادتی سے۔ خصوصاً کثرت جملع سے

انخطاط مرض

آرام کرنے سے

ٹھنڈی ہول سے پت لیٹنے سے

دُجی ٹلیس

امراض و تاثرات

دل۔ اعصاب

دورہ خون } جگر
پھیپھے
معدہ
کینٹی

اعضائے تناسل و پیشاب

علامات۔ کمزوری۔ غشی کی مانند۔ جسے کہ بات تک بھی نہ کر سکے۔ دل کی حرکت کمزور۔ مہم
یا بے قاعدہ۔ حرکت سے تیز ہو جائے۔ جگر کی خرابی۔ یا کثرت جملع سے پیدا شدہ آفاقا دثباب میں۔
چلنے پھرنے کی سید خواہش۔ تفکرات پیشاب کی دقت آمیز خواہش۔ فکر آلود تنائیں۔ سرچکرا نا۔

سر میں کڑاؤں کا احساس ہوئے کیلئے لینچر آؤپے سر کا درد (SPASMODIC HEADACHE) زردی یا لیمون
 زبان موٹی اور دھوئیں دار (THICK FILM) چھوٹا ہونٹ اور زبان زرد نیلگون۔
 پیاس کی زیادتی۔ بھوک کی کمی۔ دسلفر بخار نہ ہو موت اور تسلی یا فم معدہ میں غشی آور دباؤ کا احساس۔ سوزش
 جگر۔ چھو آہمی نہ جاسکے۔ سفید رنگ کے دست۔ بوند بوند کر کے پیشاب آئے۔ ڈراپسی کسی مقام سے
 خارج شدہ پانی کا اندرونی اجتماع مثلاً جلد ہر وغیرہ مثلاً کی گردن میں ٹرپ۔ علی الصباح
 ایستامکی عضو تناسل۔ رات کو احتلام۔ پروستٹیٹ گلینڈر گلیٹیوں کی بڑھاپے میں (Prostate Glands)
 کی سوزش۔ حشفہ پر سوزش۔ سوزال دجا کا سوزاک میں سر دی مائل سفیدی کا بکثرت
 اخراج۔ سانس آہستہ آہستہ آتا ہو۔ اور ایسا معلوم ہو گویا دم گھٹا جاتا ہے۔ کھانستے ہوئے یا نفاہ
 ہاتھیں دھو۔ دل کمزور۔ ایسا معلوم ہو گویا اس کی رفتار ٹرک جاسکی۔ دھڑکن۔ بروسی معلوم ہو۔
 نبض کی رفتار کم دے قاعدہ۔ غنودگی۔ گر پڑنے کے خواب جس کے صدمے سے آنکھ کھل جائے۔ جلد
 ٹھنڈی ہو۔ پھر پھر گرمی محسوس ہو۔ کمزوری جید ہو۔ ٹھنڈے اور پیسے دار پیسنے آئیں۔ یا یاں باند
 شق یا کمزور +

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۳۰ سے ۳۰ تک

مدت اثر تین ہفتے۔

مدد معاون ادویات

ادویات متعلقہ۔ گلوٹیم۔ سپائی جیلیا۔

فاد اثر۔ کیفیر۔ پیٹریا۔

DROSEBA

ڈروزیرا

اشتداد مرض
 نصف شب کے بعد
 لیٹنے سے
 گرمی سے
 باتیں کرنے سے

امراض و تاثرات
 اعضائے تنفس
 ہڈیاں۔ لمبی (دشی نجیا)
 جوڑوں کی ہڈیاں
 آواز (دیر تکس)؟

چھاتی پھیرے

غدد

ٹھنڈی شیا کھانے سے

بہننے سے

خسرہ کے بعد

انخطاط مرضی

دیانے سے

علامات پھیر کر یک لخت حملہ کرنے والے نرے یا اخراج خون کے اخراجات۔ تپ و ق۔
جلدی خفہ آجائے۔ مریض کی خواہش ہو کہ ڈوب کر مر جائے۔ جرش بوکا تیز احساس۔ درد اور پھینکیں
خواب ذائقہ سڑا ہوا سا۔ کھانسی کے دورے جو پھیر کر تیز گہرے مکر مسلسل رہیں
جن سے کتے کے بھونکنے جیسی آواز آئے۔ اور دم گھٹنے لگے۔ کھانسی گویا پیٹ سے
اُٹھے۔ سانس بند سا ہو جائے۔ پسلیاں پکڑنے کو مجبور ہو۔ جن کا فائدہ ڈکار آئے۔ قے آئے۔
ٹکسیر آئے یا ٹھنڈے پسینے آئے پر ہو۔ بعد میں (Loquacity) ہو۔ کالی کھانسی ایسا
محسوس ہو گویا گلے میں کوئی پر پھیر رہا ہے یا کچھ اٹکا ہوا ہے۔ گلا میٹھا ہوا ہو۔ بے لہجہ آواز۔ چھاتی میں
کچھاوٹ محسوس ہو۔ محروں کا شخ یا ماتھ کی اینٹھن۔ تھوک میں خون۔ زبان صاف نہ ہو۔
کھانسی ہوئے کتے کے بھونکنے کی سی آوازیں نکلتے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ اسے ۲۴ تک سفوف کی صورت میں۔

مدت اثر۔ ۲ ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ کاربوئیج۔ نکس و امیکا۔ سلفر

ادویات متعلقہ۔ کوریلم روبرم۔ کوکس کیکٹائی۔

ذاد اثر۔ کیمر۔

DULCAMARA

ڈلکامارا

امراض و تاثرات

ہوا کی نالی

مشانہ

آنکھ

عضلات

کر

جاذب نالیاں

جلد

لعابدار جھلی

بیلٹھ

اشتداد مرض

گرمی میں

درجہ حرارت کی تبدیلی سے

کپڑے اتارنے سے

ٹھنڈے پانی میں پیر رکھنے سے

بھیک ہانپنے سے

ٹھنڈی مرطوب پیرتہ خانے میں

بائتھلر بستیر پر سونے سے

رطوبات جسمانی ٹوک جانے سے

پسینہ ٹوک جانے سے

پھوڑے وغیرہ دب جانے سے

موسم خزاں میں

رات کو

آرام کرنے سے

چوٹ سے۔ طوفان سے پہلے

پاؤں کے استعمال سے

علامات۔ کسی لعاب کے زیادہ خارج ہونے سے۔ نزلے۔ سوج۔ جگری خرابی کی طرف میلان ہو
 سختی۔ بے جستی۔ درد بازو۔ پاؤں میں یا فوطوں وغیرہ میں مروڑ یا اینٹھن۔ چیرنے والا درد۔ فالج کا اثر۔ کھیرا
 دل کا بیٹھا جانا یا انگلیں رہنا۔ گرا بھلا کہنا۔ بولنے میں دقت۔ جلدی سے سرسام ہو جائے۔
 کینٹی بڑی محسوس ہو۔ چند یا پر وادہوں۔ ناک میں درد ہو۔ ناک بہے۔ رگ کی ہوئی معلوم دے۔ موسم
 گرمی میں زکام ہو جائے۔ دست لگ جائیں۔ حیض کی بجائے نکسیر کئے۔ زبان پر سوزش ہو۔ چپکنے والا
 یا صابن کے سے جھاگ والا تھوک۔ ناف کے قریب کاٹنے کا سادہ ہو۔ درد کے ساتھ سبز رنگ
 کے جھاگ دار دست آئیں۔ نزلش بدبودار پتلے دست آئیں۔ رات کو مروڑے بخیف سی سردی

بھی آنکھ اور شانے پر (پاسٹلا) دستوں یا تنفس پر اثر انداز ہو (سلفر) پیشاب بہت آئے۔ دم میں دار
یا جھاگداریاں بولوار پیشاب۔ ڈراپسی نوٹے بڑے ہوئے جن میں سخت درد ہوتی ہو۔ حیض میں پانی جیسا
خون خارج ہو پھوڑے پھنسی۔ دل وار ہوئے کھرنڈ والے جن جن سے خون بہے۔ خارجی۔ حیض سے
پہلے چھپاکی (Urticaria) غلبہ شہوت۔ بڑے گوشت دار مے۔ سردی کا احساس کپٹی پر مکر کے ارد

گرد۔ انٹریوں میں۔ فالج زدہ حصہ برف جیسا سرد ہو۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۲۰ سے ۳۰ تک۔

مدت اثر۔ چار ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ ایلیومن۔ میرٹھا کارب۔ نیتروم سلف۔

ادویات متعلقہ۔ رس ٹاکس۔

فاد اثر۔ چار ہفتے

مخالف ادویہ۔ بیلاڈونا۔ لیکسیس۔

زرد جمیلی GELSEMIUM

اشتداد مرض ۷

جذبات سے خوف سے

حیرت سے۔ صدمے سے مشکلات سے

موسم میں بہاریں۔ گہریں
موسم میں مرطوب۔ گھٹا ہوا

گرمی سے۔ وقت مقررہ پر

دانت نکالتے وقت

تھپاکو سے۔ گیس سے

انحطاط مرض ۷

بکثرت پیشاب آنے سے

پسینہ آنے سے

جیلیسیم

امراض و تاثرات

کن پٹی

گڈی

گڈن

عضلات۔ گھٹنا

اعصاب قوت۔ پیردہ چشم

آنکھیں۔ انبصارت

تاک

عاب دار جلی (Gall Ducts)

دائیں جانب

ہلانے سے شراب کے استعمال سے

مشروبات سے

دماغی محنت سے

علامات۔ درد تھکان۔ بھاری پن۔ کمزور۔ دکھن۔ اعضا میں۔ مروڑ۔ خاموش
 لیٹا رہے۔ سہارا لگائے بیٹھا ہے ریشنے کی حالت میں۔ اعصابی کمزوری حد درجے کی کچکچی کسی ایک
 پٹھے میں اینٹھن۔ چہرے میں۔ بھوڑی ہیں۔ زبان میں۔ یہ خواہش کہ کوئی پکڑے رہے۔ لرزہ
 دوران حمل میں اثرات فلج۔ آنکھوں میں۔ گھٹے میں۔ مقعد میں۔ بٹلے میں۔ بھرا بھرا محسوس ہو۔ بھول
 انجماد۔ علامات معہ دوران سر۔ آنکھوں یا بصارت میں غنودگی۔ بار بار پیشاب آئے۔
 گھبرا یا ہوا۔ بوکھلایا ہوا۔ سست یا لا پرواہ۔ آہستہ آہستہ جواب دے۔ ڈنٹا رہے مگر نے سے
 تکلیف سے موت سے۔ درد سے۔ دوران سر شرابیوں کا سا۔ کن پٹی میں۔ سرد درد۔ سست۔
 بھاری۔ بند سا بندھا ہوا۔ کن پٹی میں۔ آنکھوں کے اوپر تک۔ تنگ ٹوپی سے۔ سوزش سی محسوس
 ہو۔ درم دماغ۔ مرگی۔ آنکھیں درد کریں۔ آنکھیں بھاری لگیں۔ دیکھیں۔ پر دو چشم بھاری ہوں
 مندے جائیں۔ بصارت۔ دو دو نظر آئیں۔ پیزن تیرتی ہوئی سی دکھائی دیں۔ اندھے پن کا دورہ
 چہرہ بھرا ہوا۔ دھندلا سرخ۔ بھاری۔ غیر مظهر۔ دھواں سا چھایا ہوا۔ پلوں میں نزلہ کا درد۔ نکلنے پر
 کان میں درد۔ ناک رکی ہوئی۔ چھینکیں آئیں۔ تپلا چڑھتا ہوا۔ کام۔ زبان بھاری۔ بولنے میں
 موٹی۔ پیاس نہ ہو۔ بٹانے میں اینٹھن۔ بہ افراط۔ زرد دست۔ بے درد۔ اعصابی دست۔ وضع
 حمل کے بعد مقعد میں درد۔ صاف پانی جیسا پیشاب کے سرد کو۔ کبھی پیڑوں میں اور کبھی سر میں درد۔
 رحم میں بھاری پن۔ درد گویا پکڑا ہوا۔ پردہ در حوض۔ وضع حمل کا درد اوپر کو جائے۔ پیچھے گویا نیچے کو
 رانوں کی طرف جلتے۔ گہرا زرد سیلان الرحم۔ آیام حیض میں گھلا پڑا جائے۔ سانس تکلیف سے آئے۔
 چھاتی میں ڈھیلا سا معلوم دے۔ انجماد۔ دل میں درد۔ حرکت بند ہو جانے کا ڈر لگے۔ حرکت کی خواہش
 ریڑھ کی ہڈی اوپر یا نیچے۔ درد کے سیر کرنے سے۔ ساتھ ساتھ کن پٹیوں میں درد۔ کندھوں کے نیچے درد
 سر میں درد۔ (دائیں جانب) گھٹنے کمزور۔ اترتے ہوئے۔ لڑکھاتی چال۔ ٹانگیں بے قابو۔ زرد دم طربا
 جلد۔ غنودگی۔ سوتے سوتے چڑک پڑے۔ گہری مدہوشانہ نیند۔ نبض بھری ہوئی۔ گول۔ حرم۔
 کن پٹی سے پیشانی کی طرف خون کا دورہ۔ بصارت میں گڑبڑ۔ پھر سردی لگے۔ سردی لگے درد ہو سستی
 معلوم دے۔ (لیٹیا) گرمی ملی ہوئی یا ادلتی بدلتی۔ پشت کے اوپر اور نیچے۔ ماتھ پیر ٹھنڈے۔

گرمی اور نیند۔ پیاس نہ ہو۔ لرزہ اعضائے تناسل پر ٹھنڈے پسینے۔ بخار۔ سفر اویسیا۔

فصلی۔ لمبریا۔ سیربروسپائٹل +

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔

مدت اثر ایک ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ آرٹھرم۔ نائٹریٹ۔ سیسیا۔

ادویہ متعلقہ۔ کونیم۔ آگنیشیا۔ مرکبوس ایک۔ ٹیٹرم میور۔ سیسیا۔ وریٹرم در۔

فادافٹ۔ چائنا۔ کلنی۔

سرمہ

GRAPHITES

گریفائٹس

اشتداد مرض >

سردی سے بھنڈی ہوا کے بھونکے سے۔

ایام حیض کے دوران میں

اخراج دہب جانے سے

خالی تھوک نکلنے سے

چربی گرم مشروبات سے

بستر کا گرمی سے

کبھی سے

انخطاط مرض >

کھلی ہوا میں

اند پر پھرنے سے

چھونے سے

خوراک سے

امراض و تاثرات

پرورش۔ دورہ خون

جلد۔ کان کے پیچھے۔

تہوں میں

سورخ و ناخن

لعا بدار جھیلیاں

آنکھیں

غدد

علامات۔ ڈیصلے کی مانند موٹے یا سخت (چائنا بھوجا) امراض جلد۔ غدد اور ناخن

زخم گتوں پر۔ دست۔ کھرنڈ۔ پانی سننے والے۔ یوائی یا شگاف۔ زراویوں۔ آنکھوں یا تھنوں میں۔ ہاتھ

کی آنکھوں یا پستانوں کی نوک پر۔ چوڑوں میں وغیرہ۔ زیر اثر حصے کا سوکھ جانا۔ تھوڑا سا بدبودار

اور چپکنے والا اخراج۔ چلاؤنی اخراج۔ جلن یا بے حتی۔ جس کروٹ لیٹے ہو اس کی دوسری طرف درجاً
 چربی۔ ڈھیلپن بھٹکا ہونا اور قبض ہونا۔ ٹھیکین رہنا۔ خوفزدہ۔ متلون المزاج اور ارادے کا کمزور
 ہونا۔ کھانے سے رونا آتا ہو۔ دماغ بے حس سا ہو۔ چاند پر جلن ہو۔ کن پٹی بھاری معلوم دے۔ رسولی۔ بال
 آنچے ہوئے اور پھٹے ہوئے ہوں اور گرتے ہوں۔ چند یا اور پنوکے۔ شور میں زیادہ سنائی دے۔ کان کے
 پیچھے پھنسیاں ہوں۔ آنکھوں میں پڑ بال داندرونی پکیں، روشنی سے خوف۔ کان میں کھرنڈ نکلیں۔ کان پیسے۔
 نکیں پانی سا خارج ہو۔ ناک اور کان خشک ہوں۔ ناک زکام ہو۔ بند ہو یا کبیر آتی ہو۔ حیض سے پہلے
 سونگھنے کی طاقت تیز ہو۔ ذائقہ خراب ہو۔ زبان پر مٹی اور سفید تہ۔ دجے میل کے جے ہوں۔ دم گھٹتا
 ہو۔ خنسا زبر وغیرہ سے۔ بھوک۔ مٹھائی اور گوشت پسند ہوں۔ کبھی ماضیہ طراب ہو جائے کبھی خرابی
 جلد کی علامات نمودار ہوں۔ تکلیف دہ اور کٹتی دکائیں آئیں۔ جلی جلی سی۔ کھانے کی ضرورت محسوس ہو
 کمر کے قریب بوجھ برداشت نہ ہو سکے۔ بری بری دکائیں آئیں۔ اچھا رہے ہو۔ انتریاں کام نہ کریں۔
 دست میں بڑی بڑی گھٹلیاں۔ آند میں لپٹی ہوئی۔ نہایت تکلیف سے خارج ہوں۔ یا
 پیٹے خالی مائل رنگ کے بدبودار دست آئیں۔ کئی دن تک پاخانہ نہ آئے۔ (سیسیلا، مباحثت کے بعد کمزوری
 وغشی سی طاری ہو جائے۔ نامردی۔ چوڑوں میں اور پوڈیڈم میں کھلج۔ حیض سے پہلے۔ جملع سے لغت۔
 نلوں میں سوزش۔ حیض بے قاعدہ۔ جبر سے۔ کم تکلیف کے ساتھ۔ سردی لگ جانے کے باعث۔
 صبح کے وقت حتی۔ دوران حیض میں پسینہ۔ حیض کی بجائے سفید رطوبت کا جلن کے ساتھ بکثرت اخراج۔
 نصف شب کے بعد دم گھٹنے لگے۔ کھانا کھانے پر۔ زبان بے قابو ہو کر بولنے سے۔ دورہ خون
 بے قاعدہ۔ تیز۔ سر کی طرف رجحان۔ گئے پر سوزش۔ آگ کی گرمی سے۔ دباؤ سے پیروں
 میں ترش بدبودار پسینہ۔ انگلیاں چٹی ہوئیں۔ ناخن گھٹے ہوئے۔ کچلے ہوئے سے جلد خشک
 کھانج ہو۔ سانی سے پھٹ کر لیس دار پانی خارج ہونے لگے۔ دتوں میں۔ زخم دیر
 میں چرہ ہوں۔ تروہیں۔ کھرنڈ آئیں۔ یگریمیا متیلی پر۔ مانگوں پر یا متعدد کے آس پاس ایک جگہ سے
 دوسری جگہ سے۔ جانے والی یا بار بار ابھرنے والی پتی دھپکی، دماغی ڈرالش۔ رس ناس، ٹھنیاں
 دگر می سے۔ سردی بہت محسوس کرے۔ ہڈیوں میں۔ تکلیف ہو۔ بیتے زکام میں۔ معدے میں
 مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۶۔ ۳۰ تک

مدت اثر ۵ ہفتے

ممد و معاون ادویات۔ آرسینک۔ کاشی کم۔ فرم۔ ہیپر سلف۔ لائیو پوڈیم۔ سلفر۔

ادویات متعلقہ۔ آرسینکیم۔ کلکیر یا فلور۔ کار۔ کالی یا بی کارب۔ یسٹلا
فادائر۔ نکس و امیکا۔ ایکونائٹ۔ آرسینکیم۔

HEPAR SULPH
کلکیر یا اور سلفر

ہیپرسلف

استد او مرض

امراض و تاثرات

سر دی سے۔ ہوا سے
ہوا کے جھونکے سے۔ آندھی سے
عضو کی خشکی سے
کھل جانے سے
چھوٹے جانے سے
شور ہونے سے
محنت کرنے سے
سر دی سے۔ ہوا سے
ہوا کے جھونکے سے۔ آندھی سے
عضو کی خشکی سے
کھل جانے سے
چھوٹے جانے سے
شور ہونے سے
محنت کرنے سے
درد لے جتنے پر لیٹنے سے
پاؤں کے استعمال سے
رات کے وقت

انحطاط مرض

گرم کر کے پینے سے
سر کو کھینچنے سے
تری سے
تر موسم میں

اعصاب
جوڑنے والے ریشہ جات
جھلی متعلقہ تنفس
پک داپٹے
غدد۔ مشاد
جلد
ناک کی ہڈی دکالی یا بی کارب

علامات۔ ڈھلا پن خفیف سی سردی اور گرمی کا بھی اثر ہو۔ سردی بہت لگے درود بہت
محسوس ہو۔ بہت جلد بیہوش ہو جائے۔ آخر ارج بکثرت ہو۔ بدبودار۔ سر سے ہوئے پنیہر جیسی بو والا۔
شرش۔ دست ہوں۔ جسم سے بو آئے۔ پسینہ بہت اور بہ آسانی آئے۔ جسم کھولتے ہوئے خون
معلوم ہو۔ مگر آرام نہ پڑے۔ ایسا محسوس ہو گیا جسم پر آندھی سی چل رہی ہے۔ گرمیوں میں بھی اور کوٹ پینے

ہر آسانی سردی لگ جائے۔ جلنے اور چپکنے والی۔ پھانس چھبے جیسی تیز تکلیف۔
 ہر ایک چوٹ یک جائے بہت گاڑھی راد پڑے۔ پھوڑے۔ مزاج جلد باز۔ غصہ ور۔
 چمڑا اور غیر مطمئن۔ بال جگہ جگہ گرتے رہیں۔ چھوٹے سے بھی درد کریں۔ روشنی سے نفرت۔
 کان بے دیریتہ۔ ناک بند اور تکلیف دہ۔ غرض زکام۔ بلغم دیر سے نکلے۔ گلے میں کچھ اکٹا ہوا معلوم
 دے۔ خناق۔ گھیکا (دائیں) معدہ کمزور جلدی سے خراب ہو جائے۔ ترش چیزوں کی چاٹ۔ عافیت
 بخش ہشیا کی خواہش۔ کھانے سے فرحت ہو۔ مگر قیض کمرے۔ پیشاب سے فراغت پانے کے لئے
 انتظار نہ کرنا پڑے۔ بعد میں خون اور پیپ آئے۔ سرخ بخار کے بعد گردے کی بیماری۔ نہایت بدبودار
 جھلی دار یا پیپ جیسی سفید رطوبت کا اخراج گلے میں تکلیف۔ سیٹی کی سی آواز۔ سانس لینے سے دم گھٹے
 سر تھپے جھکنا پڑے۔ کروپ۔ گوتوں کا گلا پڑا ہو۔ غرض تکلیف۔ رگنا بیٹھ جانا۔ دم۔ تک جاتے کے بعد
 کھانسی۔ دم گھوٹنے والی۔ کتنے کی سی آواز۔ سرد مشروبات سے یا صبح کے وقت دھک سی
 اُٹھے۔ جیسے کوئی پر گلے میں اکٹا ہو۔ بلغم نرم ہو مگر خارج نہ ہو سکے۔ ٹھنڈی ہوا میں اور
 بھی تنگ کرے۔ کمزوری ہو۔ چھاتی میں گھڑ گھڑ کرے۔ بلغم بہت خارج ہو۔ زرد۔ گاڑھی۔
 بار بار ہونے والا برا نکاس۔ سردی کے لئے جلد بہت ذی جس (ایگر اس) گندی اور تیز پھنسیا
 بڑے زخموں کے گرد چھوٹی پھنسیاں۔ رات کو پسینے آئیں۔ ہلکا ہلکا بخار رہے۔ تپ وق جیسا
 مقدار خوراک و طاقت استعمال
 مدت اثر۔ چھ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ آیوڈین۔ سیلیا۔

ادویات متعلقہ مرکبوریس۔

قاواثر۔ سیلاڈونا۔ کیمولا۔ سیلیا۔ کالی آیوڈین۔ مرکبوریس سول۔

بعد میں دی جائے۔ فاسفورس۔ سیلیا۔

ہائیس

HYOSCYAMUS ابوائین

اشتداد مرض >

جذبات خوف
احسدچھوٹنے سے۔ لیٹنے سے
ٹھنڈے سے

سوئے سے

انخطا مرض ے

بیٹھنے سے

امراض و تاثرات

من۔ دماغ۔ اعصاب

اعصاب چہرہ
آنکھیں

خون

علامات۔ مرکز اعصاب میں اجتماع۔ چہرہ زرد ہو۔ تشنج ہو۔ کپکپی ہو۔ جھٹکے سے لگیں۔ اینٹھیں ہو۔ پر جوش دیوانہ پن ہو۔ جس کے خاتمے پر پست ہمت کرنے والا تشہہ سام ہو جائے۔ یا پکڑنے کی سی حرکات ہوں یا اور بہت سی پریشان کن حرکتیں کرے۔ سر سام کا زور ہو۔ دیوانہ پن بنگا ہو جائے اپنے عضو تناسل کھیلے۔ گالہ بگاتا اور لڑتا جھگڑتا ہو۔ اپنی انگلیوں سے کھیلتا ہو۔ اور بہت سی مضحکہ خیز حرکتیں کرے۔ اکیلا رہنے تعاقب اور پانی سے خوف کھاتا ہو۔ وہی اونٹنک مزاج ہو بھاگنا چاہے۔ ہر ایک لفظ باوازد بلند بولے۔ پہلے سوچ نہ سکتا ہو شکل کچھ ہوش میں لایا جائے پھر ویسا ہی جائے۔ کچھ منہ میں ٹر بڑاے۔ اور بسترے میں لیٹ جائے۔ نامعلوم طور سے دھت غار ج ہو جاتے ہوں۔ خواہ سخت ہوں یا نہایت پتلے۔ خون آلود درد ہوں۔ چپ حرکت کی سی حالت ہو۔ خشک اور بے چین کرنے والی کھانسی کا رات کو دورہ پڑے۔ لیٹنے سے۔ کھلنے سے یا بات چیت کرنے سے سوتے سوتے اٹھ بیٹھتا ہو۔ ہلکا ہلکا بخار رہے۔ جلد کا رنگ زرد ہو اور گرم رہے۔ گرم گرم پسینہ آئے سر میں چکرائے تشنج ہو۔ سرد میں بھیج بڑھتی ہوئی محسوس ہو۔ سر آگے پیچھے ہلے داکے جھٹکے سے۔ بھینگا دیکھے۔ روشنی ناپسند کرے۔ بار بار آنکھیں بند کرے۔ منہ دھائے دانتوں پر میل جما ہو زبان سخت۔ سیاہ۔ سرخ پھٹی ہوئی سی۔ کوا بڑھا ہوا۔ رات کو بار بار پیشاب آئے۔ یا رنگ جائے مقدار خوراک و طاقت استعمال ۶۰ سے ۲۰۰ طاقت تک مدت اثر۔ ایک ہفتہ۔

ممدو معاون ادویات
ادویات متعلقہ - بیلاڈونا - فاسفورس - یسٹرومونیم -
- بیلاڈونا - کیملر -

فادر ہنز - اگنیشیا

امراض و اثرات

من
نظام عصبی
دماغ اور ریزہ کی ہڈی دھرا
(Cerebro Spinal Axis)

IGNATIA بیتا

اشتداد مرض

عجم سے
کھجائے سے
جذبات } فکر سے
خوف سے
کھلی ہوا سے
ہول سے } ٹھنڈی ہوا سے
بدلتے
چھوٹنے سے
تھوہ کے استعمال سے
تباک کے استعمال سے
انخطاط مرض
کروٹ بدلتے سے
پیلو پر لیٹنے سے
پیشاب کرنے سے
تنہائی میں
دبانے سے

حالت

علامات - غلطی آمیز متضاد یا اچانک اثرات و حرکات - اکثر تشدد آمیز -
اور اکڑاؤ - تشنہ - کپکپی وغیرہ - دوران درد میں - تمام جسم میں جھٹکے سے لگیں - گولاسا

محسوس ہو۔ کسی غیر چیز کا یا سخت دباؤ سا معلوم دے۔ ہٹیر یا ہو کسی جگہ درد ہو۔ زیادہ توجہ سے۔ پیشاب سے۔ چوکتا پن۔ تیز جس۔ اعصابی گھبراہٹ۔ جلد جوش میں آجائے۔ متلون مزاج۔ مغموم۔ تغیر پسند۔ کمزوری ہو۔ جلد بیوض ہو جاتا ہو۔ کبھی آہیں بھرتا اور کبھی روتا ہو۔ کبھی ہستا ہو۔ صدمہ عشق۔ مغموم رہنے میں ہی لطف محسوس کرے۔ غمزدہ۔ چپھلی باتوں کو یاد کر کے افسوس کرے۔ کبھی کمر میں درد ہو۔ کبھی سر میں دسلی لوٹس۔ سر درد۔ جھجائیاں۔ ڈا بایاں۔ یا تے آنے سے بند ہو جائے۔ پردہ چشم خشک معلوم ہوں۔ مدوشنی کی چپک سی دکھائی دے۔ بہت کھانستے کھانستے اندر سانس کرکٹا ہونا۔ ناک کو متاثر کرے۔ ناک کی جڑیں درد ہو۔ چھینکوں کا حملہ۔ ایک طرف کا رخسار سرخ ہو۔ جب اید ہو جائے۔ اندر نچال کو یا زبان وغیرہ کو کاٹے۔ بچے کے جڑے کے پٹھے۔ میسٹر۔ سخت ہو جائیں۔ یا ان پر چھوٹے چھوٹے زخم پڑ جائیں۔ بڑے بڑے لقمے نگلتا چلا جائے۔ ٹھوس خوراک سے۔ بچکیاں لگ جائیں۔ خالی خالی یا کر دوی ڈکاریں بھی آئیں۔ بھوک لگے۔ جی مثلے۔ کچی خوراک کھانے کی خواہش۔ معدہ خالی بیٹھتا ہو۔ محسوس ہو۔ یا رہ رہ کر درد اٹھے۔ کھانے سے آرام نہ پڑے۔ پافانہ تکلیف سے خارج ہو۔ خواہ نرم بھی کیوں نہ ہو۔ متعدد میں کچاؤ محسوس ہو۔ عصبی مریضوں کی دل کی قبض۔ مقعد میں اوپر کو درد چڑھتا ہو۔ محسوس ہو۔ بوا سیر ہوئے بیٹھنے سے کایخ نکل آئے۔ حیض بے قاعدہ ہو۔ گہرے اور لمبے سانس لینے سے آرام محسوس ہو۔ دم گھٹا جائے۔ خلق ڈکا ہو۔ کھانسی کا دورہ بہت سخت ہو۔ جس سے دم ڈکا سا جائے خشک گویا مٹی سے یا گندھک کے دھوئیں سے دھسک اٹھے۔ کھانسی سے۔ تالوں کچاؤ۔ گھینگایا۔ نہیلاں۔ گردن کی انس میں کچاؤ۔ پنڈلیوں میں بانٹنے۔ تشنج۔ پافل بھاری محسوس ہوں۔ جلد درد کرے۔ دہلنے سے یکایک بہت جھجھکیاں آئے لگیں۔ بیند اھی طرح نہ آئے۔ ذرا سی آہٹ سے بھی چونک اٹھے۔ سردی بہت محسوس ہو۔ لرزہ چڑھ جائے۔ عصبی گھبراہٹ۔ پیاس۔ درد۔ گرمی لگے۔ کچھ اور معنی کو جی نہ کرے پیاس یا نکل نہ ہو۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال ۶۰ سے ۲۰۰ تک

مدت اثر۔ ایک ہفتہ

ممد و معاون ادویات۔ نیشتر مہور۔ فاسفورک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ سیپیا۔ آرم میٹ

ادویات متعلقہ۔ سسی سی فوگا۔ نکس و امیکا۔ سیپیا۔

خاد اثر۔ پلسٹلا۔ کیو میلا۔ کاکونس

مخالف ادویہ۔ کوفیہ۔ نکس و امیکا۔

IPECAC

ایپی کاک

امراض و تاثرات

اعضائے انضمام

معدہ
جھلی
اعضائے تنفسپھیپھڑے
پھیپھڑے اور طق دینو گوشت
اعصاب
ریڑھ کے
جلدی رکیٹینیس
ناف

اشتداد مرض

گرمی سے
مرطوب - گرم ہوا سے
کمرے میںبرف یا گوشت
زیادہ کھا جانے سے
تفتین بھاری اور بریلی جلی
غذاؤں سےاوقات مقررہ پر
کونین کے استعمال سے
میں مقررہ وقت پر نہ ہوالی سروی یا گرمی
انخطاط مرض

تازہ ہوا سے

علامات بکثرت اخراج جھاگ والے اخراج - دست وغیرہ لگنا ناجی متلانا ہے۔ تھیں میں
چکدار خون آتا ہو۔ سانس اکھڑ جاتا ہو۔ بہت سی دیگر شکایتیں ساتھ ہوں۔ بچوں کا تشنج۔ چلانا اور روتا
رہنا ہو۔ مشکل سے خوش ہو۔ سر جھکائے سے کچلے جانے کا احساس چہرہ زرد ہو۔ آنکھوں اور منہ نوٹوں
پر نیلا پن۔ پیاس نہ ہو۔ کینٹی میں درد ہو۔ دتے سے سردی سے۔ آنکھوں سے بہت پانی خارج ہو۔ دایاں
کان سرد ہو۔ نکسیر آئے جھینکیں آئیں۔ زبان صاف یا لکڑ پر سرخ ہو۔ یکایک بیوش ہو جائے
متلی بہت سخت ہو۔ تے آئے سے بھی آرام نہ پڑے۔ تے بہت ملی دھکے سے۔ خوراک سے نظر
معدے میں ڈھیللا پن یا ڈوبا جائے۔ ناف کے گرد اینٹھن۔ نوچنے یا کالے جانے کا سا احساس
خون آلود دست۔ خاکی۔ گھاس کے رنگ کے یا زردی یا بل سبز۔ آفوں کی گٹھلیاں سی ملی ہوئی۔ گلا پر موبے
کلیف۔ گلا اور چھاتی رکی ہوئی۔ ذرا سی حرکت سے۔ چھیش۔ پیشاب کے لئے زور لگائے۔ خون کے
رنگ کا سرخ پیشاب۔ پتے دانی میں کالے جالے کا سادرد دایاں سے دایاں کو جائے، اخراج خون خون
کے ہر اخراج کے ساتھ لمبا سانس لینے کی کوشش۔ آواز کی سنوں میں تناؤ۔ اینٹھن۔ سانس لینے کے لئے
کوشش کے۔ مدہ متلی کا دورہ۔ دم گھوٹنے والی یا نہ کھنے والی کھانسی کا دورہ۔ ہر سانس

کے ساتھ کھانسی آئے۔ اکڑاؤ ہو جائے۔ سرخ یا نیلا پڑ جائے۔ آخر میں گٹاؤک جائے یا تھکے ہو جائے۔ کھلی ہو اس جاتے سے گرمی اور آرام سے۔ چھالی میں ڈھیلے۔ (کچے) بلغم کی غرغراہٹ جو خارج نہ ہو بروکوٹھنہ۔ گردے میں سے ران کی طرف درجہ جائے۔ بخوڑی بخوڑی تیر بعد سردی اور گرمی (ہیپس) ایک ہاتھ گرم دوسرا ٹھنڈا۔ دیر تک گرمی لگتی رہے۔ پیاس نہ ہو۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے سینے سے تریں۔ ہر مدارج پر متلی۔ نرمے یا پت کا بخار +

مقدار خوراک اور طاقت۔ ۳ سے ۲ تک۔
تذات اثر۔ ہنچے۔

ممد و معاون ادویات۔ آرسینک۔ کوپریم ہیٹ۔

ادویات متعلقہ۔ اینٹیم نارٹ۔ لایلیا۔

فادزہر۔ آرسینک۔ چائنا

مخالف ادویہ۔ چائنا۔ اوپیم۔

سبب انپ کا زہر LACHESIS

اشتداد مرض

سوئے کے بعد

صبح کے وقت

موسم گرمیاں میں موسم بہار میں

سورج سے

گرمی سے

کمرے میں

مشروبات سے

خالی نگانے سے

مشروبات سے

ذرا سا ہاتھ لگانے سے

دبانے سے

احساس سے کپڑوں سے۔ گردن پر کمر پر

دایپس۔ پرویم۔ گریفا۔ پینس۔

رشور سے

لیکیبس

امراض و تاثرات

جلدی۔ واسو موٹر

اعصاب۔ ہمدرد سمیتھنک

نیو موگیٹرک

خون۔ پیپٹرے اور حلق کی نالی سے

دل

دورہ

پیلے یا پس طرف

پھر دائیں طرف

خصیات الرحم

امراض زنانہ

سر کی چندیا

رکے ہوئے اخراج } ایام حیض کے شروع میں
 آخر میں
 شراب پینے کے تیز نشے سے
 انحطاط مرض

کھلی سوا میں
 رطوبات کے کھل کر خارج ہو جانے سے
 سخت دہانے سے

متاثر حصے کو دھوئے سے

ٹھنڈی چیزیں پینے سے

علامات۔ مرض کا تیز حملہ سختی۔ مردنی شدت سبائیں جانب کی تکالیف۔ یاہیں سے
 دائیں طرف جانے والی تکالیف۔ زرد پڑ جانا ہے۔ گرمی کی قنما ہٹ۔ خون کا چڑھاؤ۔
 گولا سا۔ حلق میں جگہیں۔ پیش میں مقعد میں۔ مثانی میں ہوا محسوس دے۔ حلق میں سخت درد۔ حلق
 رکھا ہوا۔ حلق میں زخم مقعد میں ٹنگی۔ تباؤ جڑے میں مقعد میں۔ کپکپی زبان پر ہاتھیں۔ ذیابیس۔ کلا کھل پھوٹے
 یا پچی دھپاکی، کے اثرات۔ نیلا پن ساقوں کا۔ جلن پیدا کرنے والے اخراج۔ دست وغیرہ۔ اخراج خون پتلا
 سیاہ۔ ذرے ملا ہوا تکیس۔ خون آلود پیشاب۔ اوپر چڑھتے ہوئے احساسات۔ گلے میں آنکھوں سے
 چوٹی کی طرف گردن سے اوپر کو۔ نلوں سے دل کو۔ سردی۔ سخت درد۔ دھک دھک دھکم دھماکا۔ مرگی اعصابی
 گھبراہٹ۔ بیکواس۔ بے تعلق۔ غم آلود۔ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا۔ دم میں پھنسنے رہنا۔ یہ اصرار۔ غلط
 دے بنیاد خیالات۔ بیداری پر آداسی۔ حسد۔ مشبہ۔ زہر آلود احساس۔ سستی۔ سر جکڑنا۔ داییں
 طرف پھرنے سے۔ سر میں سخت درد۔ پھٹنا جائے۔ ناک تک اثر ہو۔ دائیں طرف کٹی جائے۔ کان تک جائے۔
 آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ نکام رکھا ہو۔ کھانسنے کے ساتھ رطوبت خارج ہو۔ خون بھی آئے۔ ذایقہ مرج کی مانند چرپا
 رہے۔ حلق میں سخت درد ہو۔ کان تک جائے۔ کڑے کا کالر کھلا رکھنے کی خواہش ہو۔ حلق میں گرم گرم
 گولا سا معلوم دے۔ نکلنے میں تکلیف ہو۔ غلطی ہو۔ ناک میں سے آجائے۔ دوران حمل میں قبض رہے۔ بواسیر
 ہو۔ بے کھانسی سے۔ ہانپنے میں درد۔ کپڑا آٹا رہنے کے لئے پتھراری (ایگر کس ایڈم) چہرہ سرخ گرمی میں
 دھندلا سا۔ چہرے میں درد منہ میں چھالے۔ گاڑھا گاڑھا ٹھوک بہت خارج ہو۔ زبان دانتوں سے کٹ جائے
 بولنے میں بہت غلطیاں ہوں۔ منہ یا ناک کے سامنے کچھ بھی برداشت نہ ہو۔ سیاہ رنگ کا خون حیض ہواؤ

کم مقدار میں اخراج ہو۔ سونے کے لئے لیٹنے سے دم گھٹے۔ لیٹے لیٹے سانس لے۔ گویا کہ ہوا کا بھوکا ہے۔ گلے میں گھر گھر اہٹ والی اور دم گھٹنے والی کھانسی لے گرمی سہلانے سے اور تھوک خارج ہونے سے۔ دل کمزور ہو۔ گویا الٹ گیا ہے۔ یا بڑھ گیا ہے۔ جلد سرخ پھٹی ہوئی۔ سیاہ دھبوں والی۔ گھٹنے ٹھنڈے ہوں۔ پیروں میں ٹھنڈا پسینہ آئے۔ خوفناک خواب دکھائی دیں۔ سانپ وغیرہ نظر آئیں۔ گرمی چند یا پر پسینہ لگے۔ پر سوتے ہوئے۔ سرخ بیباہ۔ اس کی بدبو والا۔ پیاس ہو۔ پانی پینے سے ڈرے۔ ایسی گیسٹریک میں در دیا تشیج مقعد سے ناف کی طرف در دیا جائے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۸ سے ۱۰ تک
مدت اثر تین ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ آرسنیکم کلیریا کارب۔ تار بوئج۔ ہیرپرف۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفور۔
زہکم آیوڈائیڈ۔

ادویات متعلقہ۔ کاشکم۔ سیپیا۔ زہکم۔

فاو اثر۔ آرسنیکم۔ مرکبوس۔ گرمی۔ الکول۔ سالٹ

مخالف ادویہ۔ امونیا کارب۔ ڈلکامارا۔ نائٹرک ایسڈ۔ سیپیا۔

LYCOPODIUM

لائیکوپوڈیم

امراض و تاثرات

اعضائے انضمام

پرورش } جگر
جلد }

اعضائے پیشاب

وائیں سے بائیں جانب } گلا
چھاتی

جائے والی تکالیف } خضیات الرم (دستے)

دماغ

پھیپھڑے

اشتداد مرض

کپڑوں کے دباؤ سے

گرمی سے } جانے پر
آندھ میں }

کھانے سے۔ شکم پری کی حد تک۔ کستور یا پھلی

یا صدف۔ بد ہضمی سے۔

۴ بجے شام سے ۸ بجے رات تک

اخطاط مرض

گرم مشروبات سے

کھانے وغیرہ سے

نامکمل پستان میں درد۔ زخمی سے محسوس ہوں۔ کانٹھ (دائیں)، پھوٹا (دائیں)، سکیپولا میں بلیلا سا گردن سخت
 ناتھ بے جس۔ ناقصوں پیروں میں تشنج۔ سوتے ہوئے انگلیوں میں۔ انگلیوں پر چپ والے پستان۔ درد سے ٹانگوں
 کے اوپر چھٹا لگے۔ گھٹیا پاؤں کے نیچے کوئی چھڑا گیا۔ پھر سو جائے۔ دائیں اٹری میں۔ پیروں میں جلن والا
 پستان۔ خشکی ہتھیلیوں میں۔ نلوں میں۔ جلد میں۔ رطوبت توں میں۔ پستان کی گھنٹی پر۔ منقحہ میں پھوٹے
 ہوئے پھوٹے۔ آرام ہوتے ہوئے پھوٹے۔ چھپکا یا پٹی۔ چھالے دار سوزش۔ ناقص ہوا پھوٹا۔ حقیقت
 سے پہلے رگ ٹوٹ جانا۔ نبض تیز۔ کھانے کے وقت۔ شام کو۔ سردی۔ نم جیسی۔ سر میں جلن میں۔ سردی سے
 ایک پیر میں کھانسی سے۔ لرزہ۔ بعد میں تھ۔ پہلی نیند کے بعد۔ جلن سکیپولا میں۔ پیروں میں پستان۔
 پیاز کی سی بو ملا۔

مقدار خوراک و طاقت۔ ۴ سے ۷ تک۔

مدت اثر۔ پانچ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ کلکیر یا کارب۔ ایوڈین۔ کالی کارب۔ لیکیس۔ پاشٹلا۔ فاسفورس
 ادویات متعلقہ۔ کاربوونج۔ سلیشیا
 فادرہر۔ کیمفر۔ کاسٹم۔ پاشٹلا۔
 مخالف ادویہ۔ نکس۔ موسک۔

پارہ MERCURIUS

امشداد مرض

رات کو۔ رات کی ہوا سے

پینے سے

دائیں کروٹ لیٹنے سے

گرمی سے اگر آگ سے یا ہست کی گرمی سے

ہوا کے جھونکے۔ خصوصاً سر کو

احساس سے

سردی لگ جاتے سے

سردی اور گرمی سے

مرکوریس

امراض و تاثرات

خون

بغیر ابدار جھتی

بغل

محالوں کے اندر کل طرف

(Buccal)

سیلوری یعنی تھوک پیدا کرنے والا غدود

حلق کے غدود کو تسلیت دینے والے کے غدود

لیمفٹکس رطوبت پیدا کرنے والے غدود

جگر۔ گردے۔

میوٹکس۔ لعاب پیدا کرنے والے غدود

اعضا کے متناسل

مسام دار بیش

جوڑ

ہڈیاں

جلد

پیر تر ہونے سے۔ آگ روشن ہونے سے

اختطاط تکلیف

مقتدل آب و ہوا میں

علامات بہت سی علامات مختلف قسم کی ہوں۔ غیر یقینی علامات۔ کپکپی۔ کمزوری۔ پسینہ۔ سوزش۔ سرخی۔ نیلگون انجماد۔ مسلسل اخراج۔ نمی۔ آواز اناہ اخراج۔ پتلا۔ لیسدار۔ جلن۔ پیداکرنے والا۔ تلخ۔ غلیظ یا گاڑھا۔ سبزی مائل زرد۔ پیکا۔ خون آلود۔ زخم لعا یا بھلی کا۔ نزلہ۔ غدد کی سرگرمی متلی۔ ایک ہی جگہ تکلیف۔ آتشک۔ ہر ایک چیز بہت چھوٹی معلوم ہو۔ خنازیر۔ عجلت پسندی۔ کچھ بہت زبردست رجحان و قتل عمد کا، آہرہ خطرے کا احساس۔ فراموشی۔ سر کے گرد ایک ٹی سی کا احساس۔ درد رنج ہو۔ زبان میں لکنت ہو۔ سردی کے ساتھ دھنوں میں بھی درد ہو۔ جس کی ٹیس کان تک جاتی ہو۔ آنکھیں کھچی جاتی ہوں۔ روشنی سے ڈر گئے۔ دلپ کی روشنی میں دھنوں میں گرمی پہنچنے سے ستانی کم دے۔ سردی اور چڑھتی معلوم ہو۔ یا آنکھ پر۔ دکام۔ جلن دار۔ پیپ جیسا اخراج ہو۔ موسم خزاں میں۔ ناک بھاری۔ سرخ۔ ترہ گندے تھکے۔ چہرہ زرد ہو۔ اسے بھرا ہوا آنکھوں کے نیچے۔ جلن میں۔ رخساروں پر سوزش ہو۔ جڑے میں درد۔ مسوڑوں سے خون جاتا ہو۔ ہونٹ پھٹے ہوں۔ دانت ڈھیلا۔ کھوکھلا۔ سیاہ۔ درد کرتا ہوا۔ دگر می یا سردی سے درات کو۔ تھوک بہت بے سوسے ہوئے۔ زرد رنگ کا۔ خون آلود۔ عضو تناسل میں سوزش ہو یا اگلی کھال میں۔ خون آئے۔ سوزاک ہو۔ ابتدائے حیض میں ہیں بہوش ہو جائے پیشاب سے گاڑھی سفید رطوبت خارج ہوتی ہو۔ کھانسی ہو۔ دودھ دفعہ۔ خشک۔ رات کو سبزی مائل زرد بلغم۔ دن میں۔ دائیں چھاتی کے نیچے تکلیف ہو۔ پستان۔ درد دائیں کے نیچے۔ کمر میں ٹیس اٹھے۔ حیض کی بجائے پستان میں دودھ۔ دودھ خراب ہو۔ جاگ پڑے۔ دل کانپ کر عضو کا نہیں۔ انگلیاں بے حس ہوں گردن سخت ہو۔ پیروں میں صبح کے وقت ٹھنڈا پسینہ آئے۔ ایڑیاں ٹھنڈی رہیں۔ جلد زرد ہو۔ نرم ہو۔ درد کمرے۔ مرطوب ہو۔ کھرنڈ دار پھیاں ہوں۔ زخم ہوں۔ بے قاعدہ۔ کم گرمی۔ خون آلود۔ گوشت کٹا ہوا۔ حرام گوشت۔ سیرقان۔ خسرو۔ رات کو ہڈیوں میں درد۔ گرم یا سطح کے نیچے۔ غلبہ حرارت۔ سراور چھاتی پر۔ بے چینی۔ ذرا سی محنت سے۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ یا گرمی چڑھ جائے۔ باری باری سے سردی اور گرمی لگے۔ سردی ٹھکی ہوئی معلوم دے۔ نزلہ اور بخار۔ اخراج دب جائے سے۔ بہ آسانی ویکار

پسینہ مگر آرام نہ دے۔ درد ہو۔ چکنا چکنا۔ گندا۔ خارش۔ پکے زرد رنگ کے دھبے ڈالنے والا سر پھاتی
 پردات کے وقت۔ مونی میں چھلے۔ دھاتوں کا سا ذائقہ۔ جوڑی پھولی ہوئی۔ ٹھارے دار زبان تالو
 میں کھلج۔ بڑھے ہوئے ٹونسلز۔ حلق میں خراش۔ جگر میں درد۔ قبض۔ پاخانہ تکلیف سے کم خون آلود
 سبز جھاگ دار سفید راکھ جیسا۔ جلن سے مرڈ سے یا سردی سے پیشاب بہت آئے۔ پانی کم پئے
 بار بار تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے۔ جلن ہو۔

مقدار خوراک ۲ سے ۳ تک۔

مدت اثر۔ دو ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ آرمیٹ۔ بیڈیاگا۔ سیلاڈونا۔ میپ سلف۔ سیپیا۔ سلفر

ادویات متعلقہ۔ کالی آیوڈائیڈ

قادر اثر۔ نائٹک ایسڈ۔ کاربوویج۔ آرمیٹ۔ میپ سلف۔ سلفر تھیو جا

مخالف ادویہ۔ لیکسیس۔ سیلیٹیا۔

نمک طعام

NATRUM MUR

نیٹریم میور

استعداد مرض

امراض و تاثرات

۹ بجے سے ۱۱ بجے صبح تک
 وقت طلوع آفتاب کے ساتھ
 معین پر ایام حیض کے بعد
 لائیدن چھوڑ کر دو سون دیکھ چاٹا
 سورج کی گرمی سے
 گرمی سے موسم گرمیوں
 مرطوب ہوا سے
 فاعلی کام کرنے سے
 محنت سے
 محنت سے
 جذبات کی تندگی سے

نظام انضام
 دماغ
 پرورش خون
 عضلات
 من
 دل
 جھلی (میکس)
 غدود
 جگر
 جلد

ہمدردی سے۔

ایام شباب میں

کوئین کے استعمال سے

مزمن موسمی بخاریا لیریا پرانے سے

چاندی کے کھار (Silver Salts) سے

اخطاط مرض ۷

کھلی ہوا سے

ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے

پسینہ آجانے سے

آرام کرنے سے

صبح کا کھانا کھانے سے پہلے

گہرا سانس لینے سے

علامات۔ مریض دبا پتلا ہو۔ پیاس زیادہ ہو غذا کی کمی ہے۔ سوکھا۔ اوپر سے نیچے کو دل گردن
یا پیٹ۔ خون کی کمی خشکی جلد پر اور رُمنہ میں جلق میں۔ عقدیں۔ خستہ الرحم میں۔ انگلیوں میں کیپسی جلدی
سے ٹھک کر گرجائے۔ جلدی سردی لگ جائے۔ اعصابی (Brethism) خسران گھاڑا۔
سفید شفاف۔ چرم اٹھ والا۔ ٹھیک وقت پر۔ ناقابل تشفی۔ جلدی غصہ آئے۔ تسلی یعنی دینے
سے۔ ٹمگیں۔ علیحدگی پسند۔ صحت ناپسند کرے۔ مرق۔ خوب روئے۔ زور زور سے اظہارِ بیخ حرکت
خیالات پر اگندہ ہیں۔ ایک بات کا بہت خیال ہے۔ نیند نہ آئے۔ انتقام کی خواہش پیدا ہو فکرِ خوف
ڈاکوؤں کے خواب۔ سر جھکائے۔ گویا گرا جا رہا ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر۔ سرد درد۔ گویا کہ تھوڑے پر رہے
ہیں۔ بھاری ہو۔ سر جھوٹا جا رہا ہو۔ دیوانہ کن۔ آنکھوں کے اوپر یا چند پا پر۔ جاگنے پر۔ قدرے جیتی
یا نظر میں خرابی۔ پڑھنے سے۔ حرکت سے۔ خواہ آنکھوں کی حرکت کیوں نہ ہو۔ لے آنکھ دبانے سے۔
بال جھڑتے ہوں۔ آنکھیں پاس کو کھینچی جاتی ہوں۔ جدھر درد ہو ادھر کی آنکھ سے آنسو بہیں۔ سوجھنا
چھینک لینے پر۔ کھانسنے پر۔ پٹنے سے آنکھیں بند ہو جائیں۔ بینائی دھندلی۔ چیز حرکت کرتی دکھائی دے۔
الفاظ مل جائیں۔ چیز ادھی دکھائی دے۔ پھر سر میں درد ہونے لگے۔ ناک رکی ہوئی۔ طے الصبح
چھینکس آئیں۔ کپٹی۔ ناک بے۔ کبھی خشک زکام ہو۔ ناک میں چھوٹے چھوٹے زخم پڑ جائیں۔ چہرہ غدد

کچھ کے رنگ کا چکنا۔ ہونٹوں کے گرد چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ پیالوں کی جڑیں موتی کے
 دانوں جیسی۔ پچلی جڑے میں پھرک دکھانے سے سردی اور گرمی۔ کھنگارنے سے بڑی بلغم نکلتے۔
 تلخ ذائقہ والی۔ زبان میلی۔ کنارے پر موتی جیسے۔ یا لکیریں سی۔ ذائقہ اور خوشبو نہ معلوم
 دے۔ اوولوا یعنی کو ایک طرف کو لٹکا ہوا۔ گلا ایک جگہ خشک ہو۔ یا زخم ہو۔ وہاں سے دھسک سی
 اٹھے اور کھانسی ہو۔ پیاس۔ بہت پانی پیئے۔ بھوک بہت لگے۔ مگر پھر بھی سوکھتا ہی جائے۔
 بھوک نہ لگے۔ تنک کی خواہش ہو۔ روٹی اچھی نہ لگے۔ جلتی جلتی دکھائیں آئیں۔ کھانے کے
 بعد منہ میں پانی بھر بھر کر آئے۔ ایسی گیسٹرم میں ٹروپ معدے کے متعلق تھکرات (Anxiety)
 پیٹ تننا ہوا۔ چڈھے (Prostate) خشک سخت۔ بکڑے بکڑے ہو کر کہنوالا پاخانہ۔
 مقد میں جلن۔ چمکدار آنکھوں میں لپٹا ہوا۔ تیسرے دن آئے۔ پرانے دست۔ پیشاب میں سرخ
 ذرات۔ مباشرت پر درد۔ ناگوار۔ بعد میں کمر میں درد۔ ٹانگوں میں کمزوری۔ طبیعت گرمی گرمی جائے۔ وبا
 ہو اسوزاک کمزور کرنے والا سیلان الرحم بجائے ماہواری کے۔ کھانسی۔ ایسی گیسٹرم سے جھک
 اٹھ کر دمبیا دھڑکن کے ساتھ۔ سردی سے سانس لینے کی نالی میں تزلزل۔ پسینہ دب جانے سے
 دل کی دھڑکن سارے جسم کو ہلا دے۔ باری باری سر میں اور دل میں دھڑکن ہو۔ پھر پھڑکے کمزوری
 دجوش سے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے۔ یا حرکت سے۔ گردن کے عضلات میں درد۔ کمر میں درد۔ علی الصبح
 د کھانسی سے بے چت لیٹنے سے۔ دباؤ سے۔ انگلیوں کی نوکیں پھٹی ہوئیں۔ کھٹنے پکڑے سے جائیں
 بیندیں سسکیاں بھڑنا۔ بیداری پر کمزوری کا احساس۔ جلد چکنی۔ خشک۔ سخت۔ میلی۔ غیر
 تندرست۔ زرد پھٹی ہوئی۔ بریشک (Herpetio) پھنسیاں دلچک سے ٹھنڈے ہاتھوں
 میں پیروں میں۔ دل میں۔ صبح کے وقت پیاس کے ساتھ۔ پسینے ٹھنڈے۔ کم۔ بالوں کے سرے
 پر۔ ناک پر۔ چہرے پر۔ کھانا کھاتے ہوئے۔ (کیمومیل)

مقدار خوراک و طاقت زیر استعمال ۱۲ سے ۳۰ تک یا اوس سے بھی اونچی طاقت کی

مدت اثر۔ چار ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ ایپس۔ آر بیٹم ناٹرکیم۔ انیشیا۔ سیپیا

ادویات متعلقہ۔ پاشلا۔

فادر ہر۔ آر سنیکم۔ فاسفورس۔ ڈلکامارا۔

شورے کا تیزاب

NITRIC ACID

نائٹریک ایسڈ

امراض و تاثرات

ذرائع
اخراج
کے کنار

کلا

مقعد

مونہ

جگر

خود

تھوک پیدا کرنے والے غدود (سلسلہ)

خون

جلد

ہڈیاں

تلی دار اعضاء (Tubular Organs)

استعداد مرض

چھوٹے سے دھماکے سے
ذرا سے گھاڑی کے پیوں کی آواز سے
(شور سے)

حرکت سے - پارے کے ہتھال سے
کھنڈ سے - کھنڈی ہوا سے
رات کو بیداری سے

تبدیلی موسم سے

صدمہ سے

دماغی محنت سے

اخطا ط مرض

سبک حرکت سے

معتدل موسم سے

مستقل دباؤ سے

گھاڑی میں سفر کرنے سے

علامات سب اکل مردہ محسوس کرے کیپکی آئے تیز جس ہو زخمی پھانس سی لگی ہوئی ناسوں
جیسی کھرجن یا جان - اخراج چرم ہارٹ کرنے والے - رقیق اور گندے - سرخی پیدا کرنے یا
بال اڑنے والے - پیس (ناک کی ایک بیماری جس میں بو نہیں آتی) پیروں میں یا رات کو گندے پیسے
اخراج خون بہ آسانی - چمکدایا خون آلود پانی سا - سرخ - سوزش یا پھٹے ہوئے کنارے -
سخت ہڈیوں کے ریزے سے - سیاہ چمکی لعاب دار جھلی - چاروں طرف بند سا بندھا ہوا یا
بوجھ سا لگتا ہوا معلوم دے - وہ کھن یا سختی - دردوں میں - جوڑوں کا چٹخنا - گندمی رنگ
کے مریض - حقارت و نفرت آمیز عادات - الحاد پسند - غصہ میں کانپنے لگے - جھگڑا - ہوسامی -
روحوں سے بات چیت کرتا ہوا معلوم دے - غیر زبانوں میں بات چیت کرے - گھبراہٹ ظاہر کرے

ہاتھ بھول جائے۔ سر میں کچلے جانے جیسا معدلہ لڑپنی کے دباؤ سے۔ کھوپری میں زخم چند یا میں مول کے جھونکے
 کا سا احساس۔ آنکھوں پر گرم گرم تپنے کا سا احساس۔ بہرہ پن دشور سے۔ ناک سرخ۔ نوک پر خفاک
 سی لگی رہنا۔ ہمتی ہوئی سخت تکلیف۔ ہڈی گل جانا۔ زکام سانس چھوٹا آنا چہرہ زرد رنگ ہو گیا بیماری
 میں مبتلا رہتا ہے۔ ہونٹوں پر سے چھلکے آتے ہیں۔ پھٹے ہوئے۔ پٹنے ہوئے۔ گھائیوں میں کھلی۔ دانت
 ڈھیلے ہوں۔ مسوڑھے پھولے ہوئے زخمی۔ اندر خون بہتا ہوا۔ تپتی ہوئی۔ میلی زبان۔ دقلورک ایسڈ سوداٹم
 رال بہت ہے۔ تالوں زخم۔ گویا خلق میں کچھ اٹکا ہوا ہے۔ چربی جلی چیزوں کی خواہش۔ پاخانہ نرم ہونے پر
 بھی مقعد کو چیرتا ہوا خارج ہو۔ دیر تک تکلیف جاری رہے۔ پواسیم پرنیکلیف۔ پیشاب گھوٹے
 جیسا سخت بدبودار ہو۔ ٹھنڈا کبھی کم کبھی زیادہ۔ گردے سے مثانے کی طرف تشنج۔ پیشاب کی نالی میں
 گویا کسی نے گرم تار چلا دیا۔ گردے میں دباؤ اثر۔ اگلی کھال میں خارش۔ جلن۔ زخم کی نلی سے خون آلود پانی
 کا اخراج۔ کمزور بے قاعدہ جھٹ۔ چھاتی توڑنے والی کھانسی۔ تالو سے اٹھے۔ کمر تک درد کرے۔ ٹھنڈ
 سے بلیغم لیسدار پیپ جیسی۔ چھاتی پر گرمی۔ دھڑکن۔ خوف۔ انگلیوں کی گانٹھوں پر سوزش۔ منے۔ ہاتھوں
 کی مٹھی پر۔ گتے کمزور۔ جلد خشک ہو۔ پٹھی ہوئی۔ ہر ایک گھائی میں بوائی۔ پنڈلی کی ہڈی پر تانبے کے رنگ کے
 دھبے۔ کپڑے اتارنے کے بعد خارش۔ ناسوری زخم تیز۔ کھردراؤ دار گوشت والا۔ یا پیپ کی کیل دار
 دیر میں بھرنے والا گلاؤ۔ کھودنے والی پیپ۔ بھگندہ۔ ناسور۔ آتشک۔ ٹوٹی ہوئی بوائیاں۔ ہڈیوں میں درد
 یا زخم۔ تپ دوق میں بغض ہر چوتھی تڑپ پر گرتی ہو۔ دندلے دار یا نرم سے دسٹھی سیگیا۔ تھیو جا۔
 اور (Condylomata) - سخی جیسی سردی تلوؤں میں۔ پسینہ بہ آسانی۔ بعد ازل سردی
 لگ جائے۔ بہت کمزور کرنے والا۔ اور پسینہ لانیو لاشیاب صبح کے وقت۔ بغلوں میں پیسوں میں۔

مقدار خود پاک و طاقت زیر استعمال ۶۰ درجے کی یا زیادہ

مدت اثر۔ چار ہفتے

ممد و معاون ادویات۔ آرسنیکم۔ آرم ٹرافولیم۔ کیلے ڈیم۔ کلکیریا کارب۔ لائکو پوڈیم۔ تھیو جا

ادویات متعلقہ۔ آرسنیکم۔ کالی کارب۔ کریوزوٹم۔ مرکریس۔

فاد اثر

مخالف ادویہ۔ لیکیس۔

NUX VOMICA

نکس و امیکا

امراض و تاثرات

دماغ اور ریڑھ کی ہڈی

(Cerebro Spinal Axis)

اعصاب

اعضائے انضمام جگر
معدہ
آنتیں

اعضائے تنفس

گندمی رنگ والے مرد

اشتداد مرض

علی الصبلخ

کھلی سواہیں دھشک
سردی سے
سہو کے جھونکے سے بے ہوشی سےآندھی سے
کیڑا اور تر جانے سےقنوه پینے سے
مٹھائیاں کھانے سےامیرانہ زندگی سے
شراب پینے سے
عیشانی و باغی کے کثرت زلف سے

بکرت پھل لینے سے

نشست کمینہ عادات سے
بیمار خوری سےمحنت سے
تنگ آجانے سے
دماغی

پیند خراب ہوتے رہنے سے

خفگی سے
شور سے
نہایت معمولی معمولی بدبو سے
روشنی سےوجوہات سے
چھو جانے سےدباؤ پڑنے سے
کیڑوں کے دکر پہ

افادہ مرض

بکثرت اخراج سے

آنکھ لگ جانے سے
دکالی یا نیکارب

سر لپٹنے سے۔ آرام کرنے سے
گرم شروبات۔ دودھ سے مرطوب ہوئے
علامات تیز و تشدد آمیز حرکات۔ اکثر درے سے آگے بیانا قابل کردیں۔ اینٹھن ہو۔
جھٹکے سے گئیں۔ برتنی چپک کی طرح اٹھنے والے درد۔ اعصابی درد نیوریلجیا، خراش کی سی تکلیف
پیٹ میں۔ خلش میں وغیرہ۔ اندرونی کھجلی۔ گلے میں۔ حلقوم میں وغیرہ۔ سردی لگ جائے
مثلی ہو۔ چالاک۔ غصہ و راو ربے صیر۔ درد برداشت نہ کر سکے۔ دیوانہ سا ہو جائے۔ چلائے
بہت سرگرم ہو۔ جلدی گھبرا جائے والا اور جوش میں آجائے والا۔ اونگھنا۔ انتقام پسند۔ جلد
ناراض ہو جانا۔ وہمی۔ اداس۔ افلاس کا خوف۔ تشدد پسند۔ خود کشی پر آمادہ۔ جذبات کا غلام۔ سر
چکنا۔ خالی پیٹ۔ چند یا پر تیز جس۔ پیشانی پر پیشوز۔ آنکھوں سے پانی بہنا۔ تکلیف والی طرف۔
سرخ آنکھیں۔ متھنے زخمی سناک رکی ہوئی مگر پانی نہیں۔ ایک طرف چھینکیں۔ بہت تیز۔ اچھی طرح نہ
آئے (بائیں) نتھنے میں چوٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوں۔ کراہم دلی میں کھلی ہو میں سے۔ رات کو
خشک۔ قوت شامہ (سو نہ سکی) تیز ہو۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہو۔ زردی نائل۔ بائیں طرف کا منہ
لٹکا ہوا۔ جڑا بند ہو جائے۔ سخت ہو جائے۔ دانت کٹکٹائے۔ ذالقیہ تلخ۔ ترش صبح کے وقت
خراب تالو میں کھجلی۔ حلق میں کھجلی۔ کھرجن۔ سچکی بہت تیز مثلی والی۔ کھانسنے اور بلغم نکلنے کی کوشش
سے۔ ڈکاریں ترش۔ دل جلانے والی۔ مومنہ میں پانی بھر بھر آئے۔ جی تھلائے۔ صرف تھے کر لے
سے بہت تیز تھے پتہ آلود کڑوی ترش۔ خوراک معدے میں بھاری بوجھ کی طرح چڑی ہے
صفراوی درد۔ کمر میں چھاتی میں کٹے کرنے سے۔ گویا کمر میں بیٹی سی بندھی ہے۔ کپڑوں سے
بدبھنی۔ جگر چھوٹنے سے درد۔ بڑھا ہوا۔ پتھری کی وجہ سے درد تو بچ۔ آسترلیوں میں جو کھن
دکھانے سے یا قدم قدم چلنے سے۔ بچوں کے نوٹے بڑھ جانے۔ پیٹ پھول کر درد تو بچ
ہونا۔ بیقراری۔ ٹھیر ٹھیر کر۔ پاخانہ پھرنے کی بے سود کوشش۔ پاخانہ آجانے سے آرام
پاخانے کے لئے بہت زور لگانا پڑے۔ متعذ میں گوز آتا آتا کہ جاسے۔ محسوس ہو۔ گویا پاخانہ
آگیا۔ مروٹہ۔ دائمی قبض۔ بوا سیر کھجلی۔ ٹھنڈے غسل سے۔ جلق۔ سرط۔ انزال جیض کثرت
یش از وقت۔ دیر تک یا زک ترک کر۔ سیاہ گھٹیلوں دار خون کا اخراج۔ تکلیف اور اینٹھن تمام
جسم میں پھیلی ہوئی۔ کھانسی بہت تیز اور تکلیف دہ۔ کھانسا کھانسا گر پڑے۔ کالی کھانسی گردن
میں سختی اور درد۔ دائیں کندھے کے نیچے درد۔ مکر کا درد۔ گویا کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ کمر وٹ لینے

کے لئے اٹھنا پڑے۔ نہایت تیز لمبیگو (درد کم)، ریڑھ کی ہڈی کی طرف چلنے والا پیر کی انگلیوں سے ران کی طرف آنے والا کے پافانہ آنے کے بعد پنڈلیوں اور تلوؤں میں سخت مروطیا پائنے فیل پا۔ پیر پٹھے ہوئے۔ یرقان۔ جمبھائیاں آنا۔ شام کو غنودگی کثرت خیالات کے باعث بے خوابی بہت جلد سویرے کو کھل جائے پھر نیند نہ آئے۔ اگر سو بھی جائے تو جاگنے پر طبیعت بہت افسردہ سی رہے۔ خوفناک خواب دیکھ کر بڑبڑانا۔ یہ آسانی سردی لگ جائے کپڑا نہ اتار سکے حرکت سے خواہ گرمی ہی کیوں نہ ہو ترش بودار پینے۔
مقدار خوراک و طاقت زیر استعمال۔ اسے۔ ۳۰ تک یا تاہد
مذرت اثر۔ ۲ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ براونیا۔ کیومیلا۔ کونیم۔ کالی کارب۔ فاسفورس۔ پیلٹا
سیپیا۔ سلفر
ادویہ متعلقہ۔ اگنیشیا۔ لائیگو پوڈیم
مخالف ادویہ۔ ایشک ایسڈ۔ کاسٹم۔ اگنیشیا۔ نکس موسک۔ زرنم

PHOSPHORUS

فاسفورس

امراض و تاثرات

اشتداد و مرض >	امراض و تاثرات
بائیں کروٹ	خلا
لیٹنے سے	پھیپھڑے
تکلیف دہ پہلو پر	دل
چٹ	خون
جذبات میں ہیجان	خون کی نالیاں
معمولی سی	شریانیں
بات چیت سے۔ چھوٹے سے	معدے کی
وجہ سے	انتڑیوں کی
کھٹکھٹ سے	عایدار جھیلیاں
ہاتھوں کو دھانی لگنے سے	پھیپھڑوں کی (پچھلے حصے)
کھلی ہوا میں۔	
گرم	

نک سے۔ شباب میں
اچانک تبدیلی سے
موسم }
اندھی۔ سردی سے
طوفان باراں

صبح و شام
دماغی تکان

انخطاط مرض

کھانے سے }
خوراک
سولنے سے }
پانی
سردی سے }
مُنہ کو
ماش سے (منفطایسی اثر سے)
بیٹھ جانے سے

دماغ

اعصاب }
(Cord)

اوپر کے بیڑے کی ہڈی
پندلی کی ہڈی
ریڑھ کی ہڈی }
ہڈیاں
جگر

علامات۔ روز افزون کمزوری۔ جس کا انجام کسی سخت یا نہایت تیز بیماری میں ہو۔ ڈانٹولا، بار بار ہونے والی نکالیف۔ سردی۔ کھانسی (کروپ)، اخراج خون، وغیرہ چمڑے والے۔ ناسور یا زخم سے خون بہہ نکلنا۔ سٹراؤ۔ دل یا پیپھیٹروں کے امراض کے اثرات۔ پلندہ بالا نشاندا زووجس۔ نازک تپ ذق کار حجان۔ کمزوری کے حملے۔ جوڑوں میں د مخت سے۔ خالی خالی ہونے کا احساس۔ چھاتی میں معدے میں۔ حواسات نہایت چیز حد سے زیادہ تھکان۔ تنناؤ چھاتی میں (بائیں) کھانسی وغیرہ میں۔ دھبے جن میں درد یا جن ہو۔ اندرونی فلج۔ گھلیں۔ متعبدیں۔ اندرونی خارش۔ دھسک۔ دھڑکن۔ کہیں کہیں بے حس۔ تبدیلی موسم کا تیز احساس۔ محبتی۔ لیکن جلد جوش میں آجائے۔ یا بہ آسانی ناراض ہو جائے۔ متفکر۔ تھائی میں۔ یا طوفان سے دمے۔ بمر میں چکر آئے۔ بہت سی علامات سمیت۔ بہتیا پھر نہیالا۔ جاگنے کے بعد۔ گھومتا ہوا۔ کے پاغانہ پھرنے کے بعد۔ سر بھاری رہے۔ ایک آنکھ کے اوپر درو کرے۔ بھوک لگے۔ بچوں کو دہیں کروٹ لیٹنے سے۔ کے سردی سے۔ کنپٹیاں جلتی ہوں۔ ماتھا ٹھنڈا ہو۔ چند یا میں تڑپن ہو۔ سر میں پھیپاس ہو۔ گنج کے نشان ہوں۔ آنکھوں سے پانی بے۔ اندھی میں لہسارت چمکار سے سرخ سبز میاہ۔ کے سائے میں تنگ نظری۔ کانوں میں گونج یا تھر تھر ہٹ۔ انسانی آواز کی طرف سے

بہرہ پن۔ کان میں درد۔ ناک پھر کنا۔ زکام ہے۔ رُکی ہو۔ سوزش ہو۔ زخم ہو۔ خلا ہو۔ نکسیر ہے
 نوجوان کو بعد میں نمونیا معہ کھانسی کے چھینکیں آئیں۔ بو سے سردی ناک سے پتھے کو اترتی
 ہوئی معلوم دے۔ سونگھنے کی طاقت کم ہو۔ ناک اور مونہ پر زردی۔ تبدیلی پذیر مریضوں کا
 ساچرہ۔ آنکھوں کے گرد گڑھے۔ نیلے حلقے۔ دانت بے جس۔ سوڑے زخمی۔ مرکزی دانتوں کے
 پیچھے۔ تالویں خارش۔ تلخ ذائقہ اور ڈکاریں۔ حلق میں روئی جیسی لگتی ہوئی معلوم دے۔ ٹھنڈے
 مشروبات پینے کی خواہش ہو جن سے تکلیف بڑھے۔ تھوڑی دیر میں تپ ہو جائیے۔ مونہ
 میں پانی بھر بھر آئے۔ بھوک خوب نیند ہو۔ رات کو دورے سے پہلے۔ ناک کی خواہش ہو۔ جب
 دیا جائے تو انکار کر دے۔ محسوس میں جلن۔ کھانے سے۔ کوڑی کے اوپر دباؤ۔ معدہ خالی
 کھوکھلی محسوس ہو۔ گویا نیچے کو نکال جا رہا ہے۔ جذبات۔ کپکپی۔ پھر پھر ہٹ یا گڑ گڑاہٹ
 آرام پڑنے کے لئے پیٹ کو ملے۔ پانچاں پکے ہوئے ساگودانہ کی مانند۔ دانت دار۔ کمزور۔ سخت۔
 دست آئینہ بھورا۔ نیلگون۔ پتلا۔ اخراج میں تکلیف نہ ہو۔ گھبراہٹ ہو۔ بے ارادہ خارج ہو جائے
 ہٹ کمزوری ہو جائے۔ متعہ کھلی ہوئی معلوم دے۔ کالچ نکل آئے۔ پیش ہو۔ پیشاب کر کے کمزوری
 محسوس کرے۔ ذرات آئیں۔ کبھی کبھی ایلیمین آئے۔ جماع کے لئے تیقاری۔ مگر نامردی جیض دیر
 تک جاری رہیں۔ جیض کی بجائے سیلان الرحم جلن دار۔ سانس کے لئے اضطراب۔ ذرا سی
 حرکت سے۔ دم گھٹا جائے۔ رُک رُک کر سانس آئے۔ کھانسی۔ حلقوم خارش۔ زخمی۔ روئیں دار
 بونے میں تکلیف۔ آواز۔ دھیمی۔ گلا پڑا ہوا۔ شام کو۔ کروب۔ برا نکائیش۔ کھانسی سخت۔
 جھر جھر کی سی آواز کرنے والی۔ خشک۔ پُر از تکلیف۔ دھسک اُٹھے۔ کھنکارنا پڑے۔ سخت کمزوری
 پیدا کرے۔ ہوا خارج ہو۔ ہو کی نالی میں جلن۔ کپکپی۔ تبدیلی موسم۔ اجنبیوں کے سامنے۔ جھننے
 یا گائے سے۔ بلغم آسانی سے خارج ہو۔ نمکین۔ زنگ آلود۔ جھاگدار۔ یا ٹھنڈا۔ نمونیا (دبائیں)
 پھیپھڑے کا پچلا حصہ۔ درجہ دوم مع غنودگی چھاتی بھری ہوئی۔ بھاری بھاری۔ چبک (دبائیں)
 جانب اوپر۔ گلے میں تکلیف یا دایں جانب۔ بازو میں۔ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف گڑ گڑاہٹ
 ٹھنڈے مشروبات سے۔ دل میں درد دایں جانب۔ بازو۔ ذرا سی بات پر ہٹ دم مگر نہ ہو۔ خنا زہر
 کے دوران میں۔ کمزور۔ چربی دار۔ بائیں جانب درد۔ پستان پر پھوڑا۔
 تشنج۔ جلن۔ ریڑھ کی ہڈی میں بیچنی۔ گرتی سے۔ بائیں کندھے سے آگے کو درد آئے۔ بائیں
 کندھے میں پھاڑنے کا سادرد۔ رات کے وقت۔ کمر کے ارد گرد جلن دار دھبے۔ ہاتھ کی انگلیاں

بے حس۔ اور پیر کی بھی بہتیلیوں میں۔ کوہوں میں اور پھر اوپر مکر میں فلج کی سی چپک ٹخنے ٹوٹے
 سے ہائیں پیروں میں پسینہ رک جائے۔ لڑکھڑاہٹ۔ یہ آسانی لڑکھ جائے پیر میں جیسے سرد
 پیروں کی انگلیوں میں اینٹھن۔ سرخ لہو جیسے دھبے۔ رقیق۔ بدبودار۔ خون آلود پیر کا اخراج۔
 پیٹ پر زرد دھبے۔ یرقان۔ حماقت کے بعد کھال میں جلن۔ بے خوابی۔ آنکھ بند نہ رہیں۔ اندر
 گرمی سے۔ دن میں غنودگی۔ نصف شب سے پہلے بے خوابی۔ آتشزدگی کے خواب۔ سر پھپھوڑ
 میں انجماد۔ سردی گھٹنوں میں۔ بستر میں۔ گرم کمرے میں سردی۔ کمر میں جلانے والی گرمی۔ کسی
 جگہ مقامی۔ کمر میں۔ تپ دق کی سی۔ پسینہ۔ علی الصبح چپ چپا۔ کچھ آرام نہ آئے۔ بچا بے تکلیف
 مقدار خوراک و طاقت زیر استعمال ۳۰ سے ۴۰ تک بہت کم طاقت کی لوہا نہ دینی چاہئے نہ دیر تک جاری
 رکھنی چاہئے۔ خصوصاً تپ دق کے مریضوں کو + مدت اثر ۵۔ ۷ ہفتے۔
 مدد و معاون ادویات۔ آرسنک۔ کلکیریا کارب۔ سیپا۔ کالی کارب۔ لائیکو پوڈیم۔
 سینگویریا۔ سیپیا۔ سلسفر

ادویہ متعلقہ۔ کاسٹم۔ کونیم۔ بلیشیا
 فاوڑسر۔ کوفیہ۔ نکس و امیکا
 مخالف ادویہ۔ کاسٹم۔

PHOSPHOBIO ACID

فاسفورک ایسڈ

اشتداد مرض د

رقیق طوٹنوں کے ضائع ہونے سے
 کثرت جملع سے
 کمزوری
 مکان سے
 بخار سے
 رنج سے۔ تنگ ہونے سے
 دماغی صدمے سے
 جذبات
 بھڑکنے سے
 ناکام محبت سے۔ گھر کی یاد سے
 موکے جھونکے سے۔ سوئی سے

امراض و تاثرات

من۔ اعصاب
 اعصاب قناسل
 اعصاب احساس (دینسوری)
 ریڑھ
 عضلات
 ہڈیاں

گاتے سے باتوں سے

انخطاط مرض

گرمی سے تھوڑی سی نیند سے

اجابت سے

علامات۔ کمزوری یا ناطاقتی۔ کثرت اخراج سے۔ دھیمپان۔ جس کروٹ لیٹا ہوا دم
ہی درد جائے خراش کی سی تکلیف۔ بڑھتے ہوئے سے درد (Formication) بالوں کی جڑوں
میں۔ ریڑھ کی ہڈی کے برابر۔ اعضا میں۔ جوڑو پھیلے محسوس ہوں۔ خاموش بے توجہ۔ لاپرواہ
کند ذہن۔ کابل۔ دست یا پسینوں کی رغبت۔ گرفت کمزور۔ خیالات جمع نہ کر سکے۔ الفاظ ڈھونڈنا
رہے۔ حافظہ کمزور۔ نا اُمیدی۔ بات کرنے کو جی نہ کرے۔ ہلکا سا سر سام۔ جلدی سے عقدہ جلتے
چند یا پر کچلنے والا بوجھ معلوم دے۔ بال جلدی سفید ہو جائیں۔ بال جھڑیں۔ بے چمک۔ گرٹھے
میں اتری ہوئی آنکھیں جن کے گرد نیلے حلقے ہوں۔ دباؤ سے باہر نکلی جائیں۔ زرد۔ بیمار سا
چہرہ۔ چسپا اندوں کی سفیدی جم کر خشک ہوئی سی معلوم دے۔ سوڑھوں میں سے خون ہے۔ زبان
جھاگدار۔ رسوں کی خواہش۔ معدے میں تڑپی۔ بہ افراط بے درد میلے سفید۔ پتلے یا لمبے
لمبے دست۔ کمزوری کم دودھ کے رنگ کا پیشاب بار بار آٹے۔ بستر خراب ہو جائے۔
سردی لگ جائے۔ چھاتی کو۔ ہادینے والی کھانسی۔ ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری۔ فالج دہہ کی سی۔
بازوؤں کا اگلا حصہ بھاری۔ رات کو ہڈیوں میں درد۔ گویا کوئی پھیل رہا ہے۔ افسردہ۔ جھریوں دار جلد۔
دن میں غنودگی۔ لیکن رات کو بیداری۔ سردی چہرے یا پیٹ کے ایک طرف۔ ریڑھ کی ہڈی کے برابر
جلن۔ کمر کے نیچے گردن کے حصے پر گرمی لگے۔ پسینہ آئے۔ بہت پسینہ۔ رات کو ہلکے بے
تکلیف بخار کے نتیجے کے طور پر +

مقدار خوراک و طاقت استعمال

مدت اثر۔ مہینے۔

مدد و معاون ادویات۔ چائنا

ادویہ متعلقہ۔ جیس۔



PODOPHYLUM

پودوفیلوم

امراض و تاثرات

جگر } دود و نیم
انتریاں }
مقعد

دائیں جانب } خصیتہ الرحم
شانہ (سکیپولا)
حلق

اشتداد مرض

علی الصبح کھانے سے
موسم گرما میں دانت نکالنے کے دنوں میں
پینے سے حرکت سے
پارے کے استعمال سے
انخطاط مرض
جگر کو آہستہ آہستہ پھسکی دینے سے
پیٹ کے بل لیٹنے سے

علامات - جی متلانا - جلنا گڑھنا - سر اور ہر اعضاء نا - آنکھیں نیم دار سانس خراب - زبان جلی
ہونی سی - کھردری - مسوڑھے کاٹے - دانت کٹکٹے - ذائقہ تلخ - منہ میں ہمیشہ کچھ بکھرا ہوا
سا معلوم دے - جگر میں درد - جلن - کمزور پیٹ خالی - ڈوبا سا جائے پیٹ میں درد کا
سا احساس - پیٹ منے سے آرام دے - انترلیوں میں گڑگڑاہٹ ہو کر بغیر تکلیف کے
پدرنگ اور بہت سا پاخانہ بڑے زور سے خارج ہو - موسم گرما کے دست بیفید دست
گندے پانی جیسے جھاگ دار کھانے سے ذرے نکلیں - کمزوری پیدا کریں - ہیضہ کبھی دست
کبھی کھلی اور تکلیف مثلاً سر درد وغیرہ - زرد - سخت - کھڑیا کے رنگ کا پاخانہ مقعد میں جلن - کھلاج کمزوری
پاخانے سے پہلے کالنج نکل آئے - بواسیر تیز - بدبودار - خصیتہ الرحم میں بے حسی آمیز درد - دائیں طرف
کو جائے - دانتاگون تک جائے - پاخانہ پھرتے ہوئے - اعضائے تناسل کے لئے خطرہ - یرقان -
چہرے اور آنکھوں میں سوتے ہوئے کراہنا اور گڑگڑانا -

مقدار خوراک و طاقت استعمال - ہر گز سے ۶ درجہ تک ۲۰ اور ۱۰۰ پھلوں کے دھنوں میں عطا مت مفید ہوتا ہے
مدت اثر -

ممد و معاون ادویات - کلکریا کارب - نیشتر مہمور - سلفر
ادویہ متعلقہ - ایلو - چائنا - مرکبوس +

PULASTILLA

پاسٹلار

علامات و تاثرات

من
دریدیں

زبان

معدہ

امتریاں

زنانہ اعضائے تناسل

اعضائے پیشاب

اعضائے تنفس

ایک طرف

دل (دایاں حصہ)

اشتداد مرض

گرمی ہو - کمرہ

گرمی ہو - کپڑے - بستر

پیرھنے سے

اخراج دب جانے سے

شام کو آرام سے

حرکت شروع کرنے سے

لیٹ جانے سے - ایک کروٹ دیاں

امیرانہ خوراک

بہت دیر بعد

کھانے سے کھی چربی وغیرہ - برون

اندھے

شباب - ایام حمل

حیض سے

فولاد کے استعمال سے - کونین کے استعمال سے

انخطاط مرض

کھنڈ سے - تازہ - گھلی ہوئیں

کپڑا اتار جانے سے

کھڑے ہونے سے

آہستہ آہستہ حرکت سے

خوب رو لینے سے

علامات - تبدیلی پذیر - ادلتی بدلتی علامات - ایک خاص حد تک بڑھ کر یکایک کم ہو جائیں اور پھر وہیں پہنچ جائیں - پیاس نہ ہو - سانس پورا پورا نہ آئے اور سردی لگے - ہانسنے

کی یا حیض کی خرابی۔ اخراج دب جانا۔ کان بھنا۔ حیض بسمیلان الرحم۔ دودھ وغیرہ وغیرہ۔ اخراج
 خون چرم اہٹ۔ خون کی کمی۔ اخراج بہ افراط۔ نرم۔ گاڑھا۔ زردی یا ہل سبز تلخ لعاب۔
 جھٹکے سے لگیں۔ ایسی تکلیف جیسے زخم کو چیرا پھاڑا جاتا ہو۔ بے جستی۔ مانگھ۔ پیر کی یا جس طرف لیٹے
 ہو۔ زرد رو۔ ٹھنڈی۔ گوری۔ نرم دل۔ جِلْم الطبع۔ پُر جذبات۔ جلد رونے والی بہت
 مار بیٹھنے والی۔ جلنے کر دھنے والی۔ جلد ناراض ہو جانے والی۔ ہمدردی کی خواہشمند۔ سر جھکا کر نہ
 لیٹ سکے۔ چند یا میں سرد درد شروع ہو۔ کنپٹیوں میں درد۔ دکھانی سے نالو پر بہت پسینہ آئے
 آنکھیں آنسوؤں سے پُر۔ یا ڈھکی ہوئی سی معلوم دیں۔ آندھی سے۔ پلکیں چکیں سردی کا اثر۔
 آنکھیں ڈکھیں۔ سوزاک کا اثر۔ انجھناری یا گوماری۔ اندھے پن کے محلے۔ حیض سے رات کو
 کان میں درد۔ برا اخراج۔ ناک کے سامنے بدبو۔ زکام۔ لیٹنے سے ناک ٹرک جائے۔ زرد چہرہ۔
 ہونٹ چلے۔ نیچے کا ہونٹ بیچ میں سے پھٹ جائے۔ سانس میں بدبو۔ دانت کا درد۔
 گویا کوئی دانت کھینچ رہا ہو۔ دے سردی سے۔ ذالیقہ خراب۔ صبح کے وقت خون آلود۔ چکنا چپ چپا
 مٹہ یا خشک بے پیاس۔ زبان جلی سی محسوس ہو۔ کھانے کے بعد ذالیقہ منہ میں قائم رہے۔ پانی یا
 چکناٹی ناپسند ہو۔ زرخشی کی خواہش جو موافق نہ آئے۔ یکایک نفرت ہو جائے۔ دکھانے سے چھاتی
 پر جلن۔ جی متلائے کوڑی میں کالے جانے کی سی تکلیف۔ نبض کی سی تڑپ۔ بھاری یا بگڑا ہوا
 معدہ۔ پیٹ۔ پتھر جیسا سخت۔ درد کرے۔ بے حس ہو۔ چوڑو میں درد۔ پاخانہ۔ تبدیل پذیر۔
 سبز آنوں۔ آدھی رات کے بعد بھراوی۔ بواسیر۔ لیٹنے سے۔ پیشاب غیر اراداً لیٹنے پر خارج
 ہو جائے۔ بعد میں لہو آئے۔ مثانے میں بھاری دباؤ سا۔ یا تشنج۔ رات کو پیشاب خطا ہو۔ جلن
 بائیں طرف نیچے کو۔ پروسیٹ ہٹے ہوئے۔ سوزاک۔ خون آلود اخراج۔ حیض سا محسوس ہو۔ حیض
 سیاہ۔ بدیر۔ شباب میں۔ کم۔ نہانے سے۔ بے قاعدہ۔ جلن والا۔ غائب۔ آیام حیض میں
 تکلیف۔ وضع حمل کے سے کم درد۔ بعد میں درد بسمیلان الرحم۔ دودھ جیسا۔ چرم اہٹ۔ ہوا کی
 بھوک سی محسوس ہو۔ داییں طرف لیٹنے سے۔ گویا پیٹ میں۔ اگر گرمی ہو۔ کھانسی صبح کو و صلی
 شام کو خشک۔ کوڑی میں دھسک اٹھ کر بیٹھنا پڑے۔ بلغم کاڑھی۔ جھاگدار میٹھی ٹیکس۔ چھاتی
 میں تکلیف گویا کہ بوجھ رکھا ہے۔ دھڑکن۔ پستان بکھاری کے دودھ۔ زخمی سی۔ درد کرنے والی
 گھٹلی۔ دائیں جانب۔ دودھ کم۔ جوڑوں میں سوزش۔ پیر کی پشت میں کٹنی بے حس ہو۔ نچلے اعضا
 میں۔ درد نیچے کو جائے۔ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ ناگیں بھاری ہوں۔ ناگوں میں سرد ہونے

ہیرول میں بدبودار پسینہ۔ غدود میں سوزش۔ درہیلی پے درد (Varicose) گرم ہونے پر جلد میں خارش۔ خسرہ۔ دن میں غنودگی۔ لیٹے ہوئے سر پر ہاتھ رکھے۔ میند اچلتی رہے۔ خواب آنے نہیں۔ صبح کو پریشان یا تھکا ہوا سیدھا ہو۔ سرد، لگے مگر گرمی سے نفرت ہو۔ گرم کمرے میں درو ہو۔ رات کو لیٹنے سے۔ ایک ہاتھ ٹھنڈا ہو۔ کچھ حصے پر پسینہ آئے + طاقت استعمال مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ تک۔

مدت اثر۔ ایک ہفتہ۔

ممد و معاون ادویات۔ آرسنک۔ براونیا۔ کالی بائیکارب۔ کالی سلف۔ لائیو کو پوڈیم سیسیا۔ سلفر۔ سیلیسیا۔ سیٹنم۔ سلفیورک ایسڈ۔ ترنگم۔
ادویہ متعلقہ۔ لاپس۔ سی سیوگا۔ گریفائٹس۔ میبامیلس۔ کالی بائیکارب۔ نیتروم سلف۔
مخالف ادویہ۔ نکس موسک۔

RHUS TOX

رہس ٹاکس

امراض یا تاثرات

جلد } اعضائے تناسل
چہرہ کھوپڑی
خون

سیلولر (Cellular)

(Ligaments)

(Fibrous)

لعابدار جھکیاں۔

(Pyræ)

(Parotid)

(Cord)

عرق النسا (Sciatic)

ریشہ جات

غدود

اعصاب

اشتداد مرض

مرطوب ٹھنڈی ہوا سے
نہاتے دہوتے ہوئے
کھل جانے سے
ٹھنڈا ہوا کا جھوکا لگ جائے
پسینوں میں کھل جانے

سے ہاتھ وغیرہ

حرکت شروع کرنے سے

آرام سے

موتج آنے سے بیت سخت سے

بعد نصف شب

اسخطا ط مرض

حرکت جاری رہنے سے

بائیں جانب یا بائیں سے دائیں کو جانوالی
تکالیف

گرمی سے لپٹنے سے غسل سے
اگر گرمی پہنچائی جائے۔

کھلنے سے۔ نکسیر سے

پیٹ پکڑنے سے

علامات۔ دبائی خارش جوٹس میں لائے والے تپ محرقہ سادی بافل لہج کے اثرات۔ رات
کو درد گولی کی طرح نکل جانے والا۔ چیک والا۔ یا پھٹانے والا۔ کسی حالت میں
بھی آرام نہ پاسکے۔ زخم یا خراش جیسی تکلیف۔ اگر او گوشت کشا ہوا یا ڈھیلا محسوس
ہو۔ اکڑا ہوا سا جان پڑے۔ عضلات میں تشنج۔ چیونٹیاں سی ریگیں۔ بے حس۔ کپکپی۔ جلن۔ سوزش
اور سرخی۔ اخراج چرملے والا۔ رنگ کے رنگ کا گوشت دھوئے ہوئے پانی جیسا یا
گداسا۔ جس سے پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں۔ تنفک۔ بیدل یا اشرہ۔ آہستہ آہستہ جواب دے
ہلکا ہلکا سرسام۔ سر گھومے۔ بعد ازاں سر میں درد ہو۔ دماغ پھٹا جائے۔ یا ڈھیلا محسوس دھماکے
سے۔ مانھا گویا کسی بورڈ سے دیا جا رہا ہے۔ گدی میں لگڑا اور درد دیا ہو لینے سے۔ آنکھوں کے پیچھے
درد۔ حرکت سے پردہ چشم سخت چپکنا ہوا خشک۔ مضبوطی سے بند ہو جائے۔ آنسو بکثرت گرم
رک رک ہیں۔ روشنی سے ڈر گئے۔ ناک کی نوک سرخ تیز سر۔ پانی بے نکسیر رات کو۔ ناک کی ہڈی میں
سخت درد۔ چہرے میں درد۔ بائیں رخسار پر سرخ دھبے۔ سو جا اور اکڑا ہوا چہرہ۔ خشک۔ پھٹے ہوئے
ہونٹ۔ ہونٹوں پر پھنسیاں (ہیریز)۔ میلہ۔ خون آلود تھوک سوتے ہوئے ہے۔ دانت ڈھیلے محسوس
ہوں۔ زبان کی نوک پر سرخ خٹک۔ ترچھے لہج میلے۔ یا ایک طرف میلی۔ درمیان میں سرخ اور خشک
ذائقہ تانے کا سا یا خشک گھاس کا سا۔ صبح کے وقت گلے میں بائیں جانب خراش۔ غدود میں سوزش
گرم مشروبات کی خواہش ہو خواہ ان سے دکھانسی میں۔ سردی میں وغیرہ۔ کھانستے کھانستے
ہو جائے۔ پیٹھ پر چت لیٹنے سے تپ ہو جائے (Focal) پیٹ چھونے سے درد ہو۔ پیٹ میں گولا
سا معلوم ہوے۔ دست پتلے۔ جھاگ دار۔ خون آلود۔ بدبودار۔ اینٹوں کی سرخی کے رنگ کے
چپکنے والے چمکدار۔ بے ارادہ خارج ہو جائیں۔ یا مروڑ سے آئیں۔ دے پنے سے۔ بوا سیر د اٹھانے
سے۔ اعضائے تناسل میں ورم خصوصاً آگے کی جگہ میں۔ خارش۔ سوزش۔ کھانسی خشک
گلا میٹھا ہوا۔ پھارنے اور تکلیف دینے والی۔ خون کا سا ذائقہ۔ پھیپھڑوں کا ایک بھلا ہوا
یعنی (Oedema) دھڑکن۔ حرکت سے۔ دل تھکا سا محسوس ہو۔ (Hyperaeraphy) درد

باروں میں پیچ کی طرف جاسے۔ گردہ سخت ہو۔ شانوں کے درمیان درد دھکنے سے۔ گردہ کے مادہ
سکڑی جائے یا ٹوٹی جائے۔ خوب دبائے سے۔ پھرنے سے یا پیچھے جھکنے سے۔ لمبگوینی
کر کے گرد درد۔ رانوں تک جائے بے حسی۔ اعضا میں کانٹے سے چھس۔ بازو خود بخود حرکت کریں
دایاں، کمینوں میں فالج کا سادرد۔ مٹھوں کی پشت پر (Phagades) ہتیلیاں خشک گرم
پھٹی ہوئی۔ جھکھی ہوئی۔ ناتھ دھونے سے جلن ہو۔ ران کی طرف درد جائے۔ پاخانہ پھرنے سے
سائیکا ٹانگ کی بیرونی نسیں درد۔ ٹانگ بے جان یا کڑی کی سی معلوم ہو۔ پنڈلیوں میں انقباض
ہو۔ زخم ہوں۔ جن سے خون آلود پانی بہے۔ غارش ہو۔ جلد سخت ہوئی۔ خشک گرم۔ کھلج ہو
جلن ہو۔ لاگرمی سے۔ ٹھنڈی ہوا سے درد ہو۔ چھوٹی چھوٹی پھپھوے دار یا کھڑدار
پھنسیاں۔ ایکڑیمیا کی سی۔ تریا چھپا کی یعنی تپی جیسے داغ۔ اعضائے تناسل پر۔
پیش کے ساتھ باری سے۔ بانوں میں سے پیپ ہے۔ رہس کا زہر چڑھ جائے۔ نان بایوں کی غارش۔
زخموں سے پانی بہے۔ خواب سخت محنت کے۔ کشت و خون کے۔ ٹھکا ہوا یا گھرا ہوا سا بیدار ہو نہیں
تیز کا پستی ہوئی۔ بے قاعدہ۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ ذرا سا کھل جائے سے
باروں میں درد دھکنے سے لرزہ گویا سرد پانی پڑ رہا ہے یا رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ کھانسی سے پہلے
باری باری سے گرمی لگے۔ کسی ایک حصے میں گرمی اور سرسامی پسینہ دھکیلیں۔ بے خوابی کیسا ٹھ
مقدار خوراک و طاقت استعمال ۳۰ سے ۴۰ تک اور ۲۰ یا اس سے لایا سی واکے ٹکڑے یا پودے۔
زہریلے اثرات دور کرنے کے لئے مفید ہے + مدت اثر ۲۰ ہفتے۔

مرد و معاون ادویات۔ برائیونیا۔ کلیریا کارب۔ کاسٹک۔ لائیو پوڈیم میگنیشیا کارب
میڈورائنم۔ فاسفورس۔ فائوولک۔ پلسٹلا۔ ملقہ
ادویہ متعلقہ۔ آہنکار۔ برائیونیا۔ ڈکامارا۔

گندھک

SULPHUR

سلفر

اشتداد مرض >

اخراج دب جائے سے

غسل سے۔ دودھ سے

امراض و تاثرات

رگوں میں

دورہ خون } محرابوں میں

پیش میں

اعضائے پرورش
عابد ارچھلیاں } میوکس
سیرس

مقعد - چھاتی
جلد - تنوں میں
چندیا - تلوے
جوڑ - غدود

کوشش سے
گرمی سے } بستر میں
اونی گپڑوں سے وغیرہ وغیرہ
موسمی تبدیلیوں سے
بولنے سے

السنجے قبل دوپہر
وقت مقررہ پر آغاز پیری میں
پورے چاند پر (سائٹا میلک)
انخطاط مرض

کھلی ہوا میں

گرم سینک سے

پینے سے - خشک گرمی سے

علامات - کبڑے - لاغر - وایم المریض - غلیظ - میلے کھیلے ہوئے بھوک
اچھی - بچوں کا سوکھیا - سورا (Psora) - ہنخیراں یا خنازیر - بانی تے درد و عمل کی کمی - اینرش
پھر خشک ہونے میں دیر - ہر تکلیف کا پرانی پڑ جانا - کنارے سرخ - یا کوئی واحد حصہ مثلاً ہونٹ
کان - ٹخنے وغیرہ (ایلو) متفاحی جلیں یا انجماد تلوے - چندیا - ہڈیاں پڑ درد مقامات بخار
خاص مقامات میں - اخراج سے خارش - بدبودار چمڑے والے - یا خون کی دھاریوں والے اخراج
کمزوری - بیہوشی کے دورے - خالی خالی احساس ضرورت سے زیادہ پُر احساس - بے چینی -
غنودگی - اوپر چڑھنے والی تکالیف - گرمی جرات کپکپی - چکر وغیرہ - دھیمے سبست
بھوکے ہمیشہ تھکے ہوئے سے - پُر امید خواب دیکھنے والے - بشاش - مذہب پرست تلبستی
مزاج - زودرنج - کمینہ خیالات - راز جو - جلدی سے جوش میں آجائے والے - خبیثی - زندگی سے بیزار
نا تھا چکرائے - چند یا میں تڑپ - بھاری زخمی سی - گدی سے چند یا تک - درد - سردی -
دباؤ - گویا پیٹی سی بندھی ہوئی ہے - دماغ کی گہرائی میں درد - اتوار کے دن سرد - سرگرم - سر ٹھنڈے
چند یا پر پست - بال خشک اور ٹھنڈے - آنکھیں جلتی ہوئی - کھانے کی سی تکلیف - گویا ریت بھری
ہے - چھلیاں پھٹی پڑیں - قہر قہراتی ہوں - روشنی کے گرد حلقہ نظر آئے - گویا دھواں اڑ

اڑ رہا ہے۔ روشنی سے خوف۔ آنکھیں دکھیں۔ کان میں بتے ہوئے پانی کی شرشر۔ ناک رُکی ہوئی کبھی
 ایک فتنہا۔ کبھی دوسرا۔ بوند بوند ٹپکے۔ سوزش ہو۔ سرخ ہو۔ دھندلے سے۔ نزلہ۔ زکام۔
 نکسیر کا پھوٹنا۔ رات کو یا دائیں جانب لیٹنے سے۔ بوکے لئے تیز جس۔ قیاسی ہو۔ ماتھے کی
 رگوں میں سوزش۔ بوڑھا نظر آئے۔ چہرے پر دلغ۔ خشک۔ لکت آمیز زبان۔ سرخ کنارے اور
 نوک۔ دانتوں کے کیلے فکی ٹخن دانت کٹکٹائے۔ مونہ میں زخم۔ گلے میں سوزش سی یا دھسک اٹھتی رہے
 بیرونی مٹرنی۔ ڈکاریں۔ شرے اندوں جیسی دکھانے سے پانی زیادہ پیئے کھائے کم گوشت سے
 نفرت۔ یکا یک بھوک بھڑک اٹھے۔ کمزور ہو۔ دائیں قبل دوپہر کوڑی میں پیٹ دکھتا
 ہو۔ دہانے سے بھاری ہو۔ چبک مارے۔ پیچھے کو بیٹھا جائے۔ مقعد کی طرف بچوں کے پیٹ
 میں درد تو بچہ۔ مقعد میں درد۔ فارش۔ حاجت بنی رہے۔ یواسیر کی رغبت۔ درد کے ڈر سے پافانہ
 رد کے رکھے۔ دست۔ جلد جلد۔ علی الصبح (دکھیں) تیدی پیڑ۔ بودار۔ بے درد۔ پتلے
 بھورے بھورے جھاگ دار۔ دودھ سے قبض سے اوستے بدلتے جلن۔ غارش پیشاب کی نالی میں
 جلدی جلدی یا رات کو پیشاب آئے۔ بستر خراب ہو جائے۔ فوٹے شک جائیں۔ رحم میں کاٹنے کی سی
 تکلیف۔ دھبض میں جلن۔ غارش بھر مگاہ میں دھبض سے۔ پرسوت کا بخار۔ جھن بدلو اور جلن دار
 چمرانے والا بدلو دار جھن۔ دم گھٹے۔ ہوا کی بھوک۔ بے قاعدہ سانس۔ کھانسی
 تیز۔ دو تین مرتبہ کھانا پڑے۔ گہری۔ گلابیٹھا ہوا۔ صبح کے وقت۔ چھاتی میں بلغم گھر گھرے۔ گرمی
 آنے قبل دوپہر معلوم ہو۔ بند سا بندھا ہوا معلوم دے۔ یا بوجھ سا رکھا ہوا۔ سرخ یا بھورے
 بھورے دلغ۔ درد یا یلں پستان سے پیچھے کو ہونیہ بدل بیت بڑا معلوم دے۔ دھڑکن۔ لیٹنے
 سے پستان کی گھنڈی چٹھی ہوئی۔ پستان میں تیز جلن۔ گردن کمزور۔ گردن پر پھوڑے۔ کندھے
 بھاری۔ کندھوں کے درمیان درد۔ کمر کے گرد۔ درد معدے کی طرف جائے۔ جھک کر
 چلے۔ ماتھوں سے بوجھ سمجھائے۔ جب کہ بیٹھا ہو۔ پافانیکے وقت تکلیف۔ بایاں بازو بے حس
 ہو۔ لیٹے ہوئے پتیلی پٹی ہوئی۔ کھال اتارے۔ اگر میا۔ مسے ہنٹیلوں پر۔ انگلیاں (دائیں)
 بے حس۔ بایں ران رگ دیم شرنک میں تناؤ۔ بایں پنڈلی میں انیٹھن یعنی بائٹے۔ تلوے
 جلیں۔ بستر سے پاؤں باہر نکال لے۔ رات کو یا بسترے میں ہی ٹھنڈے رہیں۔
 خشک ہیں۔ ایک عضو میں جھٹکے لگیں۔ سونے کے لئے لیٹنے پر جلد خشک۔ کھردری
 جھڑیاں دار۔ کھردرے سے اتھیں۔ غارش۔ رات کو بیت تیز۔ پھوٹ پڑے۔ گھاؤ

پک جائیں۔ اچھے نہ ہوتے ہوں۔ جلن ہو۔ جب کھجائے جائیں ہوائیں۔ آندھی ہیں۔ دھونے سے زیادہ تکلیف دیں۔ پھوڑے پھنسی دیگر تکلیفات کے ساتھ باری باری۔ مثلاً دمے وغیرہ سے پھوڑے پھنسیوں کی فصل۔ خارش۔ ریشکے والی تپتی یعنی تپپا کی۔ اکڑیا پھنسیاں۔ بکی جیسی ہنسدن میں غنودگی۔ رات کو بیداری۔ نیند میں فرحت نہ ہو۔ سوتے سوتے کائے بکر میں اوپر کو سردی چڑھے۔ گرمی۔ پیر بہت گرم۔ سرخ رہیں۔ کندھوں کے درمیان پھر گن۔ پسینہ مانتھ یا پیوں (یا بلبل) میں مقدار خوراک۔ طاقت استعمال شرمع میں ۱۲ درجے کی مناسب ہے۔ مرن امراض میں ۲۰۰ اور اس سے زائد بھی دی جاسکتی ہے۔ زیادہ طاقت کی دوا علیہ طبع نہ دینی چاہئے۔ مقدار خوراک ۵۔ ممدومعاون ادویات۔ ایکونائٹ۔ ایلو۔ آرسنک۔ بیڈیاک۔ سیلاڈونا۔ کلیریا کارب۔ مرکبوس۔ پلسٹلا۔ سورائٹم۔ پارو۔ ہیس۔ آکس۔ سیپیا۔ سلفر آئڈ۔ ادویہ متعلقہ سورائٹم۔ سفلیٹم۔ فاو اثر۔ مرکبوس۔ پلسٹلا۔ سیلیٹا۔ مخالف ادویہ۔ نکس۔ موسک۔ رینکوس بلب۔

SEPIA

اشتداد مرض >

ہوا۔ شمالی آندھی
سردی سے }
مرعوب۔ برفانی
کثر تہجارج سے
حیف سے

ایام حمل میں۔ نقاط سے
صبح اور شام
پہلی نیند کے بعد

اسخراط مرض کے

جہز بات میں آہیجان سے

گرم سے۔ بخار سے۔ بخار سے۔ بخار سے

سیپیا -

علامات و تاثرات

نظام انضمام

رگوں میں
دورہ خون
مستورات کی تکالیف

اعصاب
جلد

علامات۔ ڈھیل ڈھالی مستورات کے لئے۔ گداز و فریب بدن۔ آسانی سے دھرن
 ٹل جانے کی رغبت (Uterine reflexes) علامات کمر میں پھیر جائیں۔ درد اور کوجائے
 ۱۔ متعذریں۔ رحم میں۔ پیچھے کی طرف۔ سر میں۔ دایئیں جانب، نلوں میں وغیرہ۔ کپکپی پیدا کرے۔ گولا
 سا معلوم دے۔ یا اندر یعنی طور پر پھرتا ہوا۔ اوپر کواٹھتا ہوا۔ کمزوری اور خالی ہونے کا
 احساس۔ کوڑی میں پھاتی ہیں۔ کمر کے گرد۔ کونوں پر۔ گھٹنوں میں وغیرہ۔ اخراج دودھ۔ یا خون کے
 رنگ کے۔ یا اسی بات سے متفکر یا خوف زدہ۔ صحت میں رہنا ناپسند کرے۔ مگر تنہائی سے ڈرے
 افسردہ محبت۔ حافظہ کمزور۔ غمگین۔ چڑچڑی۔ کبھی لاپرواہ یا اوداس۔ خواہش مباشرت۔ سردرد۔
 بایں آنکھ کے اوپر کبھی کن پٹی کے ایک جانب کبھی دوسری جانب ۱۔ اسی پہلو بٹھنے سے چند یا پر
 بھاری پن۔ گولی سی لگے۔ پھٹا جائے۔ آدھے سیسی کا درد۔ سر کو آگے پیچھے جھٹکے دے۔ آنکھیں
 مچی جائیں۔ سرخ۔ کھانج ہو۔ نکلی پڑے۔ جھٹکے سے اڑتے ہوئے۔ چنگاریاں سی جھڑتی ہوئی
 دکھائی دیں۔ پھر بصارت ماری جائے۔ ہر طرح کی بونا پسند ہو۔ تاکہ آریار کا وہ کی مانند بھوری سی
 لکیر ہو (HENS) جڑ میں دبائے جائے کا سادہ ہو۔ چوبے یا کھرنڈ نکلیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ
 حلقے۔ چہرے کا رنگ بدلتا ہوا۔ نیچے کا ہونٹ سوجا اور پھٹا ہوا۔ منہ میں جلن کا احساس صبح
 کے وقت کھانسنے کھانسنے کر بلیغم نکالنی پڑے۔ ذائقہ پھیر یا مچھلی کا سا۔ یا تلخ۔ ترش۔ سردی لگے
 چڑھتی ہوئی۔ بھاری بھاری ڈکاریں۔ جھاگدار بلیغم۔ خوراک کے خیال یا خوشبو سے جی متلائے
 صبح کو تھوٹے ہو جائے۔ صرف ٹھوس خوراک یا دودھ سا نکلے۔ سخت بھوک لگے۔ حرش چیزوں کی خواہش
 ہو۔ کوڑی کی جگہ ڈوبی جائے غشی سی طاری ہو۔ کھانے سے آرام نہ پڑے۔ گولا سا معلوم
 دے۔ شانے میں اینٹھن سی ہو۔ ۱۔ جھٹکے سے رحم نکلا جائے۔ یا نیچے کو دبائے والا بھاری
 بوجھ سا محسوس ہو۔ ہاتھوں سے دباے یا مانگوں کو قبضی کی طرح اوپر نیچے رکھے۔ گھڑا سا پیٹ
 ہو۔ دست۔ سریش جیسی آنوں خارج ہو۔ دست۔ آباے ہوئے دودھ سے۔ متعذر سکڑی
 ہوئی سی۔ بے طاقت کبھی دن تک حاجت نہ ہو۔ دائمی قبض۔ گویا متعذریں ڈاٹ سی لگ گئی
 ہے۔ بوا میر۔ یا ہر نکلنے والے سے۔ چپکنے والی۔ ایام حمل کے دوران میں متعذریں رطوبت دینا
 پیشاب آہستہ آہستہ۔ پیلے جلن ہو کر شروع میں پشیاں فضا ہو جائے۔ ۱۔ کھانسنے سے
 چھینکنے سے وغیرہ وغیرہ۔ گاڑھا۔ غلیظ پیشاب۔ چپکنے والا۔ سرخ۔ ریت کے ذرات
 یا سفید۔ حیض بند۔ آغاز شباب میں۔ رحم میں دہن یا درد کمزوری ویجے جائے یا نیچے

گرے جانے کا احساس اور دبا کر بیٹھنے کی ضرورت شرمحاکہ کے ہوں میں سوزش۔ پھوڑا میلان رحم
 بڑی بڑی گھٹلیاں سی خارج ہوں۔ بدبودار سوزاکی مادہ۔ معدے سے کھانسی لٹے۔ لاموسی
 حرارت کی تبدیلی۔ خراب بلغم خارج ہو۔ دورہ خون بے قاعدہ۔ ٹھیرا ہوا سا معلوم دے۔ دھڑکن
 نمایاں۔ مکن پیو کی طرف چڑھتا ہوا۔ نبض سی جلتی ہوئی معلوم دے۔ رات کو زور۔ خون کی نالیوں میں
 خون کی کثرت۔ گلار کا ہوا سا محسوس ہو۔ دو دو کرے۔ مکر کے گرد۔ دبوانے کی خواہش ہو۔ ناتھ سرخ
 کھٹنے یا ایڑی ٹھنڈی۔ جلد پر دھڑکن بھٹی ہوئی۔ کھردری۔ سخت۔ دبوایاں۔ چھوٹی چھوٹی سفید
 پٹھیاں۔ دلوہ کھلج پھوڑا کھنٹی پر موٹا کھنڈ۔ چھوٹے جوڑوں پر زخم۔ سوتے سوتے زور سے بولے
 یا اس کروٹ لیٹنے سے خواب۔ آسانی سے سردی لگ جائے۔ سردی خاص خاص مقامات پر۔ چندیا
 پر۔ کندھوں کے درمیان۔ پیروں میں۔ بستر میں۔ یکایک کمزوری کا دورہ۔ فکر زدہ۔ گرم سرخ
 چہرہ۔ ناتھ گرم پیر ٹھنڈے یا اس کے برعکس پسینہ بے آسانی۔ لرزے سے۔ اعضائے تناسل پر۔
 کمر میں۔ ریشہ کے ڈنڈے پر۔ بے قاعدہ بخار۔

مقدار خوراک یا طاقت استعمال ۱۲-۳۰-۴۰ اور ۲۰ بہت کم درجے کی دوا بار بار نہ دینی چاہئے
 نگر ڈاکٹر جو ۱۴ دن میں دو مرتبہ دینے کی سفارش کرتے ہیں ۱۰ مقدار خوراک ۶-۷ ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ سوراٹنیم۔ پلسٹلا۔ سلفر۔

سہوہ یہ متعلقہ۔ کاسٹم۔ جلیس۔ بلیم۔ یک۔ نیٹرم میور۔ پلسٹلا۔

مخالف دوا یہ۔ لیکس۔

سلیشیا

SILICA

اشتداد مرض ۱

ہوا۔ جھونکے

سردی سے
 تبدیلیوں
 کھن جانے سے
 ننانے سے
 پسینے زکفر سے
 پیروں کے

سلیکا

امراض و تاثرات

پیرورس کن۔ بچوں کے لئے

ریشہ جات (Elastic) دے

(Gelular) خاندان دار

اعصاب عود

یوٹاشین (Eutachian)

لیاں (Tour Dacta) آنسو کی نالیاں

(Vistalae) خپولا

ہڈیاں - مری ہڈی (Cartilage)

لعابہ رجبلی

جلد

عصبی جوش

اساس } روشنی بنور

دھماکہ - ریڑھ کی ہڈی

چاندنی کی تبدیلی - رات

اسخا طامرض

گرم } گرم کپڑے پہننے سے مرکو
سو جانے سے

سنت پشاپ

علامات - نہایت ذکی الحس - شور کو درد کو یا ستری کو اٹکھٹی سے پٹے رہنا چاہے۔
 تیز درد - یکجائی کہوں میں - سلق میں - رخم میں وغیرہ - تشنج - جندی تھک جانے کا رجحان - ہاظر لپسین
 پیپ پڑ جانا - آہستہ آہستہ - نامکمل عمل - بعد میں سخت ہو جانے - ہر ایک چوٹ پک جانے
 دیر تک پکتے رہیں - فیجولا پھوٹا مردار گوشت - خوراک کی کمی - زیریں نشوونما - دریں چلنا سیکھے
 غدود میں سوزش مرض سوکھیا - اعضا سو جائیں - سویرے کے وقت (Oedema) سوجن
 دماغی تیزی جسمانی سستی - ہمت کی کمی - بھدی چال - رنجیدہ اور صندی - اوپر چڑھنے والے
 اثرات - سخت جگر - کن پٹیوں میں درد دباؤ سے بہ درد کے بعد بے بھری چند یا پرتڑپ -
 پیٹ پھولا ہوا - کھوپری پر گومرے - آنکھوں میں سوزش - موتیا بدبہرہ - زکام - زبان پڑھنے میں
 بال سامعہ دے - حلق میں تلخ ذائقہ - دانتوں کی جڑوں میں پوڑے - گرم خوراک سے نفرت
 پیٹ بڑا سخت اور گرم - ٹانگیں تپتی ہوتی ہیں - کھانے کی سی تکلیف - تشنج - غوطوں میں درد
 مباشرت - پاخانہ دب جائے - حوض میں غوطوں میں پانی اتر آئے - رحم کی نالی میں کائے جانے
 کا سادرو اوپر کی طرف - پیشاب کرنے سے سیلان الرحم بہ افراط - رک رک کر شرنگاہ میں غارش
 تے ہلاڈلنے والے - کھانسی سانس روکنے والی - کھنڈے مشروبات سے - یلتم بہ افراط -
 چھاتی میں غرغر کرے - پستان کی گھنڈی میں درد - پستان میں گانٹھ - ایکزیری غدود میں سوزش -
 انگلیوں کی نوک میں درد - خشکی - ٹخنے کمزور - پیروں میں پسینہ - بدبو دار - خارش کرنے والا -
 چرم رانے والا - جو تے خراب کرنے والا - دیا ہوا - پیر کی محراب میں درد - بد شکل - اندر نکلنے والے
 ناخن - خوفناک خواب - آنکھ لگتے ہی جاگ پڑے - سردی - بستر میں محنت سے - تکلیف دہ

جھٹھے میں۔ تیخ جیسی سردی۔ چپ۔ دق۔ بکثرت پسینے۔ اوپر کے جھٹھے میں۔ سر پر۔ متاثر ہونے میں۔ رات کو۔ بہ آسانی۔ بدبودار۔ چرم لانے والے۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ ۶ سے ۲۰ تک نیز ۲۰ یا اس سے زیادہ۔ مدت اثر۔ ۶ ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ فلورک الیڈ۔ فاسفورس۔ تھیوجا۔

ادویہ متعلقہ۔ کلکیریا کارب۔ ہیمپ۔ کالی فاس۔

بعد میں دی جائے۔ کلکیریا کارب۔ ہیمپ۔

مخالف ادویہ۔ مرکبوس۔ ٹیکس موسک۔

THUJA

تھیوجا

اشتداد مرض

سرد و مرطوب

گرمی بستر کی

۳ بجے صبح۔ سالانہ

وقت مقررہ پر۔ بڑھتے چاند

ایام حیض میں

پیشاب کرتے وقت۔ سوزاک سے

چھپک کے ٹیکے سے

چاء سے۔ پیاز سے

انخطاط مرض

آنڈھی یا ہوا سے

گرمی سے } سر پٹنے سے

کھل کر اخراج ہونے سے

چھینکوں سے

امراض و تاثرات

اعضائے تناسل و پیشانی

لعابدار جھیلیاں } انٹریوں کی

من۔ اعصاب

کن پٹی

غدد۔ جلد

بائیں جانب۔ خضیتہ الرحم

حرکت سے ٹانگ پر ٹانگ پہنچی کی طرح رکھنے سے چھوٹے سے۔

علامات - تھکامو اور ڈھیلا ڈھالا۔ سخت نقاہت و کمزوری۔ جلدی جلدی سوکھتا جائے نرم وافر جرم گوشت۔ سے سیاہ۔ دبے ہوئے۔ بلندی ساخت جسم تیز ترش یا مٹھے جیسی بدبو آئے۔ چکنے پاخانے سے۔ جلد سے یا پسینے سے بوند بوند کر کے پیشاب آئے۔ جلن کے ساتھ۔ تکلیف کبھی کمین ہو کبھی کہیں۔ گرمی سے۔ بانی کے درد۔ جھٹکے سے لگیں۔ ریڑھ کی ہڈی سے کٹے حصہ بے جان سا ہو جائے۔ وہی شکلیں دکھائی دیں۔ پھر کوئی خیال دل میں بیٹھ جائے۔ یوفائی کا۔ اندر کسی زندہ چیز کا احساس۔ پہلو میں کسی زبردست طاقت کے ہاتھ میں ہونے کا خیال۔ جلد باز اور متفکر۔ ذرا ذرا سی بات پر خیال مجتمع نہ کر سکے۔ اعضا کی کمزوری و نولیتھینا۔ سر میں چکر۔ جیسے ہنڈولے میں چکر آتے ہیں۔ بھارتا ہوا۔ گویا سر کی بائیں طرف کوئی میخ گاڑا ہو عصبی درد۔ دنیور بلجیا، خشک پٹھے ہوئے بال۔ آنکھیں خون جیسی سرخ۔ آنسو بھرے ہوں۔ بکھلی بریں۔ چہرہ موم کے رنگ کا۔ چمکدار۔ آنکھوں کے نیچے سیاہی۔ دانت مسوڑوں کے پاس سے جھرتے ہوں۔ دسردی سے۔ نکلنے میں آواز آئے یا ڈکاریں آئیں۔ ترش اور چکنائی دار ڈکاریں۔ پیٹ میں گڑ بڑ۔ پیچھے کی آنٹوں میں گولہوں میں۔ مشانوں میں یا پیشاب کی نلی میں کانٹے والے مروڑ۔ انٹریوں میں گڑ گڑ کی آواز ہو۔ پتلا سینہ درست ہو جائے۔ گڑ گڑ کر کے پاخانہ خارج ہو۔ یا پھر چھڑ کی آواز ہو۔ صبح کی خوراک کے بعد پاخانہ سخت۔ سیاہ گھیلیاں۔ اور پانی زور سے خارج ہو۔ پھکاری کے مانند ہوا کے ساتھ۔ جلدی جلدی۔ متعہ میں رطوبت۔ پیشاب جلن سے۔ بوند بوند کر کے۔ بدبو دار۔ بکثرت۔ دیر تک بیٹھا رہنا پڑے۔ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی نالی میں درد۔ اعضا کے تناسل بدبو دار۔ فوطوں میں درد۔ آلت تناسل اور شنف کی سو جن۔ سوزاک۔ بائیں نلے میں جیتنا بھارتا ہوا درد۔ شرمگاہ میں خارش۔ تیز جس۔ سانس جلدی جلدی خشک سے آئے۔ دم۔ دن میں بلم۔ آسانی خارج ہو لیٹے ہوئے۔ پتیر جیسا بلم۔ پر فکر دھڑکن۔ مکر میں تڑپن۔ گردوں پر دباؤ۔ لمبے عضلات میں بے جستی۔ جوڑوں کا چٹخنا۔ انگلیوں میں بے جستی۔ رات کو جاگنے پر (ڈیٹریم میور) ہاتھوں یا پیروں کی انگلیوں کی نوک میں سوزش یا رینگنے کا احساس۔ کولے بیکار ہو جائیں۔ اعضا قلع زدہ سے محسوس ہوں۔ گھٹنوں میں بے چینی۔ تلووں میں درد۔ پیروں میں بدبو دار اور چرم پستہ۔ جلد بھوری۔ دھننے دار۔ سیلی۔ بال دار۔ پٹھیاں خارش

جلن تیز۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے پر۔ نیلگون سفید زخم۔ کمر پر خونی پھوٹے۔ ناخن نرم پھٹے ہوئے
 گلنے والے بدننگ۔ مڑے ہوئے۔ بائیں ہیلو پر لیٹنے سے نیند نہ آئے۔ مردوں کے خواب آئیں۔ ملا دینے
 والا لرزہ۔ جبجھاہیں سمیت۔ پیشاب سے گرمی سے آرام نہ پڑے۔ چھاتی میں گرمی چڑھے۔ ماتھوں پر
 جیسے سرد نیکیسہ یا کھانسی۔ ننگے حصّہ جسم پر پسینہ۔ ڈھکے ہوئے حصّوں میں خشک گرمی۔ ماتھ
 ٹھنڈے سے دھوئے سے۔ اعضائے تناسل پر بکثرت پسینہ آئے۔ اجاب کی موجودگی
 میں۔ بدبودار۔ داغ دینے والا۔

مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ سرنگہ سے ۳۰ حصّہ تک یا زیادہ۔ مقامی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے
 مدت اثر تین ہفتے۔

ممد و معاون ادویات۔ مرکبوریس۔ نیٹرم میور۔ نائٹریک ایسڈ۔ پاشلا۔ سیبائنا
 سلیشیا۔ سلفر۔
 ادویہ متعلقہ۔ مرکبوریس۔ نائٹریک ایسڈ۔ سیبائنا۔

VERATRIM ALB

وریم ایلب

امراض و تاثرات

پیٹ

دل

خون کی نالیان

چند یا خون

نظام تنفس۔ نظام انضام

اشتداد مرض

محنت سے۔ پینے سے

سرد مشروبات سے

درد میں۔ خوف سے

بھیک جانے سے۔ سردی سے

انخطاط مرض

گرم اشیاء سے۔ ادھر ادھر پھرنے سے

کپڑا اوڑھنے سے۔ لیٹنے سے

علامات شدید مرض مثلاً ہضمیہ سیکمزور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آئیں۔ بیہوشی یا مردنی
 اچانک بہ افراط اخراج۔ اینٹھن چھاتی میں۔ انٹریوں میں۔ ماتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں
 سختی کے ساتھ۔ بڑھتی ہوئی کمزوری اور سوکھا تیز میاریوں میں مثلاً کھانسی میں۔ بخاریں۔ ہڈیاں

ابتدائی تشدد کے ساتھ۔ درد کے دوران میں۔ بکواس شہوت انگیز باتیں۔ دعائیں مانگے۔ گائیاں
 دے۔ بہو ہو کرے۔ باری باری سے تیز خط۔ دیوانہ پن۔ تناسف۔ خاموش بیٹھا رہے۔ مایہ خو گیا۔
 بے قابو کر دینے والا سردرد۔ بال پھٹنے لگیں۔ درو کریں۔ چہرے پر اٹھنے ہوئے زردی اور مردنی چھا
 جائے۔ رنگ نیلا پڑ جائے۔ ناک بھوں چڑھے ہوئے۔ غور و ساد کھائی دے۔ بایاں رخسار سرخ
 گویا جلا ہوا۔ چباتے چباتے جھڑے میں تشنج۔ دانتوں میں بھاری پن۔ جلانے والی پیاس۔ برف کے پانی
 کی خواہش۔ یا ترش مشروبات کی۔ تھے کر دے یا دکارین آویں۔ بہت زیادہ تھے آویں۔ دست
 ہوں۔ سخت جی متلائے۔ درد قویٰ گویا کوئی کاٹتا ہو۔ بازوؤں میں تشنج۔ بڑی تیزی سے
 گرتا جائے۔ بیضہ۔ کوڑی میں درد۔ پتلے سبز۔ بے بو۔ بے رنگ (چاؤلوں کی پیچ جیسے) دست۔
 مریضہ کو مباشرت کی بیٹیاب کن خواہش۔ ہوا بہت گرم معلوم دے۔ گلے میں دھسک۔ پھیپھڑوں میں
 ہائے تیز کھانسی حیرت انگیز جاری رہے۔ جی بالٹ کرے۔ ٹھنڈے مشروبات سے۔ دل پر کلنے
 کا سا احساس۔ کمزور۔ نظر آنے والی دھڑکن۔ دھیمی دھیمی جلن۔ بازوؤں میں۔ دائیں سے بائیں کو پھیلنے
 میں مروڑ۔ پاخانہ پھرتے ہوئے۔ داپیکا۔ سیک سی C، کندھوں کے درمیان مروڑ۔
 حرکت سے۔ جلد جلی ہی محسوس ہو۔ رات کو کپکپاتے ہوئے بیدار ہو۔ بیض سوت جیسی باریک۔ عام
 سردی۔ تنج جیسی۔ چند یا پر۔ ناک پر نمہیں۔ پانی بھر بھرتا۔ اعضا میں۔ پسینے۔ لہو ٹھنڈا ہوتا
 معلوم دے۔ اندرونی گرمی معدہ سردی (جھریاں) جلد پر۔ بخار جس میں صرف باہر ٹھنڈا معلوم دے۔
 مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ اسے بہت کم۔ دستور میں نمبر۔
 مدت اثر۔ دو ہفتے۔

مدد و معاون ادویات۔ آرسنک۔ کاربووینج۔

جست	ZINCUM	زنکم
اشتداد مرض		امراض و تاثرات
مردنی		کنپٹی
اخراج کا دب جانا		ریڑھ کی ہڈی
شور۔ لمس۔ شراب		آنکھ کے ارد گرد کا حصہ
		دماغ اور
		اعصاب

ناک کی جڑ

خون

اندرونی

گرمی پہنچنے سے

انحطاط مرض

حرکت سے۔ خوب دبانے سے

گرم کھلی ہو ایس

کھلے اخراج سے

علامات۔ دماغ پریشان۔ خوب چستی یا پست حوصلگی۔ چیزیں اتار کر پھینک نہ سکے۔ اخراج
 وغیرہ بڑھتے جائیں۔ بڑھتی ہوئی کمزوری کے کھانے سے۔ بے چینی سمیت۔ تنہا اثرات۔ کوئی
 ایک حصہ سو جائے۔ دوسرے کی جس تیز ہو جائے۔ جلد پر جینٹیاں رہنے کا سا احساس مفلاتہ میں درد۔
 جلد اور گوشت کے درمیان ملکہ طرف سے دوسری طرف ترپھے جانے والے درد۔ غیر ارادی فعل۔ کپکپی
 جھٹکے سے لگیں۔ رات کو۔ تشنچ۔ درد گولی کی مانند نکلتا رہے۔ فالج نیچے کی طرف جائے۔ درد
 کے مارے ہڈیاں بیکارسی ہو جائیں جسم سے خون کا اخراج چڑچڑا۔ تنگ کرنے سے روفے۔ آسانی
 چونک پڑے۔ جوش میں آجائے۔ یا نٹ چڑھ جائے۔ گڑ بڑ کر دے۔ سوال کو بار بار دہرانے کے بعد جواب
 دے۔ دماغ میں دھند سی معلوم دے۔ چلائے حرکت کرانے جانے سے بیند میں۔ درد سے۔
 وغیرہ وغیرہ۔ سر میں سخت چکر آئیں۔ بدحواس ہو جائے۔ سر درد۔ کم و بیش ہونے والا۔ چند یا پر ناک
 کی جڑ میں دیاؤ محسوس ہو۔ یا آنکھوں میں۔ نظر کم آنے لگے۔ گرمی سے سخت دبانے سے کینٹھیوں
 میں بھاری پن اور درد۔ درد کاٹنے سے۔ گڈی کھچی جائے۔ مکر کی طرف نیچے کو بڑھتا سا پڑے۔ ٹانگیں
 کمزور ہو جائیں۔ گڈی میں گرمی معلوم ہو۔ سونے کے لئے لیٹنے پر سر میں خنجر سے ہوں۔ سر اور ہر اوہر
 مارے۔ دانت پیسے۔ دماغ پر فالج۔ بالوں میں درد۔ چند یا کے بال کھڑے ہو جائیں۔ آنکھیں کھج کر ملتی
 ہوئی سی معلوم دیں۔ بھینٹ گاپن۔ کھاتے ہوئے آنسو میں۔ ناک پر سوزش۔ زردی۔ نیلا پن۔ چہرہ
 مصیبت زدہ سا۔ ہونٹ چپکیں۔ ذائقہ تلخ۔ بے تحاشہ بھوک۔ جگر میں یا ناف میں ڈھیلا پن معلوم ہو
 اچھارہ۔ اجابت کے وقت مقعد میں خارش۔ بواسیر کی تکلیف نیچے کو کھینچنے سے گرمی دپٹنے پھرنے
 سے زخم پڑ جائیں۔ پیشاب بڑے زور کا لگے۔ مگر صرف خاص حالت میں بیٹھنے سے ہی پیشاب آئے
 مثلاً آگے یا پیچھے جھکنے سے۔ عضو پر عضو چڑھانے سے وغیرہ۔ پیشاب کے بعد خون خارج ہو۔ گردے
 کے ارد گرد دباؤ اور کاٹے جانے کا سادرد۔ عضو پکڑنے کو مجبور ہو۔ ہر مرتبہ کھانسنے پر جوش شہوت۔
 خواہش جلق۔ ایام حیض میں۔ حیض بکثرت۔ لو قہروں والا۔ یا کس نلے میں سخت درد۔ چھیدنے کا سا

سخت حرکت دل۔ چھاتی میں کچاؤ۔ گدی میں تکان۔ دماغی محنت سے۔ لنگر اپن۔ بدحواسی۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ برابر برابر جلن۔ بیٹھنے سے۔ تیز جس۔ کٹتی ہوئی معلوم ہو۔ ے ڈکاروں سے مکر کے گرد و کزوری ے کھڑا ہونے سے۔ اعضا میں درد۔ گرم ہونے سے۔ ہاتھ کانپیں۔ کرنیا۔ پھینیاں اور خارش پیروں اور ٹانگوں کو بے حرکت نہ رکھ سکے۔ ٹھنڈے ہونے سے۔ لٹخٹن۔ پیروں کی انگلیوں میں سوزش۔ زخم۔ لوک میں درد۔ تلوے تیز جس۔ پیروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئیں۔ پیروں میں پسینہ۔ انگلیوں میں زخم۔ لٹکھڑاتی ہوئی چال۔ اعضائے تناسل کی رگیں پھولی ہوئیں۔ درد ہو۔ پرانی تکلیف۔ مقدار خوراک و طاقت استعمال۔ نمبر اسے ہا نمبر تک زیادہ طاقت کا بھی دیا جاسکتا ہے۔ مدت اثر۔ ۴ ہفتہ۔

ممدومعاون ادویات - پاشلا - سیپیا - سلف
ادویہ متعلقہ - آگنیشیا - کالی فاس - لیکسس - پکرک ایسڈ
مخالف ادویہ - سیمومیل - نکس وومیکا -
فاد اثر ٹیٹیم -



طب ہومیوپیتھی پرستند معرکہ الاراضیانیف

جو ہومیوپیتھک کلج لاہور کے نصاب تعلیم میں شامل ہے

فلسفہ ہومیوپیتھی یعنی ہیوس
صدی کا آرکینز (دبا تصویر)

دطیع سوئم مصنف ڈاکٹر کے سی متیشی صاحب پرنسپل ہومیوپیتھک
میڈیکل کلج لاہور۔ یہ ایک نئی تصنیف ہے جو طبی دنیا کی
نئی تصویروں، نئی ایجادوں، نئی اختراعات کا مجموعہ ہے

جس کا مطالعہ ناظرین کے سامنے ایک نئی طبی دنیا پیش کرتا ہے۔ اور قدیم و جدید علم و عمل طب
پر ایک زبردست روشنی ڈالتا ہے۔ قیمت فی جلد صرف دو روپیہ (دع)

ہومیوپیتھک تشخیص و تجویز دوا
یعنی چالیس ادویات کا کل

دطیع سوئم مصنف ڈاکٹر کے سی متیشی صاحب پرنسپل ہومیوپیتھک
میڈیکل کلج لاہور۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ معرکہ الاراضیانیف ہے
جس میں ہومیوپیتھک طریقے سے دوا تشخیص و تجویز کرینکا

نہایت سہل مگر یقینی طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اور عام متعلیٰ چالیس ادویات کے خواص و افعال کی غامضیات
و خصوصیات ظاہری و باطنی کیفیات و تاثرات کا محقق مگر مکمل مفید و مؤثر اور یقیناً با محاورہ بیان درج ہے
یہ نہایت مفید کتاب ہر ایک ہومیوپیتھک پرکشنرز کی میز پر موجود رہنی چاہئے قیمت دو روپیہ

ہیومن فزیالوجی (دبا تصویر)

دطیع سوئم مصنف ڈاکٹر ہرالدین بی۔ ایچ ایم پرنسپل ہومیوپیتھک
میڈیکل کلج لاہور۔ یہ کتاب علم الاعضاء کے انسانی پر ایک

مشرح و مستند و عام فہم کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر ڈاکٹر و طبیب کے لئے ضروری ہے قیمت چار روپیہ
رہنمائے ہومیوپیتھی یعنی گھر کا ڈاکٹر

دطیع دوئم، یہ کتاب علم و عمل علم طب پر وہ معرکہ الاراضیانیف
تصنیف ہے جس میں نہیں، زبان انفس، ہوا، بخار،

پانی، غسل، برہم، بیدار، حرارت، جسم، دود، جلد، پیشاب، احتیاط، اعضاء، مآخراک، اعضاء، تشخیص
علامات، و علاج الاراضی، نہایت وضاحت کیا تھا درج ہے۔ لکھائی چھپائی عمدہ قیمت تین روپیہ

مفصل فرست مفت طلب کیے
ملنے کا پتہ۔ سیمتیشی ہومیوپیتھک ڈال۔ مال روڈ لاہور

ستار کا پتہ: ریڈاکٹر ٹیلی فون قائم شدہ ۱۹۰۸ء
 شمالی ہندوستان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہومیوپیتھک دواخانہ
 ہمتیشی ہومیوپیتھک ہال مال لاہور

یہ کارخانہ فریڈرک ویلیام ہومیوپیتھک استاد موسیٰ نے زمان عالیجناب ڈاکٹر کے سی ہمتیشی صاحب پرنسپل ہومیوپیتھک کالج و ہسپتال لاہور کی زیر نگرانی و زیر ملکیت مدت مدید سے جاری ہے جس کی سرپرستی و ایان بریاست۔ لیڈران قوم ساکنان انگریزی ہومیل، اسٹلے عہدیداران گورنمنٹ، مشہور و معروف ڈاکٹر ان، ویدر۔ اور حکیم صاحبان، روسائے ہند، منتظمین ہسپتال، کارخانہ دار، سیلج اور کنبہ دار اصحاب گفہ شدہ ۲۴ سال سے متواتر فرما رہے ہیں +

ہماری خصوصیات

اپنی عمارت خدا کے فضل اور ہمارے سرپرستوں کی مہربانی سے سوکسٹیشن میں ہال روڈ کے جانب شمالی سبیل سرشاری لال بلڈنگس موجودہ کلشی میں سب سے قریب ہال روڈ پر مال کی اپنی ایک عالی شان آپ لوڈیٹ عمارت میں جو جدید طرز پر تعمیر کرائی گئی ہے واقعہ ہے جس میں ہوا اور صفائی کا خاص لحاظ رکھا گیا فارسیسی۔ جس میں فارسیسی کے لئے علیحدہ عمارت تعمیر کی گئی ہے جس میں عرق نکالنے کے پریس، اسٹوف بنائے گئے مشین، اور ٹمکیہ بنانے کی مشین اور دوسری مشینیں لگائی گئی ہیں +

لیبوریٹری۔ ہماری لیبوریٹری میں تمام ضروری جدید آلات موجود ہیں۔ ادویات۔ ہمارے مال تمام مال براہ راست ممالک امریکہ و جرمنی و انگلینڈ سے منگوا یا جاتا ہے اور تمام ادویات ایک ماسٹر دوا ساز کی زیر نگرانی طیار کی جاتی ہیں جو ممالک غیر کی ادویات کی نسبت زیادہ معتبر تازہ دوا اثر اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے ہر طرح قابل قدر اور اطمینان بخش ہیں۔ شرح۔ عام ادویات کا باج پیسے فی ڈالرم ہے۔ اور کثرت میں بیکریز کا آٹھ آنے فی پونڈ۔

ہم نے اپنے مال کے ہر شعبہ میں حال ہی میں ہر ضروری اصلاح و اضافہ کیا ہے۔ ہمارا دعوئے ہے کہ ہمارا مال شمالی ہندوستان میں اپنی مثال آپ ہے اور طب ہومیوپیتھک کے متعلق ہر شے کے حصول کے لئے ایک آپ لوڈیٹ کارخانہ ہے ہم درخواست کریں گے کہ بیشتر اس کے کہ آپ کوئی مال دوسری جگہ سے خرید فرماویں۔ ہمارے مال کا ضرور معائنہ کریں اور ہمیں ایک آزمائشی فرمائش کا ضرور موقع دیں +

مفضل حالات کے لئے فرست کارخانہ طلب فرماویں۔

منیجر

تقایم شدہ ۱۹۰۵ء

ٹیلیفون :- ۱۱۱


تارکاپتہ بڑے ڈاکٹر جی لاہور

۹ سال روڈ
لاہور

ہومیو پیتھک کلینک

جس کے ساتھ ایک اپ ٹوڈیٹ ہسپتال، فارمیسی، لیبوریٹری، لائبریری، باغیچہ اور دیتا، اور اوٹ ڈور سٹیشنری شامل ہے۔ اپنی جدید طرز کی عالیشان عمارت مرکزی صحت بخش مقام دیکھئے۔

دو سال ڈیپوٹو
اور بی ایچ ایم
ایم ایچ سی ایس
ہیں لیکن بذریعہ
مادلس اور
دیئے



مفتی روشنی
کوہس ایک و
ایل ایچ ایم
ایم ایچ سی اور
کے عطائے جاتے
چارٹس
جادو کی لائین
جاتے ہیں اور تشخيص و تجویز دوا بذریعہ

ڈاکٹر بوگر کے عجیب و غریب ریمپرٹری کارڈ

اور
باڈی ریفلیکس ڈائگنوسٹک سنٹر

دیگرہ بیش قیمت جدید طبی آلات کے ساتھ سکھائی جاتی ہے، جو ہماری ایک خصوصیت ہے

طبابت پیشہ اصحاب کے لئے خاص رعایت

انٹرنس یا زیادہ قابلیت رکھنے والے مرد و عورت طالب علم داخل ہو سکتے ہیں۔

مفصل حالات کے لئے دوائے کے ٹکٹ بھیج کر رسپنڈ طلب کریں۔

”رجسٹرار“

تیار کا پتہ: بڑا اکبر پور، قائم شدہ ۱۹۰۶ء

ٹیلیفون: ۱۰۰

ہومیوپیتھک کالج ہسپتال

کے ساتھ ایک ایڈریٹ فارمیسی، برٹری، باغیچہ دیویات اور اوٹ ڈو روپنسری شامل ہے

ایک ماہر علاج کے زیر اہتمام ہے اور بیش قیمت جدید برقی و طبی جدید آلات سے مزین ہے

”الکٹروجن، برقی سیٹیاں، الٹرا واولٹ ریز، واولٹ ریز وغیرہ“

”ڈاکٹر لوگر کے عجیب و غریب تشخیصی کارڈ“

”اور باڈی فیلکس ڈایک نو سنر وغیرہ“

جن کی مدد سے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ امراض مزمنہ کی صحیح تشخیص اور خود بخود تشخیص و تجویز دیا جاتا ہے

”قابل عمل جراحی امراض کا بلا اپریشن علاج“

مثلاً ناسور، بھگنہ، خنازیر، امراض ہڈی، بواسیر وغیرہ

امراض مزمنہ کا علاج ہماری خصوصیت ہے

مثلاً امراض گردہ و مثانہ، پیچیدہ و اعصاب و جلد وغیرہ۔

امراض بچکان، جو کمزور و نحیف ہوں، جسمانی نشوونما پورے طور پر نہ ہوئی ہو، دانت خراب ہوں،

گلے پھٹے ہوں، غدودیں پھولی ہو، دل اور جہیزانی و دماغی طور پر کمزور اور تھکے ہوں۔

اپنی عالیشان جدید طرز کی عمارت امریکی ڈسٹریکٹ ہسپتال کی ریشمی پٹری سے زینس و عالج معمولی۔

سیمنٹ ٹرائٹ

دوا کے ٹکٹ بھیج کر پراسچیکس طلب کریں +